

Zeitschrift: Palliative.ch : Zeitschrift der schweizerischen Gesellschaft für palliative Medizin, Pflege und Begleitung = revue de la Société suisse de médecine et de soins palliatifs = rivista della Società svizzera di medicina e cure palliative

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für palliative Medizin, Pflege und Begleitung

Band: - (2003)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 25.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Die Herausforderungen bestimmen die Massnahmen

> PainControlling™ bei chronischem Schmerz

 oxycontin®

The PainController™

> kassenzulässig

OXYCONTIN® Tabletten retard: Opioid-Analgetikum mit Langzeitwirkung (ca. 12 Std.).

Darreichungsformen: Oxycodoni hydrochloridum, Tablette retard zu 10, 20, 40 bzw. 80 mg. **Belegte Indikationen:** Mittelstarke bis starke prolongierte Schmerzen bzw. bei ungenügender Wirksamkeit nichtopioider Analgetika. **Dosierung/Anwendung:** Anfangsdosierung: 10 mg alle 12 Stunden, individuell dosieren. **Kontraindikationen:** Bekannte Oxycodoniüberempfindlichkeit, akute Lebererkrankungen, Atemdepression, chronisch obstruktive Erkrankungen der Atemwege, akutes und schweres Bronchialasthma, Hyperkapnie, paralytischer Ileus, akutes Abdomen, verzögerte Magenentleerung, Schädel-Hirn-Trauma, Koma, Schwangerschaft. Während der Anwendung und bis zwei Wochen nach Absetzen eines MAO-Inhibitors. **Vorsichtsmassnahmen:** Bei geschwächten Patienten, Leber- und Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Nebennierenrindensuffizienz, Prostatahypertrophie, Schock, eingeschränkte Atmung, Hypotension, Hypovolämie, Gallenwegserkrankungen, Pankreatitis, entzündlichen Darmerkrankungen, erhöhtem intrakraniellen Druck, konvulsiven Störungen, opioidabhängigen Patienten, oder akutem Alkoholismus. Bei Verdacht auf paralytischen Ileus oder bei Auftreten während der Behandlung muss OXYCONTIN® sofort abgesetzt werden. Patienten, die sich einer Chordotomie oder einem anderen schmerzliernden Eingriff unterziehen müssen, dürfen während 24 Stunden vor der Operation kein OXYCONTIN® erhalten. Wie mit allen Opioiden ist nach operativen Eingriffen Vorsicht geboten.

Vor Wiedereinsetzen der normalen Darmfunktion sollte OXYCONTIN® nicht angewendet werden. Oxycodon kann auch bei bestimmungsgemässen Gebrauch das Reaktionsvermögen verändern. **Schwangerschaft/Stillzeit:** Schwangerschaftskategorie C.

Unerwünschte Wirkungen: Häufig: Obstipation, Nausea, Schwindel, Pruritus, Erbrechen, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Schwitzen, Somnolenz, Asthenie. Gelegentlich: Anorexie, Nervosität, Insomnie, Fieber, Verwirrung, Diarrhö, Bauchschmerzen, Vasodilatation, Dyspepsie, Parästhesien, Hautausschlag, Angst, Euphorie, Depression, Dyspno, posturale Hypotonie, Schüttelfrost, unangenehme Träume, Denkstörungen, Schluckauf, Zuckungen, Gastritis, Urtikaria. Selten: Vertigo, Desorientiertheit, Gesichtsrötung, Stimmungsveränderungen, Palpitationen, Halluzinationen, Bronchospasmen, und Koliken. Störungen der Blasenentleerung, Spasmen der Gallen- oder Harnwege, Atemdepression, Bradykardie, Hypotonie sind möglich. Bei falscher oder missbräuchlicher Anwendung besteht das Risiko einer psychischen Abhängigkeit. Bei korrekter Anwendung wird dies nur in sehr wenigen Einzelfällen beobachtet. **Hinweise:** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, Liste A+.

Stand der Information: Dezember 2000, © OXYCONTIN ist eine registrierte Marke. TM: PainControlling und The PainController sind Marken.



Mundipharma Medical Company
Hamilton/Bermuda
Zweigniederlassung Basel
St. Alban-Rheinweg 74
CH-4006 Basel
T +41 61 205 11 11
F +41 61 205 11 87
www.mundipharma.ch
www.oxycontin.ch