

<b>Zeitschrift:</b>	Physioactive
<b>Herausgeber:</b>	Physioswiss / Schweizer Physiotherapie Verband
<b>Band:</b>	51 (2015)
<b>Heft:</b>	4
<b>Artikel:</b>	Verminderte Leistungsfähigkeit des "STarT Back Tool" = Baisse d'efficacité du "STarT Back Tool" = Diminuzione dell'efficacia dello "STarT Back Tool"
<b>Autor:</b>	Scascighini, Luca
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-929000">https://doi.org/10.5169/seals-929000</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 20.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## Verminderte Leistungsfähigkeit des «STarT Back Tool»

## Baisse d'efficacité du «STarT Back Tool»

## Diminuzione dell'efficacia dello «STarT Back Tool»

Häufig stellt man sich als Praktiker die Frage, ob die akuten Rückenschmerzen eines Patienten chronifizieren werden oder nicht. Ein ungünstiger Verlauf wirkt sich in erster Linie stark auf die Lebensqualität des Patienten aus, hat aber auch Effekte auf der gesellschaftlichen Ebene. Deshalb muss man alles daransetzen, um die Entwicklung von chronischen Schmerzen zu verhindern. In Zukunft wird es aufgrund des stetigen Kostendrucks immer wichtiger werden, spezifische, intensivere Behandlungen im Sinne einer sekundären Prävention für diejenigen Patienten anzubieten, die es am ehesten nötig haben.

Um das Chronifizierungsrisiko abzuschätzen, gibt es das neun Items umfassende «STarT Back Screening Tool»<sup>1</sup>. Dieses wurde nun von Wolf Mehling (University of California) und Kollegen mit einer prospektiven Studie überprüft [1].

In die Studie eingeschlossen wurden Patienten ( $n=606$ ), die seit weniger als einem Monat über lumbale Schmerzen klagten. Über die Definition von chronischen Schmerzen gibt es keinen Konsens. Es wurden in dieser Studie jedoch sehr klare Kriterien angewendet, die nach sechs Monaten und zwei Jahren erfasst wurden:

**E**n tant que praticien, on se demande souvent si le mal de dos aigu d'un patient deviendra chronique ou non. Une évolution défavorable engendre avant tout des répercussions fort négatives sur la qualité de vie du patient mais aussi des effets sur le plan social. C'est pourquoi nous devons prévenir au mieux la chronicisation des douleurs. La pression permanente sur les coûts de la santé fait qu'il deviendra de plus en plus important de proposer aux patients qui en ont besoin des traitements spécifiques plus intenses pour prévenir ce passage à la chronicité.

Le «STarT Back Screening Tool», un questionnaire qui comprend neuf items<sup>1</sup>, permet d'évaluer le risque de voir le mal de dos devenir chronique. Il a été testé par Wolf Mehling et ses collègues (Université de Californie) [1].

Il ont effectué une étude prospective qui a porté sur des patients ( $n=606$ ) se plaignant de douleurs lombaires depuis moins d'un mois. Il n'y a pas de consensus sur la définition de douleurs chroniques. Toutefois, des critères très clairs ont été appliqués lors de cette étude; ils ont été évalués au bout de six mois et deux ans:

- Roland Morris Disability Questionnaire  $\geq 7/24$

**I**n qualità di fisioterapisti, ci domandiamo spesso se il mal di schiena diverrà o meno cronico. Un'evoluzione sfavorevole ha, innanzitutto, delle ripercussioni negative sulla qualità di vita del paziente e, secondariamente, degli effetti sul piano sociale. E' per questo che dobbiamo prevenire al meglio la chronicizzazione dei dolori. La continua pressione sui costi della salute ci porta a proporre ai pazienti che necessitano di cure mirate, dei trattamenti specifici più intensi con lo scopo di prevenire questo passaggio alla chronicità.

Lo «STarT Back Screening Tool», questionario che comprende nove items<sup>1</sup>, permette di valutare il rischio di chronicizzazione del mal di schiena. E' stato esaminato da Wolf Mehling e i suoi colleghi (Università della California) [1].

I ricercatori hanno effettuato uno studio prospettivo su pazienti ( $n=606$ ) con dolori lombari da meno di un mese. Non vi è un consenso generalizzato sulla definizione di dolore cronico. Ciononostante, durante questo studio sono stati applicati dei criteri molto chiari; sono stati valutati poi dopo 6 e 24 mesi:

- Roland Morris Disability Questionnaire  $\geq 7/24$
- Chronic Pain Risk  $\geq 2/4$

<sup>1</sup> [www.keele.ac.uk/sbst](http://www.keele.ac.uk/sbst)

<sup>1</sup> [www.keele.ac.uk/sbst](http://www.keele.ac.uk/sbst)

<sup>1</sup> [www.keele.ac.uk/sbst](http://www.keele.ac.uk/sbst)

- Roland Morris Disability Questionnaire  $\geq 7/24$
- Chronic Pain Risk  $\geq 2/4$
- Lack of perceived recovery  $\leq$  stark verbessert
- Schmerzintensität  $\geq 3/10$

Nach sechs Monaten hatten 22 Prozent der Patienten chronische Schmerzen und nach zwei Jahren 25 Prozent, dies war wesentlich weniger, als es das «STarT Back»-Instrument voraussagte (40 Prozent). Die Daten wurden statistisch geprüft, um die Leistungsfähigkeit des Instruments zu bestimmen (positive und negative Likelihood Ratio).

In dieser Stichprobe zeigte der «STarT Back»-Fragebogen nur eine schwache prädiktive Fähigkeit. Die Autoren raten deshalb, die Resultate des «STarT Back»-Instruments bei Patienten mit akuten Rückenschmerzen vorsichtig zu interpretieren. ■

*Luca Scascighini, MPtSc, BSc Physiotherapie, Manualtherapeut, arbeitet als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Tessiner Fachhochschule SUPSI DEASS und in einer multidisziplinären Physiotherapie Praxis in Lugano-Viganello.*

- Chronic Pain Risk  $\geq 2/4$
- Lack of perceived recovery  $\leq$  s'est beaucoup amélioré
- Intensité de la douleur  $\geq 3/10$

22 pour cent des patients se plaignaient de douleurs chroniques après six mois, 25 pour cent au bout de deux ans. Ce qui représente un chiffre fort inférieur à ce que prévoit le «STarT Back» (40 pour cent). Les données ont été contrôlées sur le plan statistique afin de déterminer le degré d'efficacité de cet outil (likelihood ratio positif et négatif).

Dans cet échantillon, le questionnaire «STarT Back» n'a révélé qu'une faible capacité prédictive. C'est pourquoi les auteurs conseillent d'interpréter avec prudence les résultats du «STarT Back» chez des patients atteints de mal de dos aigu. ■

*Luca Scascighini, MPtSc, BSc physiothérapie, thérapeute manuel, chargé de cours et chercheur à la Haute École spécialisée tessinoise (SUPSI DEASS) et dans un cabinet multidisciplinaire de physiothérapie à Lugano-Viganello.*

- Lack of perceived recovery  $\leq$  molto migliorato
- Intensità del dolore  $\geq 3/10$

Il 22 % dei pazienti lamentava dolori cronici dopo 6 mesi, il 25 % dopo i due anni. Questo rappresenta un valore molto minore di quello previsto dallo «STarT Back» (40 %). I dati sono stati controllati sul piano statistico per determinare il grado d'efficacia di questo strumento (likelihood ratio positivo e negativo).

In questo ambito, il questionario «STarT Back» ha dimostrato una debole capacità predittiva. E' per questo che gli autori consigliano d'interpretare con prudenza i risultati dello «STarT Back» nei pazienti che presentano un mal di schiena acuto. ■

*Luca Scascighini, MPtSc, BSc in fisioterapia, terapista manuale, docente-ricercatore alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI DEASS) e collaboratore in uno studio multidisciplinare di fisioterapia a Lugano-Viganello.*

#### Literatur | Bibliographie | Bibliografia

1. W.E. Mehling, A.L. Avins, M.C. Acree, T.S. Carey, F.M. Hecht: Can a back pain screening tool help classify patients with acute pain into risk levels for chronic pain? European Journal of Pain, 19 (2015) 439–446.

# CALL FOR ABSTRACTS

**Einsendeschluss:** 30. September 2015



**PHYSIOSWISS  
CONGRESS  
BASEL** 17.–18. JUNI 2016