

Zeitschrift: Pestalozzi-Kalender
Herausgeber: Pro Juventute
Band: 6 (1913)
Heft: [1]: Schülerinnen

Rubrik: Geometrie

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Geometrie.

Formeln zur Inhaltsberechnung von Flächen und Körpern.

Dreieck.

Fig. 1



Grundlinie = g ; Höhe = h ; Fläche = F


$$F = \frac{g \times h}{2} = \frac{g}{2} \cdot h = \frac{h}{2} \cdot g;$$

$$g = \frac{2F}{h}; \quad h = \frac{2F}{g}$$

$$\angle \alpha + \angle \beta + \angle \gamma = 180^\circ = 2R.$$

Gleichseitiges Dreieck.

Fig. 2



Seiten = $a = b = c$, $\angle \alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$


$$F = \frac{a^2}{4} \sqrt{3} = 0,433 a^2$$

(genauer $0,4330127 a^2$)

$$h = \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}} = \sqrt{a^2 - \frac{c^2}{4}};$$

Gleichschenkliges Dreieck.


Fig. 3.



Grundlinie = a ; gleiche Seiten = b

$$F = \frac{a}{4} \sqrt{(2b+a)(2b-a)} = \frac{a}{2} \sqrt{\left(b + \frac{a}{2}\right)\left(b - \frac{a}{2}\right)}$$

Fig. 4.




Ungleichseitiges Dreieck.

Seiten a, b und c , $s = \frac{a+b+c}{2}$;

$$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Fig 5




Rechtwinkliges Dreieck. $\angle \alpha = 90^\circ$

Hypotenuse = a ; Katheten = b und c ,

$$F = \frac{b \cdot c}{2}; \quad a^2 = b^2 + c^2; \quad a = \sqrt{b^2 + c^2};$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2}; \quad c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

Fig. 6




Quadrat

Seite = a ; Diagonale = D ;

$$F = a \times a = a^2 \quad a = \sqrt{a^2}$$

$$D = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2} = a \cdot 1,4142.$$


Fig. 7

Rechteck.Seiten a und b , Diagonale D ;

$$F = a \cdot b, \quad a = \frac{F}{b}, \quad b = \frac{F}{a};$$


$$D = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Fig. 8

Parallelogramm.Grundlinie = g Höhe (rechtwinklig auf Grundlinie) = h


$$F = g \cdot h, \quad g = \frac{F}{h}, \quad h = \frac{F}{g};$$

Fig. 9

Rhombus.Gleiche Seiten a , Diagonalen D_1 u. D_2 .


$$F = a^2 \cdot \sin \alpha, \quad F = \frac{D_1 \cdot D_2}{2};$$

Fig. 10

Trapez.Parallelseiten = G und g , Höhe = h Diagonalen = D_1 und D_2


$$F = \frac{G + g}{2} \cdot h;$$

Fig. 11

Trapezoid.Diagonale $\overline{AC}$ und rechtwinklig darauf die Höhen h_1 und h_2

$$F = \frac{\overline{AC}}{2} \cdot (h_1 + h_2) = \frac{e}{2} \cdot (h_1 + h_2).$$

Fig. 12

Seite = S Radius des umschriebenen Kreises = R ;
Radius des eingeschriebenen Kreises = r .Reguläre Vielecke (Polygon)

Polygon	R	r	S	F
Dreieck	0.577 S	0.289 S	1.732 R od. 3.463 r	0.433 S^2 od. 1.299 R^2
Quadrat	0.707 S	0.500 S	1.414 R " 2.000 r	1.000 S^2 " 2.000 R^2
Fünfeck	0.851 S	0.695 S	1.776 R " 1.453 r	1.721 S^2 " 2.378 R^2
Sechseck	1.000 S	0.866 S	1.000 R " 1.155 r	2.598 S^2 " 2.598 R^2
Siebeneck	1.152 S	1.038 S	0.868 R " 0.963 r	3.364 S^2 " 2.736 R^2
Achteck	1.307 S	1.208 S	0.765 R " 0.828 r	4.828 S^2 " 2.828 R^2
Neuneck	1.462 S	1.374 S	0.684 R " 0.728 r	6.182 S^2 " 2.892 R^2
Zehneck	1.618 S	1.540 S	0.618 R " 0.649 r	7.694 S^2 " 2.929 R^2
Elfleck	1.775 S	1.704 S	0.563 R " 0.587 r	9.366 S^2 " 2.973 R^2
Zwölfeck	1.932 S	1.866 S	0.518 R " 0.536 r	11.190 S^2 " 3.000 R^2

Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18



Unregelmässige Vielecke od Flächen:

Fläche kann bestimmt werden durch Zerlegung des Vielecks in Dreiecke mittelst Diagonalen und Summierung der ermittelten Dreiecksflächen, oder durch Einteilung in Trapeze u. Dreiecke vermittelt der Koordinaten der Eckpunkte auf eine rechtwinklig gewählte Axe. Fig. 13

Durch Zerlegung in parallele Streifen gleicher Breite Fig. 14

$$F = x \cdot (h_1 + h_2 + \dots + h_n)$$

Kreis:

Durchmesser = d ; Radius = r

Umfang = p ; Inhalt = F .

$$p = d \cdot \pi = d \cdot 3.14159$$

$$= 2r \pi;$$

$$F = \frac{d^2 \pi}{4} = 0.785 d^2 = r^2 \pi.$$

$$r = \sqrt{\frac{F}{\pi}} = 0.564 \sqrt{F};$$

$$d = 2 \sqrt{\frac{F}{\pi}} = 1.128 \sqrt{F}.$$

Kreissector: (A.B.C) Fig. 16.

Radius = r ; Bogen = b ;

Zentriwinkel = n ;

$$F = \frac{r^2 \pi \cdot n}{360} = \frac{b \cdot r}{2}.$$

$$r = \sqrt{\frac{F}{\pi}} \cdot \frac{360}{n} = \frac{b}{\pi} \cdot \frac{180}{n};$$

$$n = 360 \cdot \frac{F}{r^2 \pi} = \frac{b}{r \pi} \cdot 180$$

$$b = 2 r \pi \frac{n}{360} = r \pi \cdot \frac{n}{180}.$$

Halbkreisbogen = $b = \pi \cdot r$.

Halbkreisfläche = $F = \frac{\pi \cdot r^2}{2}$.

Viertelkreisbogen = $b = \frac{\pi \cdot r}{2}$.

Viertelkreisfläche = $F = \frac{\pi \cdot r^2}{4}$.


Kreisabschnitt:

Sehne = s Höhe = h . $F = \frac{2}{3} s \cdot h$.

$$\text{genau. } F = \frac{r^2 \pi n}{360} - \frac{1}{2} s \sqrt{r^2 - \frac{1}{4} s^2} = \frac{b r - s(r-h)}{2}$$

$$s = 2 \sqrt{h(2r-h)} \quad r = \frac{s^2}{8h} + \frac{h}{2}.$$

Fig 19.

Kreistring:Äusserer Radius = R ;Innerer Radius = r


$$F = R^2 \pi - r^2 \pi.$$

$$= \pi (R+r) (R-r).$$

wenn d = radiale Breite des Kreistrings,

$$\text{so ist } F = \pi (2r+d) d.$$


Fig. 20

Kreistringstück: (Konzentrisch)Äusserer Radius = R Innerer Radius = r Zentriwinkel = n .

$$F = (R^2 \pi - r^2 \pi) \frac{n}{360} = (R^2 - r^2) \cdot \frac{\pi \cdot n}{360}$$


$$= (R+r) d \frac{\pi \cdot n}{360} = (R+r) d \cdot n \cdot 0.0087.$$

Fig. 21

Ellipse:Halbe Achsen der Ellipse = a und b


$$F = a \cdot b \cdot \pi;$$

Fig 22

Elliptischer Ring:Halbe Achsen der äussern Ellipse a, b ,
Halbe Achsen der innern Ellipse m, n

$$F = \pi (ab - mn).$$

Fig 23.


Parabelsegment ECF:

$$F = \frac{2}{3} s \cdot h, \quad s = EF.$$

Parabelfläche CAC':


$$F = \frac{2}{3} CC' \cdot AB.$$

Fig 23a

Hyperbelsegment ABCSehne = a . Höhe = b

$$F (\text{annähernd}) = \frac{3}{5} b \cdot a.$$

Fig. 24


Würfel:Seite = S ; Inhalt = K ; Oberfläche = O ;

$$K = S^3; \quad O = 6S^2;$$

$$S = \sqrt[3]{K};$$


$$\text{Diagonale} = D = \sqrt{3}S^2 = S\sqrt{3} = S \cdot 1.732050$$

Fig. 25

Parallelepiped:Länge = l ; Breite = b ; Höhe = h ;

$$K = l \cdot b \cdot h.$$


Fig. 26

Prisma:Grundfläche = G ; Höhe = h ;

$$K = G \cdot h;$$

Oberfläche O = Umfang der Grundfläche $U \times h + 2G$.


Fig. 27

Schiefabgeschnittenes Prisma:Flächeninhalt des senkrechten Querschnittes = G .Länge der Kanten: $h, h_1, h_2, h_3, \dots, h_n$

$$K = G \times \frac{h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_n}{n}$$

Bei mehr als 3 Kanten ist das Prisma regelmässig oder hat dasselbe wenigstens Axensymmetrie.


Fig. 28

Pyramide:Grundfläche = G ; Höhe = h ;

$$K = \frac{G \cdot h}{3}; \quad h = \frac{3K}{G}.$$


$$G = \frac{3K}{h};$$

Fig. 29

Abgestumpfte Pyramide:Inhalt der beiden Grundflächen = G u. g .


$$K = \frac{h}{3} \cdot (G + g + \sqrt{G \cdot g})$$

Fig. 30

Obelisk, Wall, regelmässig aufgeschütteter Haufen.

$$K = \frac{1}{6} h [(2a + a_1)b + (2a_1 + a)b_1]$$

Fig 31




Cylinder, (Walze)

$$K = r^2 \pi \cdot h \quad \text{Mantel} = 2 r \pi \cdot h$$

$$r = \sqrt{\frac{K}{\pi \cdot h}}; \quad h = \frac{K}{r^2 \pi}$$

$$\text{Mantel} = 2 r \pi \cdot h.$$

Fig 32




Schiefgeschnittener Cylinder

Grösste Höhe = H ; kleinste Höhe = h ;

$$K = r^2 \pi \cdot \frac{H+h}{2}$$

$$\text{Mantel} = \pi r (H+h)$$

Fig 33



Hohlcyylinder:


Innerer Halbmesser = b

äusserer Halbmesser = a , Länge = h ,

$$K = \pi \cdot h (a+b) \cdot (a-b)$$

$$K = \pi \cdot h (a^2 - b^2)$$

Fig 34



Cylinderhuf:


Radius der Grundfläche = r

Höhe des Hufes = h

$$K = \frac{2}{3} r^2 h$$

$$M = 2 r \cdot h.$$

Fig 35



Kegel.

Halbmesser der Grundfläche = r

Höhe = h , Seite = S

$$S = \sqrt{r^2 + h^2}$$


$$\text{Mantel } M = r \pi \cdot S$$

$$\begin{aligned} \text{Ganze Oberfläche } O &= \pi \cdot r (r + \sqrt{r^2 + h^2}) \\ &= \pi r (S + r). \end{aligned}$$

$$K = \frac{1}{3} r^2 \pi \cdot h$$

$$r = \frac{\sqrt{3K}}{h\pi}, \quad h = \frac{3K}{r^2\pi}$$

Fig 36



Abgestumpfter Kegel


Halbmesser der Grundflächen R und r

Durchmesser der Grundflächen = D und d

$$K = (R^2 + r^2 + Rr) \frac{h \cdot \pi}{3} = \frac{D^2 + d^2 + D \cdot d}{12} \cdot h \pi.$$

$$\text{Mantel} = \pi S (R+r)$$

Fig. 37

Kugel:Radius = r ; Durchmesser = d

$$\text{Oberfläche } O = 4r^2\pi = d^2\pi.$$


$$= 12.566 r^2$$

$$\text{Inhalt } K = \frac{4}{3}r^3\pi = \frac{d^3\pi}{6} = \frac{0.5236}{3}d^3$$

$$K = 4.189 r^3 = 0.5236 d^3.$$


$$\text{Radius } r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{O}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3K}{4\pi}}$$

Fig. 38

Hohlkugel:Äusserer Radius = R innerer = r ." Durchmesser = D " = d .

$$K = \frac{4\pi}{3}(R^3 - r^3) = \frac{\pi}{6}(D^3 - d^3).$$


Fig. 39

Kugelsektor:Radius der Kugel = r Begrenzende Kugelkappe: Höhe = h " " Durchmesser = c

$$\text{Oberfläche} = \frac{\pi r}{2}(4h + c)$$

$$K = \frac{2}{3}r^2\pi h = 2.0944 r^2 h.$$


Fig. 40

Hohlkugelsektor:Äusserer Radius = R , innerer = r Wanddicke = s ; $R = r + s$.

$$r = \frac{s^2 + 4h^2}{8h}$$

$$\text{Inhalt } K = 2.094 \frac{h}{r} (R^3 - r^3).$$

Fig. 41


Kugelsegment:Radius der Kugel = r .Kalottendurchmesser = c Höhe = h Gewölbte Oberfläche = O

$$O = 2r\pi h = \pi\left(\frac{c^2}{4} + h^2\right).$$

$$K = \frac{1}{6}\pi h(3c^2 + h^2) = \frac{1}{3}\pi h^2(3r - h).$$

$$= \pi h^2\left(r - \frac{1}{3}h\right) = \pi h\left(\frac{c^2}{8} + \frac{h^2}{6}\right).$$

Fig. 42

Kugelzone:Höhe der Zone = h Halbmesser der Kugel = r Halbmesser der Endflächen a und b Mantel = $2r\pi h$.

$$\text{Oberfläche} = M + a^2\pi + b^2\pi.$$

$$\text{Inhalt } K = \frac{1}{6}\pi h(3a^2 + 3b^2 + h^2).$$

Fig 43




Fig. 44




Fig 45




Fig 46




Fig 47




Fig. 48




Fig. 49





Fig. 50



Cylindrischer Ring.

Radius des kreisförm. Querschnittes = r

Durchmesser des Ringes = D

Radius des Ringes = R . siehe Figur.

$$K = 2\pi^2 R r^2 = 2.467 D d^2$$

$$\text{Oberfläche } O = 4\pi^2 R r = 9.87 D d$$

Kübel

Die Endflächen sind Ellipsen mit den Halbachsen a, b und a, b ,

Höhe zwischen den Endflächen = h

$$\text{Inhalt } K = \frac{1}{6} \pi h [2(ab + a, b) + ab + a, b]$$

Ellipsoid

Bezeichnung der 3 Halbachsen = a, b, c .

$$\text{Inhalt } K = \frac{4}{3} \pi \cdot a \cdot b \cdot c$$

Fass

Spunddurchmesser = D

Bodendurchmesser = d

Höhe = h (resp Länge)

$$\text{Inhalt } K = 1.0453 h (0.4 D^2 + 0.2 D d + 0.15 d^2)$$

Reguläre Polyeder:

Tetraeder: (4 gleichseitige Dreiecksflächen)

Länge der Kante = a , $O = a^2 \sqrt{3} = 1.732 a^2$

$$K = \frac{1}{12} a^3 \sqrt{2} = 0.11785 a^3$$

Oktaeder. (8 gleichseit. Dreiecksflächen)

Kante = a , $O = 2a^2 \sqrt{3} = 3.464116 a^2$

$$K = \frac{a^3}{3} \sqrt{2} = 0.4714045 a^3$$

Dodekaeder (12 regelmässige Fünfecke)

Kante = a ; $O = 3a^2 \sqrt{25 + 10\sqrt{5}}$
 $= 20.645729 a^2$

$$K = \frac{a^3}{4} (15 + 7\sqrt{5}) = 7.663119 a^3$$

Ikosaeder 20 gleichseitige Dreiecksflächen.

Kante = a , $O = 5a^2 \sqrt{3} = 8.6602545 a^2$

$$K = \frac{5}{12} a^3 (3 + \sqrt{5}) = 2.181695 a^3$$