Zeitschrift: Prisma: illustrierte Monatsschrift für Natur, Forschung und Technik

Band: 1 (1946)

Heft: 12

Artikel: Pilzringe und Fruchtmumien

Autor: Gast, Albert

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-654266

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

faßt gewesen, einen schönen blaugrünen Kalkstein zu finden und nun biß er auf Quarz. So eine Tücke! Ein anderer aber, der darauf eingerichtet war, sich mit kieseligem Gestein auseinanderzusetzen, war an einem Kalkbrocken hängengeblieben und schwebte nun ebenfalls so gut wie im luftleeren Raum. Ebenso viele aber waren mit der richtigen Unterlage zusammengetroffen und hatten deswegen nicht im geringsten zu klagen.

Wie herrlich sproßt zum Beispiel auf allen granitenen und porphyrenen Mauersteinen die rührige Landkartenflechte auf, deren dichtanliegende, leuchtend gelbgrüne Kruste von den zahllosen schwarzen Linienkritzeln der Sporenfrüchte wie von Landkartenwegen durchzogen ist! Nicht, daß sie irgendwelche Fugen und Einschlupfröhren gefunden hätte. Aber sie begann aus ihren verknäuelten Fäden einen säurehaltigen Saft auszuscheiden und löste damit die Kieselsubstanz, ja selbst den Glimmer unter sich auf. In die winzigen Gruben und Gänge, die so entstanden, schloff sie immer tiefer hinein und zerklüftete so das Gestein, während ihre Rasen immer prächtiger in die Breite wuchsen und bald die Größe von Rappenstücken erreichten.

Auch der blaßgrünen Scheibenflechte ging es auf den Urgesteinen der Mauer nicht schlecht, und neben ihnen sah man die hellgrau bereiften Krusten der blasigen Nabelflechte, sehr zierliche Schüsselflechten, tiefschwarze Tintenflechten und sogar die ockergelben Zwergsträuße der Federbuschflechte erscheinen.

Ebenso üppig ging es auf den Kalksteinen zu, ja ihre Besiedlung schien noch wesentlich rascher vorwärte zu schreiten, wenn auch die Zahl der erscheinenden Formen bescheidener war und sich im wesentlichen auf die dünnen Überzüge einer bald grauen, bald weißlichen oder rosafarbigen Warzenflechte beschränkte. Im Fortschreiten nach der Tiefe schienen sie unnachahmlich tüchtig zu sein; ein paar Jahre nach dem ersten Erscheinen hatten sie schon mikroskopische Löcher gebohrt, die sie mit ihrer zerstörenden Watte angefüllt hatten, und langsam fraßen sie von hier aus unterirdisch nach den Seiten hin weiter. Ehedem blanke Flächen wurden von ihrer Minierarbeit rauh, ja an einzelnen Stellen haben sie den Zerfall schon soweit gefördert, daß in den winzigen Tälchen die ersten Moose Fuß gefaßt haben.

Alles in allem ist dieser Überzug von Leben, den sich die Mauer seit ihrem Bestehen zugelegt hat, noch taufein und lückenhaft, und nur an den Stellen dauernder Feuchtigkeit, wo das Wirken der kleinen Wesen nie stillstehen muß, springt er als farbiger Hauch in die Augen. Noch ein paar Jahre aber werden genügen, um ihn dichter zu fügen, und was wird in einigen tausend oder zehntausend Jahren aus den Steinen geworden sein? – Staub wird aus ihnen geworden sein, Ackerkrume, Sandgeriesel und Staub!

Der Abdruck dieses Artikels wurde uns in freundlicher Weise vom Albert Müller Verlag in Rüschlikon gestattet. Er stammt aus dem demnächst erscheinenden Buche «Der Herr der Welt inkognito»

Pilzringe und Fruchtmumien

Von Dr. Albert Gast

Unter den Parasiten, die alljährlich an unseren Obstbäumen empfindlichen Schaden anrichten, finden sich verschiedene Pilze aus der Gattung Monilia. Monilia einerea, ein spezieller Schädling an Sauerkirschen, dringt zur Blütezeit durch die Narbe in die Blüten ein und bringt diese zum Absterben, dadurch wird der Fruchtansatz des Baumes schwer geschädigt. In der Folge können von den infizierten Blütenbüscheln aus auch die Zweige ergriffen werden, die schließlich abdorren.

Auffälliger als der Befall der Blüten und Zweige ist die Moniliafruchtfäule, die an Stein- und Kernobst durch verschiedene Moniliapilze verursacht wird. Ein sehr wichtiger Schädling an Äpfeln, Birnen, besonders aber an Zwetschgen ist Monilia fructigena. Die Krankheit beginnt im Laufe des Sommers und kann bis zum Herbst einen bedeutenden Teil der Ernte vernichten. Den Ausgangspunkt der Infektion bilden Verletzungen der Frucht, zum Beispiel Fraßstellen von Wespen, Bohrlöcher von Obstmaden, Hagelwunden,

aufgerissene Schorfflecken usw. Regen, Wind oder Insekten tragen die Sporen auf die Früchte. Das erste Anzeichen der Infektion ist ein brauner Fäulnisfleck, auf dem bald ein Ring von blaß gelb





Bild 1: Anfangsstadium der Moniliafäule auf Apfel. Im Zentrum der beiden Ringe von Sporenpolstern ist das Eintrittsloch einer Obstmade sichtbar. Nach einer Zeichnung von Dr. Albert Gast.



oder schmutzig weiß gefärbten Sporenpolstern entsteht (Bild 1). Im Verlaufe des weiteren Wachstums des Parasiten entwickelt sich das charakteristische Fäulnisbild, das durch viele konzentrisch um die Infektionsstelle gelagerte Ringe von Sporenlagern gekennzeichnet ist (Bild 2). In diesen polsterförmigen Lagern entstehen in perlschnurartiger Anordnung ungeheure Mengen von Sporen, welche die Krankheit weitertragen. Auffällig ist, daß bei der Moniliafäule die befallenen Früchte vielfach nicht abfallen, sondern am Baume hängen bleiben, wo sie eintrocknen und Fruchtmumien bilden (Bild 3). Diese Mumien enthalten ein sehr widerstandsfähiges Gewebe des Pilzes, das den Winter überlebt, im nächsten Sommer wiederum Sporen bildet und dadurch Ausgangspunkt neuer Infektionen ist. Eine weitere Erscheinungsform der Moniliafäule kann man an eingekellertem Obst

Bild 2: Fortgeschrittens Stadium der Fäulnis auf Quitte. Photo Bertolf

Bild 3 unten: Fruchtmumien von Pfirsichen. Eine Folge des Moniliabefalls. Photo Dr. Albert Gast.

beobachten. Die auffällige Schwarzfäule der Äpfel - eine tiefschwarze Färbung der Früchte - ist eine der ersten Fäulniserscheinungen des Lagerobstes und hat ihre Ursache ebenfalls in einer Moniliainfektion. Der Pilz durchwuchert das ganze Fruchtfleisch des Apfels, ist aber infolge des Lichtmangels im Keller nicht imstande, auf der Oberfläche die charakteristischen Sporenlager zu bilden. Das Ausbleiben der Sporenbildung im Dunkeln ermöglicht uns auch eine Erklärung des ringförmigen Erscheinens der Sporenlager. Es spiegelt sich darin der Wechsel zwischen Tag und Nacht wieder, indem nur während des Tages die Sporenbildung vor sich geht, bei Dunkelheit aber ausbleibt. Da die Infektion aber von einem Punkt ausgeht, muß dieser Wechsel zur Bildung der konzentrisch um die Infektionsstelle gelagerten Sporenringe führen.

Wichtige Maßnahmen im Kampf gegen die Moniliafäule sind das Vernichten der Fruchtmumien, sowie sorgfältige Spritzungen gegen Schorf und Obstmade. Dadurch werden gefährliche Infektionsherde beseitigt und das Entstehen der für das Eindringen des Pilzes notwendigen Verletzung verhindert.

