**Zeitschrift:** Archiv für Thierheilkunde

Herausgeber: Gesellschaft Schweizerischer Thierärzte

**Band:** 15 (1846)

Heft: 4

**Artikel:** Beitrag zur pathologischen Anatomie

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-588213

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Das Netz erschien geröthet, ein gelbröthliches Serum darin angesammelt, das Gekröse am kleinen Bogen der dünnen Gedärme wässerig insiltrirt und das Fett schmiesrig, die Leber angeschwollen und die strotzende Gallenblase mit gelber, aufgelöster Galle erfüllt. Der Pförtner des Labes war stark angeschwollen, und beim Aufschneiden zeigte sich die Schleimhaut des letztern wulstig, besonders waren ihre Falten stark erystpelatös angeschwollen, so daß der Magen fast gänzlich damit ausgesüllt wurde. Die Schleimhaut in den dünnen, so wie in den dicken Därmen erschien stellenweise in ähnlichem Zustande wie die des Labes.

## XI.

# Beitrag zur pathologischen Anatomie. Von demselben.

Ein barhämiges, ¾ Jahre altes Schwein soll seit früher Jugendzeit öfters streng geharnt haben, worauf sich manchmal die Harnbeschwerde ordentlich besserte. Gegen die Barhämigkeit wurde Fischthran innerlich und äußerlich mit Zusatz von Salmiakgeist mit günstigem Erfolge angewendet, nur die Beine blieben krumm. Gegen das Harnleiden wurde nichts gethan, und erst Ende August mußte ich das Thier wegen diesem untersuchen. Dasselbe fand ich in einem abgezehrten Zustande; durch den gespannten Bauch durch konnte

man die große, gefüllte Urinblase fühlen, und auf einen Druck auf dieselbe fing das Schwein einen trüben, weißen, übelriechenden harn zu entleeren an. Für unheilbar erflärt, wurde dasselbe 2 Tage später, als der Karn roth zu werden anfing, getödtet. Bei der Sektion erschien die Blase ungewöhnlich groß, ihre Fasern dick, strangen= artig, und die häute waren 1/2 Zoll dick. Die Schleim= haut der Blase zeigte sich geröthet, exodirt, und am Grunde derselben waren 2 große angeätzte Stellen mit Blutklümpchen bedeckt; der Harn oben auf zähe, dick weißlich und unten im Grunde der Blase röthlich, gleich= fam firschbraun. Die Nieren waren ebenfalls vergrößert, bleich, knotig, beinahe ohne Rindensubstanz, und die Röhrensubstanz war ganz zu einer dicken fibrösen haut umgewandelt, wodurch die Nieren innen ganz hohl er= schienen, und mit zäher, sandiger Flüssigkeit angefüllt waren. Die Harnleiter waren bis zur Größe eines dunnen Darmes erweitert und die Häute bedeutend verdickt. Die hohlen Nieren und die Harnleiter wogen zusammen 21/2 Pfund und die leere Harnblase allein 2 Pfund.