Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 82 (1940)

Heft: 7

Artikel: Notes de parasitologie et de technique parasitologique

Autor: Galli-Valerio, B.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-590576

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

SCHWEIZER ARCHIV FÜR TIERHEILKUNDE

Herausgegeben von der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte

LXXXII. Bd.

Juli 1940

7. Heft

Institut d'hygiène et parasitologie de l'Université de Lausanne.

Notes de parasitologie et de technique parasitologique.

Par B. Galli-Valerio.

(Avec une figure.)

Au moment de quitter définitivement l'institut que j'ai dirigé pendant 42 ans, j'ai groupé ensemble une série d'observations parasitologiques, faites sur animaux domestiques et sauvages et non encore publiées. Elles constituent une contribution à l'étude de la distribution géographique des parasites en Suisse et à l'intéressant problème de ce que j'ai appelé le cantonnement du parasitisme¹), qui a une si grande importance pour expliquer la localisation de certaines maladies et la possibilité de leur diffusion depuis l'endroit infecté. Elles sont aussi intéressantes au point de vue de l'étude de l'association des parasites, de leur rôle dans la destruction du gibier et des animaux sauvages en général et elle démontrent quels sont les dangers de ce qu'on appelle le repeuplement, quand il est pratiqué avec des animaux infectés. Son rôle est bien souvent plus nuisible qu'utile, car on introduit des parasites qui étaient inconnus dans l'endroit qu'on veut repeupler, et ces parasites agissent avec une violence extraordinaire sur des animaux qui n'en avaient jamais subi l'action de sorte que repeuplement devient synonyme de dépeuplement. Intéressants aussi, sont plusieurs cas de parasitisme en transit c'est-à-dire passage de parasites dans l'intestin d'animaux qui ont mangé du matériel contenant ces parasites mais dont ils ne sont pas les hôtes, parasitisme en transit qui porte souvent à de faux diagnostics.

¹⁾ Revue suisse d'hygiène 1926, p. 35.

- A. Distribution géographique de quelques parasites1).
- 1. Artemisia campestris. Prassonny V. Larves d'Ixodinés sur les tiges.
- 2. Aphodius obscurus. Zà de Derbon V. Anguillula monilis Ham? Gamasidés. Anzeindaz Vd. Didymophyes leuckarti Marsch.
 - 3. Melolontha vulgaris (Larves). Bonvillars Vd. Mermis sp.
- 4. Pollenia rudis. Luan Vd. Herpetomonas polleniae. Galli-Valerio.
- 5. Limnaea stagnalis. Vidy Vd. Chaetogaster limnei Baer. Lac de Champex V. Cercaires armées.
 - 6. Bitynia tentaculata, Vidy Vd. Ch. limnei. Cercaires armées.
- 7. Phoxinus laevis. Lausanne. En avril 1939, une grave épidémie se manifeste dans un élevage de vairons. Les poissons meurent en masse, présentant à la surface du corps de petits boutons bruns, en dessous desquels il y a un matériel puriforme sanguinolent. Dans ce matériel il y a un grand nombre de bacilles plutôt courts, mobiles et Gramnégatifs. Ces bacilles cultivent très bien en aërobiose sur tous les milieux de culture, à des températures de 20° et de 37°. Sur agar incliné, ils donnent des cultures abondantes, légèrement bosselées et présentant une légère pigmentation rose. En agar par piqure, culture abondante, bosselée en surface, très faible développement en profondeur, à coloration rose très nette. En bouillon, trouble uniforme sans voile et avec dépôt rose au fond. Sur pomme de terre culture très abondante bosselée d'une teinte rosée. Dans le lait coagulation avec liquide qui surnage rose. En gélatine, liquéfaction en nappe avec coloration rose du dépôt. Le pigment diffuse très peu dans le milieu. Toutes ces cultures sont formées par un bacille plutôt court, très mobile par présence d'un cil polaire et absolument Gramnégatif.

Avec une culture en bouillon j'ai inoculé 1 cc. dans les muscles du côté gauche, sous la nageoire dorsale, à des Cyprinidés: Cyprinus carpio, Carassius auratus, Tinca vulgaris, Leuciscus rutilus et à un salmonidé: Trutta lacustris. Une Tinca vulgaris a reçu per os 1 cc. de la même culture.

La tanche infectée per os, est morte après deux jours sans lésions visibles, mais avec de nombreux bacilles identiques aux ingérés, localisés dans le foie. Plusieurs étaient conténus dans de gros phagocytes.

Des poissons inoculés. T. lacustris est morte après 3 jours, C. auratus après 8 jours, T. vulgaris après 9 jours, C. carpio après 21 jours et Leuciscus rutilus après 23 jours. Tous ont présenté au point inoculé une lésion caractérisée: chez la truite par une tuméfaction, chez le poisson rouge par un abcès entouré d'une infiltration hémorragique occupant tout le côté inoculé, chez la tanche par une tuméfaction rouge comme une pièce de 5 centimes, chez la carpe par

¹⁾ V = Valais. Vd. = Vaud. Fr. = Fribourg.

un fort oedème, chez le gardon par un abcès. Dans toutes ces lésions, il y avait un pus fluide, sanguinolent rempli des bacilles typiques, plusieurs phagocytés et en partie réduits en granulations. Tous ces poissons présentaient hypérémie du foie, de la rate et des reins et, surtout dans la rate, on trouvait le même bacille en grande quantité. Chez le gardon, l'abcès musculaire avait percé dans la cavité générale du corps, qui était remplie de pus fluide, sanguinolent, avec de nombreux bacilles libres ou phagocytés.

Cette affection des vairons, qui présente le type d'une furonculose, est donc facilement transmissible non seulement aux cyprinidés mais même aux salmonidés. L'infection peut avoir lieu par lésions cutanées ou per os. Les vairons infectés, peuvent donc jouer un rôle important dans la dissémination de cette furonculose, si analogue à la furonculose des truites. La truite semble même plus sensible à l'infection que les cyprinidés. En effet elle a succombé dans un espace de temps plus court.

Dans quel groupe faut-il placer le bacille que j'ai isolé? Ses caractères morphologiques et surtout la présence d'un cil polaire, sa Gramnégativité, l'aspect des cultures, parlent pour un bacille du groupe Pyocyanique-fluorescens liquefaciens. Il en diffère par son pigment c'est-à-dire qu'il y a absence complète de pigment bleu ou vert, tandis qu'il présente une pigmentation rose, telle qu'on la trouve aussi associée à la bleu, chez le B. pyocyaneum. L'absence complète d'une pigmentation brune, le sépare du B. salmonicida.

- 8. Gadus morrhua. Marché de Genève. Ascaris capsularia Rud.
- 9. Girardinus guppyi. Aquarium Lausanne. Nodule brun, comme tête d'épingle en arrière de la nageoire antérieure droite. Dans les frottis de ce nodule, il y a des spores du type Glugea, très analogues à celles de G. anomala Moniez du Gasterosteus aculeatus.
- 10. Ciprinus prasinus. Yverdon Vd. Sept exemplaires d'Hemiclepis marginata Müll. fixés à la partie dorsale et ventrale.
- 11. Perca fluviatilis Ouchy Vd. N.1 Ligula intestinalis Goeze. N.2 Acanthocephalus lucii Müll. Gland Vd. Henneguya sp. Cucullanus elegans Zed. Larves de Dibothriocephalus latus. L.
- 12. Esox lucius Rolle Vd. N.1 Triaenophorus nodulosus Pallas. Acanth. lucii Müll. N 2 Ac. lucii Müll. N.3 Lac de Bret Vd. Argulus foliaceus L.
- 13. Trutta lacustris. Vionnaz V. Très forte infection à Abothrium crassum Bloch, Echinorrhynchus truttae Schr. et larves de Bothrio-céphalidés dans les parois de l'estomac. Ces larves se rapprochent beaucoup de celles du Dib. latus, mais le bord de leurs anneaux est très saillant.
- 14. Trutta fario. Châteauneuf V. Ech. truttae Schr. Sion V. N.1 Neorhynchus rutili Müll. N.2 Ech. truttae Schr. La Glane Fr. Ascaris acus Bloch. Lac de Monsalvan Fr. Aboth. crassum Bloch Azygia lucii Müll.

- 15. Salmo salvelinus. Rolle Vd. Lernaeopoda salmonea Kroeyer. Piscicola geometra L.
 - 16. Coregonus fera. Genève. Triaen. nodulosus Pall.
 - 17. Bufo vulgaris. Lausanne. Angiostomum nigrovenosum L.
 - 18. Rana esculenta. Lausanne. Filaria rubella Rud.
- 19. R. temporaria. Riederalp V. Kystes à spores fusiformes. Nematoxis commutatus Rud. Opalina ranarum Ehr.
- 20. Vipera aspis. Fionnay V. Caryospora simplex Lég. Lac de Champex V. Idem. Orbe Vd. Idem.
- 21. Vipera berus. V. de Joux Vd. Eutrichomastix colubrorum Hamm.
- 22. Tropidonotus natrix. St-Gingolph V. Macrodera longicollis Abild.
- 23. Coelopeltis lacertina var. monspessulana. Montpellier. Ophionyssus natricis. Mégnin.
- 24. Boa constrictor. Chez un marchand de Lausanne. Bouche à fausses membranes grisâtres, formées par des filaments de fibrine et globules de pus avec beaucoup de bacilles Grampositifs, type Corynebacterium pseudo-diphtheriticum et des ambibes de 14—20—22 μ colorées en azur pâle par le Giemsa avec un noyau de 6—8 μ et 4 à 5 vacuoles.
 - 25. Lacerta muralis. Yvorne V. Karyolysus lacertarum Danil.
- 26. Testudo graeca. Genève. N.1 Atractis dactyluris. Rud. N.2 idem et Angusticoecum holopterum Rud.
- 27. Gallus domesticus. Düdingen Fr. Sarcomatose nodulaire du foie et de la rate, simulant des lésions tuberculeuses. Lausanne. N. 1. Epithelioma contagiosum forme diphtéritique. N. 2. 4 jeunes poules ayant succombé à une infection d'epithelioma contagiosum, présentant deux localisations: L'une aux paupières, dont les bords portaient une véritable couronne de pustules et l'autre à la gorge et à la trachée, sous forme de mucosités épaisses, visqueuses mais pas de fausses membranes. A l'examen microscopique des frottis de ces mucosités, j'ai constaté la présence de nombreux microcoques très gros et de gros bacilles, ainsi que de nombreux fragments d'Oscillariées à extrémités coupées nettes de 10 à 20 $\mu \times 2$ —3 μ . Elles présentaient un aspect rubané avec trabécules colorées en violet foncé par le Giemsa, séparées par des espaces clairs. Il s'agissait sans aucun doute de l'Alysiella filiformis G. Schmid, déjà signalée dans le pharynx des poules. Dans les cellules épitheliales, on constatait la présence de fines granulations violettes, présentant les caractères des corpuscules élémentaires de l'epithelioma. Château d'Oex Vd. Forte mortalité des poules surtout jeunes à Eimeria tenella Raill, et Lucet, Berne. Tuberculose nodulaire du foie.

- 28. Phasianus colchicus. Sion V. Heterakis gallinae Gmel. Capillaria longicolle Rud.
- 29. Lyrurus tetrix. Arête de Chaude Vd. Capillaria longicolle. Rud. Heterakis gallinae Gmel. Arpette V. Cap. longicolle Rud. Le Clou V. N. 1. Eimeria lyruri Galli-Valerio. N. 2. Féces à œufs et larves de Strongylidé (Ornithostrongylus?).
 - 30. Tetrao urugallus. Col de Jaman Vd. Cap. longicolle Rud.
- 31. Lagopus mutus. Arête du Zériet V. Heterakis gallinae Gmel. Dérotchaz V. Cap. longicolle Rud.
- 32. Perdix saxatilis. Haut Champeronne V. Ascaridia compar. Schr. Le Clou V. N. 1. Asc. compar Schr. Heterakis gallinae Gmel. N. 2. Eimeria tenella Raill. et Lucet. Tessin. N. 1. Asc. compar Schr. Eim. tenella Raill et Luc. Infection à Bacterium avicida. N. 2. Asc. compar. Schr. Het. gallinae Gmel. Capillaria longicolle Rud. Hymenolepis linea Goeze. N. 3. Eim. tenella Raill et Lucet. Yougoslavie importées au Tessin. Het. gallinae Gmel. Distomum lineola Dies. Lyperosomum plesiostomum v. Linst. Deux coccidies une ovoïde: Eim. tenella Raill et Lucet. l'autre cylindroïde de $24 \times 15 \mu$ donnant 4 sporoblastes de 7—9 μ , chacun avec 2 sporozoïtes piriformes et point de reliquat, se rapprochant d'E. lyruri Galli-Valerio.
- 33. Starna perdix. La Côte Vd. Epithelioma contagiosum à la base du bec et à une patte. Il y aurait eu plusieurs exemplaires infectés. J'avais déjà décrit cette lésion chez des perdrix grises importées à Martigny pour le repeuplement¹) et il est probable que l'affection ait été répandue par les perdrix importées.
- 34. Corvus corone. Lausanne. Hymenolepis serpentulus Schr. Capillaria contorta Crepl. Chailly s. Lausanne. Dilepis undula Schr. Diplotriaena tricuspis Fedsch. Bex. Lyperosoma longicauda. Rud. Acuaria cordata Müll. Capillaria contorta Crepl. Dans la bouche, bactéries du type pseudodiphtéritique. Jongny s. Vevey Vd. Syngamus trachea Mont. Fribourg. Hymenolepis serpentulus. Schr. Menopon mesoleucum N. Jor Vd. Porrocaecum ensicaudatum Zed.
 - 35. Pica rustica. Lausanne. Dilepis angulata Rud. Céry Vd. Idem.
- 36. Nuciphraga caryocatactes. Zermatt. Hymenolepis serpentulus Schr.
- 37. Pyrrhocorax alpinus. Montreux. Perforation de l'intestin avec péritonite et un exemplaire d'Acuaria anthuris. Rud dans l'abdomen. Dans intestin: Dilepis undula. Schr. Rochers de Naye. N. 1. Forte hypérémie de l'intestin avec de nombreux filaments de $54-60-120-150~\mu$ immobiles, divisés transversalement par des trabécules. Colorés par le Giemsa 1:20, présentent des espaces clairs, fixés à la formaline 4% et colorés par la méthode de Möller pour les spores, présentent des spores colorées en rouge. Ces éléments présentent les caractères d'oscillariées et me semblent se rapprocher

¹⁾ Cent. f. Bakt. I. Abt. Orig. Bd. 135, 1935, p. 325.

du genre Alysiella Lang¹). Ce chocard qui était mort dans des convulsions, présentait forte hypérémie du système nerveux central avec vaisseaux gorgés de sang, presque tous avec forte infiltration périvasculaires. Au niveau de l'écorce il y avait des hémorragies punctiformes. Les lésions étaient moins manifestes dans le cervelet, et dans la moelle où il n'y avait qu'engorgement des vaisseaux. Y-a-t'il eu un rapport entre oscillariées et encéphalite? C'est difficile de se prononcer, mais dans un second chocard mort dans la même zone et présentant les mêmes lésions du système nerveux central, je n'ai point trouvé d'oscillariées mais des Dilepis undula Schr. Dans les frottis du sang et des organes, il y avait des bâtonnets courts, par deux, Grampositifs. Ils cultivaient très bien à 37º donnant trouble uniforme sans voile, et dépôt blanchâtre au fond du bouillon, dans le lait à l'azolitmine, virage rougeâtre sans coagulation, sur agar légère couche grisâtre, dans gélatine pas de développement à 20° culture grisâtre à 37°. Ils ne liquéfiaient pas la gélatine. Sur pomme de terre, pas de culture visible. Dans les cultures le bacille présentait les mêmes caractères que dans l'organisme, il était immobile et formait des chaînettes de 4 à 5 éléments. L'inoculation d'une culture en bouillon à la dose d'1 cc. sous la peau d'un cobaye et d'1 cc. dans les pectoraux d'un pigeon, ont été complètement négatives. Monthey V. Plusieurs Acuaria anthuris Rud.

- 38. Passer domesticus. Lausanne. Capillaria angusta Duj. Lutry Vd. N. 1. Beaucoup d'Isospora lacazei Labbé. N. 2. Idem. N. 3. Hémosporidies de la malaria. Chamblandes Vd. Hymenolepis fringillarum Rud. Prosthogonimus cuneatus Rud. Fribourg. N. 1. Forte infection à Is. lacazei Lab. N. 2. Acuaria spiralis Molin.
 - 39. Chrysomitris spinus. Buchillon Vd. Is. lacazei Lab.
- 40. Fringilla coccothraustes. Sonchaud. Vd. Capillaria angusta Duj. Dans le tissu conjonctif entourant la trachée, 5 larves de Muscidés fixées avec leurs crochets. Douze anneaux à fines épines noires, stigmates à 2 fentes. Ces larves étaient gorgées de sang. Larves de Phormia? Il ne s'agit certainement pas d'un envahissement post mortem, car l'oiseau venait de succomber quand on l'a récolté.
 - 41. Alauda arvensis. St-Luc V. Beaucoup d'Is. lacazei Lab.
 - 42. Lanius collurio. Sempach. Menopon inaequale Piaget.
- 43. Merula nigra. Lausanne. N. 1. Capillaria exile Duj. Porrocaecum ensicaudatum Zed. Hémosporidies de la malaria. N. 2. Dilepis undula Sch. Harmostomum mesostomum Rud. Hémosporidies de la malaria. Rate très grosse et friable. N. 3. Dil. undula Schr. N. 4. Raillietina spinosissima v. Linst. N. 5. Porr. ensicaudatum Zed. Dil. undula Schr. Hémosporidies de la malaria. Rate énorme: 5 cent. × 5 mill. × 5 mill. N. 6. Porr. ensicaudatum Zed. Raill. spinosissima v. Linst. N. 7. Dilepis undula Schr. Isosp. lacazei Lab. Hémosporidies de la malaria. Rate de 5 cent. × ¼ de cent., très

¹⁾ Annales de parasitologie T. 1, 1923, p. 116.

- friable. N. 8. Porr. ensicaudatum Zed. Capillaria exile Duj. Hémosporidies de la malaria. Rate de $3\frac{1}{2}$ cent. \times 6 mill. Dans les frottis de la rate et de la moelle des os il y avait des Hémosporidies non pigmentées, correspondant probablement aux schizonts apigmentés que Kikuth et Mudrow¹) considèrent comme phases de transformation des sporozoïtes. N. 9. Jeune femelle trouvée morte avec forte hypérémie de l'intestin et du cerveau. Porroc. ensicaudatum Zed. Très nombreuses Isospora lacazei Lab. Les coupes du cerveau, montrent des vaisseaux gorgés de sang avec forte infiltration périférique de cellules rondes et des nodules inflammatoires disséminés dans cerveau et cervelet. Point de bactéries.
- 44. Merula torquata. Zermatt V. Porr. ensicaudatum Zed. et Capillaria exile Duj.
- 45. Turdus viscivorus. Lausanne. Trouvé mort dans une vigne. Forte hypérémie de l'intestin avec plusieurs exemplaires de Dilepis angulata Rud. et Capillaria inflexa Rud.
- 46. Sturnus vulgaris. Lausanne. N. 1. Trouvé mort avec des bactéries type B. erysipelatos suum dans le sang. N. 2. Trouvé mort avec forte infection malarienne à rate très grosse. Isospora lacazei. Lab. Zermatt. Dilepis undula Schr.
- 47. Cypselus apus. Lausanne. N. 1. Beaucoup de Crathaerina pallida Latr. Vivent sans manger du 29 mai au 4 juin. N. 2. Anomotaenia cyathiformis Froel. N. 3. Nombreuses Cr. pallida Latr. Vivent sans manger 5 jours. N. 4. Lyperosomum longicauda Rud. N. 5. Idem. N. 6. Idem. N. 7. Idem et Anom. cyathiformis Froel. Moudon Vd. Crat. pallida Latr. Vit 3 jours sans manger.
- 48. Caprimulgus europaeus. Brigue V. Choanotaenia megacantha Rud. Subulura subulata Rud.
 - 49. Iynx torquilla. Monopylidium crateriformis Goeze.
- 50. Buteo vulgaris. Sempach. Très maigre. Couvert de Nirmus fuscus N. Capillaria contorta Crepl. Habronema leptoptera Rud. Acuaria hamata v. Linst. Porrocaeoum depressum Zed. Champéry V. Ac. hamata v. linstow. Cap. contorta. Crep.
- 51. Astur palumbarius. Orbe Vd. Cladotaenia globifera Batsch. Capillaria falconum Rud. Valais. Capillaria contorta Crepl.
- 52. Accipiter nisus. Martigny V. Acuaria hamata v. Linst. Alp de Serix V. Capill. contorta Crepl. C. falconum Rud. Forte infection à hémosporidies de la malaria. Sion V. Acuaria hamata Linst. Physaloptera alata Rud. Dans le poumon microfilaire de 200 μ a extrémité antérieure arrondie de 6 μ postérieure effilée de 3 μ , à protoplasma finement granuleux. Pas de tache céphalique, tache oblique très nette, pas de tache en V. ni de corps central, tache caudale presque ronde, tache inconstante très petite. Infection malarienne assez forte. (A suivre.)

¹⁾ Rivista di malariologia, No. 17, Sect. 1, p. 1.