Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 93 (1951)

Heft: 10

Artikel: Tuberculose chez un chamois

Autor: Bouvier, G. / Burgisser, H. / Schweizer, R.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-592964

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Summary

Three cases of late intrauterine death were caused by twisting with the umbilical cord and compression of the vessels. In one case mumification and later spontaneous abortion followed. In the two remainder cases anomalies of the fetal situation were obstacles of parturition. Therefore in cattle twisting round of the umbilical cord has to be considered as a cause of death for the fetus in late pregnancy, immediately before or during parturition.

Literatur

Benesch, F.: Lexikon d. praktischen Therapie und Prophylaxe für Tierärzte, Bd. I, S. 7, Urban-Wien 1948. — Harms Lehrbuch der tierärztlichen Geburtshilfe, 4. Auflage, 2. Teil, S. 215—217, Schoetz-Berlin 1912. — Richter, J. und Götze, R.: Lehrbuch der Tiergeburtshilfe, S. 91/374, Schoetz-Berlin 1950. — Stoß, Anton: Tierärztliche Geburtskunde und Gynäkologie, 2. Auflage, S. 104, Enke-Stuttgart 1944.

Service vétérinaire cantonal et Institut Galli-Valerio, Lausanne

Tuberculose chez un chamois

Par G. Bouvier, H. Burgisser et R. Schweizer

On sait que les cas de tuberculose du gibier vivant en liberté sont tout à fait exceptionnels. Ces animaux sont pourtant sensibles au bacille de Koch, comme le prouvent assez les cas rencontrés chez le gibier en captivité dans les parcs zoologiques ou même chez le gibier élevé dans les grandes propriétés d'Allemagne par exemple (Schmid, Kulow, Hillenbrand, Gabatuler, Olt et Ströse, Robert).

Rappelons que Honigmann a trouvé un seul cas de tuberculose sur 6713 autopsies de chevreuils. Chez le cerf vivant en liberté, la maladie est également fort rare (Schiel).

Couturier, en parlant de la tuberculose, dit qu'elle n'a jamais été signalée chez le chamois, mais qu'il n'est pas exclu que cette affection puisse se rencontrer chez cet animal. Robert, dans sa thèse, cite ,,un cas de tuberculose péritonéale chez le chamois sans autre détail.

Sur 354 ruminants sauvages, nous avons trouvé deux cas de tuberculose, soit un cas chez le chevreuil (Bouvier) et le cas chez le chamois, objet de cette note. On peut donc provisoirement dire que nous avons eu un cas de tuberculose sur 199 chevreuils et un cas sur 132 chamois.

Nous pensons pourtant que les cas de tuberculose chez le gibier de Suisse sont fort rares.

Il est bien connu que chamois et chevreuils tués à la chasse sont généralement "sains", à part quelques parasitoses souvent peu graves.




Fig. 1. Plèvre costale du chamois

Le 14 février 1951, nous avons reçu de Monsieur Hans Fresche, garde-chasse à Intschi (Uri), un chamois mâle, déjà âgé, encore en bon état d'embonpoint, provenant de Wassnerwald (route du Gotthard). Ce chamois, aux dires du garde-chasse, se rapprochait souvent d'un lieu de pique-nique des automobilistes, probablement à la recherche de sel. D'après le garde-chasse également, les contacts avec le bétail ont dû être plus rares.

L'autopsie du chamois donne des lésions typiques d'une tuberculose du poumon et des plèvres, avec granulie. En effet, la plèvre, surtout la costale droite, au niveau du sternum et du diaphragme, présente de nombreux nodules miliaires dont quelques-uns sont pédonculés. On trouve les mêmes nodules sur le péricarde.

C'est surtout le poumon qui a les lésions les plus étendues: les deux lobes sont atteints et spécialement la partie dorsale des lobes diaphragmatiques. Les lésions sont confluentes et consistent en nodules jaunâtres de forme régulière se touchant les uns les autres. Ces lésions ne présentent pas de calcifications, mais de très rares foyers caséifiés. Les parties inférieures du lobe moyen et la pointe des lobes antérieurs sont emphysémateux et persemés de tubercules miliaires. Les ganglions médiastinaux sont grossis, avec caséifications et calcifications multiples (lésions primaires?). La trachée présente des ulcères irréguliers recouverts d'un enduit jaunâtre adhérent. En plus, il existe, sur la quatrième côte droite, une lésion




Fig. 2. Lésions du poumon

de tuberculose osseuse de la grandeur d'une noix. A l'examen microscopique des lésions miliaires de la plèvre costale, on voit de nombreux bacilles tuberculeux.

Des cultures sont faites directement en partant de la lésion compacte du poumon, sur milieu de Petragnani modifié par Saenz et Costil, avec et sans glycérine, pour chercher à établir directement le type des bacilles tuberculeux. Ces cultures primaires, faites le 15 février 1951, montrent de très petites colonies après un mois sur les milieux glycérinés. A la même date, on constate un développement en nappe sur les milieux non glycérinés. Puis le développement s'accentue lentement pour donner finalement, après deux mois et demi, des colonies luisantes arrondies ou confluentes, tant sur le milieu glycériné que sur le milieu non glycériné. Par culture pri-

maire donc, il n'est pas possible d'établir d'emblée avec certitude le type du bacille tuberculeux. Des cobayes ont été infectés avec du broyat de poumon du chamois le 15 février 1951. Les cobayes meurent de tuberculose généralisée les 17 et 27 mars et le 3 avril, soit après 30, 40 et 47 jours, ce qui démontre la haute virulence des germes.

Des cultures faites en partant du pus d'un cobaye ne donnent des petites colonies que sur le milieu sans glycérine, même après deux mois. Le développement est lisse, brillant. Ces cultures permettent de déterminer les bacilles tuberculeux comme étant du type bovin.

Pourtant un lapin a été inoculé dans la veine avec de la culture primaire le 16 avril 1951 suivant la technique de E. Wiesmann. Dès la deuxième semaine, le lapin perd 40 gr. Il diminue de 420 gr. pendant la troisième semaine et meurt le 9 mai, soit après 23 jours, de tuberculose généralisée. En effet, on trouve de très fortes lésions des poumons qui ne sont plus qu'un agglomérat de tubercules. La rate est un peu augmentée de volume, avec nombreux petits nodules blanchâtres. Quelques tubercules sur les reins. Les ganglions lymphatiques sont légèrement augmentés, mais sans abcédation. A l'examen direct, on trouve des bacilles tuberculeux dans le poumon.

A remarquer, chez le lapin également, la grande virulence des germes isolés sur le chamois. L'inoculation au lapin permet également de classer le bacille isolé du chamois comme étant du type bovin.

Bibliographie

Bouvier G.: Schweizer Archiv für Thk., 1947, 89, 240. — Couturier M.: Contribution à l'histoire naturelle du chamois. Thèse Grenoble 1937. — Gabatuler A.: Schweizer Archiv für Thk., 1927, 69, 390. — Hillenbrand F.: Tuberkulose beim Reh in freier Wiesbahn. Thèse Leipzig 1940. — Honigmann L.: Krankheiten beim deutschen Hochwild. Thèse Leipzig 1925. — Kulow R.: Beitrag zur Tuberkulose des Rehwildes. Thèse Leipzig 1921. — Olt A. et Ströse A.: Die Wildkrankheiten und ihre Bekämpfung, 1914. — Robert H.: Contribution à l'étude des maladies parasitaires et des maladies infectieuses du gibier à poil. Thèse Alfort 1935. — Schiel O.: Berl. Tierärzt. Wochenschr. 1937, 20. — Schmid J.: Tuberkulose beim Wild. Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1937, 17. — Wiesmann E.: Über menschliche Tuberkulose. Infektionen mit dem Typus bovinus in der Nord-Ostschweiz. Schweiz. Zschr. für Tuberkulose, 1949, 6, 122.