

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **125 (1983)**

PDF erstellt am: **27.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Spulwürmer: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*
Hakenwürmer: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma*
braziliense, *Uncinaria stenocephala*
Bandwürmer: *Dipylidium caninum*, *Spirometra erinacei*,
Taenia pisiformis, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*;
Echinococcus granulosus
Andere Spezies: *Strongyloides stercoralis*

**Lopatul löst das Wurmproblem bei Hunden
jeden Alters**





dank der [®] Lopatol Eindosis- Wurmkur...

Behandlungsplan

Welpen:
Wegen der Reinfektionsgefahr im Alter von 2, 4, 6, 8 und 12 Wochen entwurmen.
Erwachsene Hunde:
Entwurmung 1-2mal pro Jahr. Je nach Alter der Hunde und Lebenszyklus der Parasitenart ist eine Wiederholung

der Behandlung nach 2-3 Wochen angezeigt.

Zuchthündinnen:
Nach dem Decken sowie kurz vor und 4 Wochen dem Werfen behandeln.

Hundezwinger:
Wegen der erhöhten Reinfektionsgefahr empfehlen alle Hunde 4-6mal jährlich zu entwurmen.

Anwendungsempfehlung

Lopatol morgens dem nüchternen Hund mit ca. 1/4 der Futterration verabreichen; den restlichen Teil der Ration abends geben. Es soll genügend Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Lopatol Tabletten können direkt oder in etwas Nahrung verabreicht werden.

Lopatol löst das Wurmproblem bei Hunden jeden Alters





Handelsformen

Lopatol 100:
Schachtel mit 10 Tabletten zu 100 mg Wirkstoff
Klinik-Packung mit 10 x 10 Tabletten zu 100 mg Wirkstoff

Lopatol 500:
Schachtel mit 4 Tabletten zu 500 mg Wirkstoff
Klinik-Packung mit 15 x 4 Tabletten zu 500 mg Wirkstoff

Die Klinik-Packungen enthalten Dispensier-Tüten mit
Gebrauchsempfehlung zur Abgabe der Tabletten an die
Tierbesitzer.


CIBA-GEIGY

Biotechnische Produkte
4002 Basel
Telefon 061 37 44 44



Vetoprim[®] 12

Oelsuspension mit bakterizidem Breitbandeffekt zur i.m.
Anwendung bei Jungtieren (spez. Ferkel und Kälber)



Indikationen

Bakterielle «Problem»-Infektionen der Neugeborenen und saugenden Jungtiere, wie:

- ▶ Infektionen des Magen-Darmkanals
- ▶ Infektionen der Atemwege
- ▶ Infektionen des Urogenitalsystems
- ▶ Infektionen der Haut

Zusammensetzung

1 ml enthält:

Trimethoprim	20 mg
Sulfadimidin	50 mg
Sulfathiazol	50 mg
Exip. oleos. suspens. injectab. pro	1 ml

Dosierung

Ferkel: 1 ml je 2 bis 3 kg KGW i.m.
Kälber: 20 ml bis zu 50 kg KGW i.m.

Handelsform Flasche zu 100 ml



Wellcome

Impfstoffwerk Friesoythe GmbH

Burgwedel (BRD)

BERNA



Vertrieb für die Schweiz:

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern
Veterinärmedizinische Abteilung

Neu:

Degraspasmin ad us. vet.

Uterusrelaxans

Zusammensetzung

1 ml Injektionslösung enthält:
Isoxsuprinium hydrochloricum 10 mg
Conserv. (Alcohol benzylicus,
Natrium bisulfurosum)
Excip. ad solut. iniect.

Allgemeines

Degraspasmin ist eine wässrige Injektionslösung von Isoxsuprin-Hydrochlorid und besitzt eine stark relaxierende Wirkung auf die glatte Muskulatur des Uterus.

Indikationen

Degraspasmin ist in allen Fällen angezeigt, in denen die Entspannung der Uterusmuskulatur wünschenswert ist, insbesondere bei:

1. Fetotomie, Torsio uteri, Lage- und Haltungsberichtigungen bei Tieren mit stark kontrahiertem Uterus.
2. Uterusspasmus, wie bei Überdosierung wehenanregender Mittel.
3. Kaiserschnitt bei Wiederkäuern. Der entspannte Uterus lässt sich besser an die Oberfläche der Operationswunde bringen und das Risiko von Rissen und Blutungen (z. B. der Ligg.lata) verringert sich. Eine wesentliche Erleichterung ist gleichfalls bei der Uterusnaht gegeben.
4. Verhinderung einer unerwünschten Uterustonisierung bei der Sedation von hochträchtigen Kühen mittels Xylazin (Rompun): Klinische Versuche haben gezeigt, dass die Anwendung von Xylazin (Rompun) zu einer unerwünschten, starken Uterustonisierung führt. Durch die Gabe von Degraspasmin kann sie jedoch gelöst bzw. verhindert werden.

Daher wird bei hochtragenden Kühen die gleichzeitige Verabreichung von Xylazin (Rompun) und Degraspasmin zur Vermeidung einer unerwünschten Tonisierung des Uterus empfohlen.

Die Wirkung setzt nach 10–15 Minuten ein und hält ein bis zwei Stunden an.

Dosierung

Rind	20 ml
Schaf, Ziege	4 ml

Applikation

Intramuskulär.

Falls erforderlich, kann die Behandlung nach zwei Stunden wiederholt werden.

Handelsform

Durchstechflasche zu 20 ml

IKS-Nr. 45 527 018

Dr. E. Graeub AG, Bern




**Eine völlig neue
Dienstleistung
von Provet:**

provet-EXPO

der fahrende Ausstellungs- wagen



Diese entscheidenden Vorteile bieten wir Ihnen mit unserem modernen Ausstellungswagen:



- einen umfassenden Überblick über eine reichhaltige Auswahl an chirurgischen Instrumenten, Apparaten und allgemeinem Praxisbedarf für den Gross- und Kleintierpraktiker
- ganz unverbindlich und in aller Ruhe können Sie alle Artikel persönlich begutachten und in die Hand nehmen
- Sie sparen Zeit, weil wir mit unserem Ausstellungswagen zu Ihnen kommen
- Sie werden über Neuentwicklungen informiert, zu welchen wir durch unsere weltweiten Kontakte Zugang haben
- unser Mitarbeiter Herr Hans Friedrich steht Ihnen für jede Auskunft gerne zur Verfügung. Er nimmt auch Reparaturen und Instrumente zum Schleifen entgegen.
- der geräumige Ausstellungsraum (Länge 4,47 m, Breite 1,80 m, Höhe 2,17 m) in unserem Spezialwagen ermöglicht eine übersichtliche und ansprechende Präsentation unseres attraktiven Sortiments.

provet

Tel. 034 45 40 66



**Ihr Fachbetrieb für Instrumente,
Apparate und Praxisbedarf**



Abt. Instrumente
Apparate und
Praxisbedarf

Dép. Instruments
appareils et
équipement

provet

- ▶ **Service für Reparatur-
und Schleifarbeiten**
- ▶ **Betriebseigene moderne Werkstatt**



Medirip[®]

kohäsive, elastische Reissbinde bande élastique cohésive

Medirip sitzt ohne Tape, Klammer usw. fest. Haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut und Haaren. Deshalb problemloses Anlegen und Abnehmen des Verbandes. Hohes Saugvermögen sowie grosse Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit.

Pas besoin de sparadrap ou d'agrafes pour la fixation. N'adhère qu'à elle-même et non à la peau ou sur les poils. S'applique et s'enlève donc sans problèmes. Haut pouvoir absorbant et grande perméabilité à l'air.

Qual. forte (198): 4½ m x 6, 8, 10 cm

Qual. medium (199): 4½ m x 2½, 4, 6, 8, 12 cm



VFZ

VFZ Verbandstoff-Fabrik Zürich AG
Fabrique d'objets de pansement Zurich SA

Tämperlistrasse 3
8117 Fällanden
Telefon 01/825 45 45
Telex 54473 vfz ch