Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 132 (1990)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Stapenor retard

Schützt gesunde Viertel. Therapiert subklinische Mastitiden.

Stapenor retard hat sich seinen Erfolg über viele Jahre verdient.

- Optimale Gewebsfreundlichkeit auch bei strapazierten Eutern der Hochleistungskühe.
- 2. Verläßlicher Antibiotikaspiegel im Euter bis zum Abkalben.
- Bewährt bei der Pyogenes Prophylaxe und bei der Therapie subklinischer Mastitiden.

Indikationen: Therapie und Prophylaxe aller durch Streptokokken und Staphylokokken verursachten Euterentzündungen in der Trockenperiode.

Zusammensetzung: Oxacillinum 800 mg (ut O.N.N'-dibenzyl-aethylendiamin ic. (2:1), Oxacillinum 200 mg (ut O. natricum), Excip. (c. Aluminium monostearic.) ad unguent. pro vaso 7,5 g

Zur Beachtung: Wenn die Behandlung fünf Wochen oder länger vor dem Kalben erfolgt, ist die Oxacillinausscheidung innerhalb der Kolostralmilchperiode abgeschlossen und die Normalmilch von Anfang an rückstandsfrei. Stapenor-retard wurde speziell für das trockenzustellende Euter entwikkelt.

Wartezeiten: für Muskulatur: 2 Tage. Für innere Organe: 28 Tage.

Oxacillin ist ein halbsyntetisches penicillinase- und säurestabiles Penicillin. Es ist hochwirksam gegen die im Euter vorkommenden Staphylokokken, einschliesslich der penicillinasebildenden, resistenten Stämme, Streptokokken u. C. pyogenes.



 $\ensuremath{\mathbb{R}}$ = eingetr. Warenzeichen der Bayer AG





VISURA-Seminare für Ärzte 1990

Halbtagsseminar

«Was der Arzt über Buchhaltung, Steuern und Sozialversicherungen wissen sollte»

- Sie lernen die rechtlichen Anforderungen an die Ärztebuchhaltung und deren Aufbau kennen
- Sie sehen ein praktisches Beispiel einer Buchführung auf Personalcomputer
- Sie erfahren Möglichkeiten zur Steuereinsparung und zur Gestaltung im Bereich Sozialversicherungen
- Sie wissen die wesentlichen Grundsätze und Formen der Finanzierung und Vermögensanlage

Daten und Orte:

Halbtagsseminare 13.30 - 17.30 Uhr

- 6. September 1990 in Zürich
- 13. September 1990 in Bern

Verlangen Sie den Seminarprospekt bei

Fräulein E. Schaad Visura Treuhand-Gesellschaft Hauptstrasse 36 4702 Oensingen Telefon 062 76 33 20

Die richtige Lage ist entscheidend

Der höhenverstellbare Untersuchungstisch von indulab sorgt für



ermüdungsfreies Arbeiten. Mit elektrischem Antrieb kann die richtige Höhe rasch eingestellt werden.

Auf Wunsch auch Kippvorrichtung und Tischplatte in Formica, PVC oder rostfreiem Stahl erhältlich.
Standfest und wartungsfrei.




Der OP-Tisch für die Tierklinik. Elektronische Höhen- und Neigungsverstellung. Fernsteuerung. Hohe Zuverlässigkeit durch modernste Technik.

Verlangen Sie eine ausführliche Dokumentation bei:

indulab ag

Haagerstrasse CH-9473 Gams Tel. 085 / 7 14 14 FAX 085/ 7 15 10




Akute und chronische Mastitiden

DUOMYCIN MITE DUOMYCIN FORTE

Euterinjektoren

Bewährte Zusammensetzungen:
 1 Injektor Duomycin mite enthält:
 1 Mio IE Procain-Penicillin;
 375 mg Neomycin
 (corresp. 500 mg Neomycinsulfat)
 1 Injektor Duomycin forte enthält:
 2 Mio IE Procain-Penicillin;
 750 mg Neomycin
 (corresp. 1000 mg Neomycinsulfat)



- Zur Behandlung akuter, chronischer und subklinischer Mastitiden.
- Die meisten Mastitiden werden durch grampositive penicillinsensible Erreger verursacht. In diesen Fällen ist Penicillin das Antibiotikum der Wahl.
- Neomycin wirkt in hohen Dosen bakterizid. Das Wirkungsspektrum umfasst sowohl gramnegative als auch grampositive Keime. Erreger-Resistenz gegenüber Neomycin tritt selten auf.
- Der Einsatz von Duomycin hat sich deshalb auch in solchen Fällen bewährt, in denen andere Antibiotika wegen zu häufigem Einsatz nicht mehr ansprechen.
- Gleichmässige Wirkstoffverteilung im Euter.
- Gut verträgliche wässrige Suspension verursacht keine Eutergewebsreizungen.
- Geschmeidige Salbengrundlage auch bei tiefen Temperaturen optimal applizierbar.
- Ausmelken bereits nach kurzer Zeit (3 Stunden) ohne Wirkungseinbusse möglich.
- Praxisgerechte Packungen mit 4, 12, 100 Injektoren

IKS-Nr. 39392



G. Streuli & Co. AG – 8730 Uznach Pharmazeutica Telefon 055 - 71 11 01 Telefax 055 - 72 46 45