

Zeitschrift:	Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires
Herausgeber:	Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
Band:	136 (1994)
Heft:	3
Artikel:	Formation et développement ultrasonographique du Corpus luteum chez la jument : revue pour le praticien
Autor:	Montavon, S.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-590076

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Formation et développement ultrasonographique du Corpus luteum chez la jument: revue pour le praticien

S. Montavon

Résumé

La situation anatomique du Corpus luteum dans l'ovaire a toujours rendu difficile son identification et son évaluation par palpation rectale. Le but de cette revue est d'amener le praticien à se familiariser avec l'examen échographique du corps jaune en l'a aidant à reconnaître les différents stades du développement de cette structure importante et tenter de mettre en relation l'ovulation et l'existence de ce Corpus luteum. Divers critères et détails propres à l'échographie équine du tissu lutéal sont étudiés et illustrés en ayant pour source les travaux scientifiques les plus récents.

Mots-clés: jument – échographie – corpus luteum – diestrus – gestation

Le corps jaune (Corpus luteum, CL) est présent pendant les deux tiers du cycle oestral de la jument et persiste pendant les six premiers mois de la gestation (Squires et al., 1974). Le produit principal du CL est l'hormone progesterone qui possède une multitude de fonctions mais qui est essentiellement responsable du début de la gestation et de son maintien. On sait également que le CL produit des oestrogènes dont le profil de sécrétion est unique parmi les espèces animales domestiques (Daels et al., 1991).

Il convient donc de bien connaître les différentes méthodes d'évaluation du CL. De par sa situation anatomique, à l'intérieur de l'ovaire, la palpation rectale du CL est moins performante en ce qui concerne la localisation et son évaluation. En revanche, l'ultrasonographie est un moyen efficace afin de procéder à l'identification de cette structure. Les raisons qui nous amènent à évaluer

Ultrasonographic evaluation of the formation and development of the corpus luteum in the mare: a review for the practitioner

Because of the anatomical position of the Corpus luteum within the ovary, rectal palpation is of little value for identification and evaluation. The aim of this review is to familiarise the practitioner with the echographic examination of the CL. He should be able to recognize different stages of this important structure and to correlate ovulation and the existence of the CL. Various specific criteria and details regarding equine echography are reported and illustrated, using the most recently published scientific data.

Key words: mare – echography – corpus luteum – diestrus – pregnancy

ultrasonographiquement le CL sont diverses et sont brièvement énumérées ci-après:

- 1) la détection de l'ovulation,
- 2) l'évaluation de la formation du CL,
- 3) l'appréciation de la taille et du caractère du CL,
- 4) lorsqu'une jument ne montre aucun signe de chaleur, la détermination de la présence d'un CL persistant ou d'une absence de CL et donc d'activité folliculaire,
- 5) la distinction entre des follicules anovulatoires hémorragiques, des CL ou des follicules non ovulés mais lutéinisants,
- 6) détection d'une ou plusieurs ovulations.

Lors de l'ovulation et après la rupture du follicule, il y a formation d'un corps hémorragique (CH) qui marque le début de la formation d'un CL chez la jument (Ginther, 1986). Cependant, il a été démontré lors d'études ultrasonographiques antérieures que le tissu lutéal chez la



Figure 1: CL uniformément échogène au jour 0 (flèches).

jument pouvait évoluer en deux morphologies ultrasonographiques bien distinctes (Pierson et Ginther, 1985a, 1985b).

Ces deux formes de structures lutéales sont pareillement échogéniques au jour 1 après ovulation. On distingue le type échogénique uniforme dans 50% des cas (figure 1 à 4) et le type anéchogène central dans l'autre moitié des cas (Figure 5 à 7).

Le deuxième type a fait l'objet de plusieurs études ultrasonographiques examinant le temps nécessaire à l'accumulation de liquide et à la formation de ces agglomérats centraux ou zones non-échogènes (Ginther, 1986).

Ces examens ont été effectués à des intervalles de 15 minutes pendant les deux premières heures post ovulationem (p.ov.), puis à huit heures p.ov. et finalement à des intervalles de 12 heures pendant 5 jours p.ov. Les résultats ont montré qu'une zone centrale non-échogène se développait à l'intérieur du tissu lutéal, après l'expulsion du liquide folliculaire. La taille de ces zones




Figure 3: CL uniformément échogène au jour 14 (flèches).

non-échogènes variait entre 0,5 et 11,6 cm². Des lignes ont été détectées à l'intérieur de ces zones centrales et ont été attribuées à la coagulation et à la fibrination du contenu. Il a également été remarqué que l'incidence de ces zones centrales non-échogènes était plus forte en cas de double ovulation (McKinnon et al., 1987).

On considère cependant que les deux types de structures lutéales sont dans la norme (McKinnon et al., 1987).

On rapporte également l'extrême fiabilité de l'ultrasonographie quant à la localisation du CL sur l'ovaire (Ginther, 1986).

On admet donc que l'ultrasonographie peut largement être utilisée pour visualiser le CL, même dans les cas où les sites de l'ovulation sont inconnus. Sa valeur diagnostique est donc très appréciée pour détecter la présence ou l'absence de CL (Neely, 1983).

La visualisation d'un CL est bien plus facile avec une sonde linéaire de 5 MHz et les figures 1 à 3 et 5 e 6 montrent une série d'image ultrasonographiques avec




Figure 2: CL uniformément échogène au jour 7 (flèches).





Figure 4: Vue macroscopique d'un CL à forme échogène uniforme.



**Optimale
Pferde -Therapeutika
zum Wohl Ihrer Patienten
für die Sicherheit der
Therapie**

Für das Leistungs-Pferd

HIPOSTAR®
Pulver

- zum Stress-freien, raschen und wirkungsvollen Ausgleich der leistungsbedingten Muskelübersäuerung

HIPOVITON®
Pulver

- das leistungserhaltende Vitamin-Mineralstoff-Konzentrat mit hervorragender Akzeptanz

UNGIOTIN®
Oraletten/Pulver

- gegen epidermoidale Dystrophien für optimales Hufhorn

DYSTROFIN®
Oraldoser

- gegen das Tying-up-Syndrom und degenerative Muskelaffektionen

EQVALAN®
Oraldoser

- die umfassendste Parasitenbekämpfung einschliesslich arterieller Larvenstadien von *Strongylus vulgaris*, Dassellarven und wandernder Lungen- und Leber-Stadien (L_3 und L_4) der Askariden.

Zur Optimierung der Narkose

SEDALIN®
XYLAPAN®
MYOLAXIN® 15 %
NARKETAN® 10

(Acepromazin)
(Xylazin)
(Guaifenesin)
(Ketamin)

Inj.-Lösung, Oraldoser
Inj.-Lösung
Inj.-Lösung
Inj.-Lösung

Analgetika/Antiphlogistika

BUTASAN®
Oraldoser

- Phenylbutazon zur Oralapplikation ohne Akzeptanzprobleme!

DOLOSIN®
DOLOSIN-DEXA®
Inj.-Lösung

- Phenylbutazon-Kombination mit Wirkungspotenzierung und -verlängerung

Lokaltherapeutika mit Tiefenwirkung

PERCUTIN®
Lösung

- intensives Antiphlogistikum mit Entzündungs-Regulativ-Wirkung

CUPROSALON®
Lösung

- kausal entzündungshemmend über Superoxid-Radikale

TENDISOL®
Gel

- Heparin-Salizylat-Gel mit starkem perkutanem Penetrationsvermögen dank DMSO

UNGULAN®
Salbe

- die wirksame Hufsalbe:
antibakteriell, antimykotisch, hyperämisierend, schmerzlindernd, epithelisierungsfördernd

Atemwegs-Therapeutikum

ATUSSIN®
Sirup

- breit wirksames Therapie-Konzept:
Antitussivum, Antihistaminikum, Expectorans, Bronchospasmolytikum, Vasokonstriktion

Chassot-Therapeutika:

solide, sinnvoll, sicher

 **Chassot**

031 / 53 39 11

Wir informieren Sie gerne!

Das Ziel:

Jedes Jahr ein Kalb!

Die Methode:

Eine komplette Hormon-Palette!

Fertagyl®

Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) zur Behandlung des Ovarialzysten-Syndroms und zur Verbesserung der Fortpflanzungsleistung.

Chorulon®

Chorion Gonadotropin (HCG) zur Behandlung der zystischen Follikeldegeneration und zur Ovulationsauslösung.

Folligon®


Serum Gonadotropin (PMSG) zur Stimulation der Follikelreifung und der Ovulation.

Prosolin®

Prostaglandin F₂α-Analog für die Luteolyse des Corpus luteum und für eine milde Kontraktion der Uterusmuskulatur.

Nymfalon®

Hormonkombination aus Progesteron und Chorion-Gonadotropin (HCG) zur Behandlung des Ovarialzysten-Syndroms.



Intertocine-S®

Oxytocin zur Förderung der Uterusinvolution post partum und zur Kontraktion der Korbzellen der Milchdrüse.

Chronosyn®

Chlormadinonacetat (CAP) für die Brunstinduktion und Zyklus-synchronisation.
(Hersteller: VETERINARIA AG)

Der Erfolg!

Hersteller: INTERVET INTERNATIONAL B. V., Boxmeer Holland

VETERINARIA  **AG**

CH-8021 Zürich Grubenstrasse 40

Telefon 01 · 455 31 11



Figure 5: CL avec zone centrale non-échogène (flèches) au jour 1 post-ovulationem.

des détails de CL à divers stades de développement. La qualité des images est souvent affectée par la quantité de sang à l'intérieur du CL. En effet, le sang est non-échogène, alors que les cellules lutéales sont, elles, très échogènes.

De manière générale, la luténisation commence à la périphérie de la structure et migre vers le centre. Habituellement, lors de la maturation du CL, le sang se résorbe et se développe alors, une structure lutéale uniforme et échogène.

Des filaments ressemblant à de la fibrine peuvent séparer les agglomérats de sang en zones foncées non-échogènes qui contiennent des érythrocytes, du plasma et souvent




Figure 6: CL au jour 9 post-ovulationem. Les contours de la structure lutéale sont indiqués par les flèches.

du liquide folliculaire. Les zones plus claires peuvent indiquer la présence de tissu lutéal en formation. Bien que les caractéristiques ultrasonographiques d'un CL mûr soient similaires à celles du stroma ovarien, on peut distinguer un CL grâce à ses contours bien définis.

On considère que la texture ultrasonographique de la glande lutéale est caractérisée par un motif d'échogénéité indiquant la présence d'un tissu mal organisé mais bien vascularisé, alors que le stroma ovarien fait ressortir des zones fortement échogènes représentées par un motif à qualité très dense (Townson et Ginther, 1988).

Dans les CL dont le centre est anéchogène, cette zone noire est visible la première fois, le jour de l'ovulation ou

Ultrasonographische Überprüfung der Entstehung und Entwicklung des Corpus luteum bei der Stute: Rückblick für den Praktiker

Die anatomische Lage des Corpus luteum im Eierstock bewirkt, dass sich seine Identifizierung und seine Einschätzung durch rektale Untersuchung seit jeher als schwer durchführbar erwiesen hat.

Der Zweck des vorliegenden Rückblicks liegt darin, den Praktiker mit der echographischen Untersuchung des Gelbkörpers vertraut zu machen und damit die verschiedenen Phasen der Entwicklung dieser wichtigen Gewebe auszuwerten und das Verhältnis von Eisprung zum Vorkommen dieses Corpus luteum herzustellen.

Verschiedene Kriterien und Nebenumstände, die einer echographischen Untersuchung des Pferdes im Zusammenhang mit dem luteischen Gewebe eigen sind, werden eingehend anhand neuester wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet besprochen und illustriert.

Formazione e crescita ultrasonografica del Corpus luteum nella giumenta: rivista per il praticante

La situazione anatomica del Corpus luteum (CL) nell'ovaia a fatto che l'interpretazione e la valutazione per mezzo della palpazione rettale sia sempre stata accompagnata da grande difficoltà.

Lo scopo di questa rivista sarà d'aiutare il praticante a familiarizzare coll'esame ecografico del CL e permettere così il riconoscimento delle varie fasi dello sviluppo di questa struttura importante, anzi tentare di mettere in relazione l'ovulazione coll'esistenza di questo Corpus luteum. Diversi criteri e dettagli a riguardo dell'ecografia equina del tessuto luteinico sono stati studiati e illustrati, nonché fondati sugli studi scientifici più recenti.




Figure 7: Vue macroscopique d'un CL en développement, à forme non-échogène centrale.

le jour suivant. Ce type de structure lutéale a son maximum d'échogénicité le jour de l'ovulation (environ 75-100% de la glande). Ceci est probablement dû aux caractéristiques ultrasonographiques du collapsus des parois folliculaires. Cette zone noire anéchogène s'agrandit au fil des jours 1 à 3 p.ov., provoqué par le grossissement de l'agglomérat de sang (Figure 5). Puis, lors de la résorption de ce dernier, cette portion de la structure lutéale qui était échogène augmente en taille tout au long du reste du cycle. Par opposition, la glande lutéale caractérisée par une échogénicité uniforme (Figure 6) ne change pas tout au long du cycle à l'exception des tons de gris qui augmentent tout au long du cycle (Figure 3). C'est au moyen de ces critères que l'on peut dater les CL (Pierson et Ginther, 1985a).

Ginther en 1986 a également démontré que les deux types de glandes changent en échogénicité tout au long de la période de diestrus. Le pourcentage de CL échogènes visualisés par ultrasonographie passe de 76%, le jour de l'ovulation, à 100% au jour 8 p.ov., alors que celui des CL non-échogènes passe de 24%, le jour de l'ovulation, à 0% au jour 8 p.ov.

Ceci s'explique par le fait que le jour de l'ovulation le CL est très échogène (Figure 1). A ce moment il apparaît facile de l'identifier.

Son échogénicité décroît les six premiers jours de la période de diestrus et reste à un niveau minimum quelques jours pour regrossir pendant les jours 12 à 16 p.ov. Les changements ultrasonographiques sont apparemment indicatifs d'un changement dans l'hémodynamique lutéale. Ces changements sont les reflets du flux sanguin à l'intérieur du CL et de variations de densité de tissus.

Avec de l'expérience, le praticien devient un familier de l'image ultrasonographique ovarienne, lors de la confirmation de l'ovulation et lors de la détection de la présence d'un CL. L'ultrasonographie des CL peut être utilisée

Adresse de correspondance: Dr Stéphane Montavon, médecin-vétérinaire, Praticien pour chevaux, CH-1284 Chancy/GE

Manuskripteingang: 26. Oktober 1992

pour le diagnostic de pseudogestation. En effet, la présence d'un CL persistant et l'absence d'un vésicule embryonnaire sont l'évidence d'une pseudogestation. Dans de tels cas, l'utilisation de prostaglandines trouve toute son utilité dans l'induction d'un nouvel estrus.

L'échogénicité des structures lutéales peut être utilisé pour déterminer l'âge d'un CL. Une hyperéchogénicité est le signe typique d'un CL, âgé d'au plus 48 heures ou d'une régression finale. Les 48 premières heures peuvent généralement être distinguées de la régression finale sur la base de la taille de la glande. En milieu de diestrus le CL sera au plus bas de l'échelle de tons gris, bien que sa taille soit maximale. Si le CL contient une cavité centrale non-échogène, la proportion de tissu lutéal par rapport aux agglomérats de sang et leurs organisations peuvent alors être d'une certaine utilité pour estimer l'âge de la glande. L'agglomérat de sang se développe pendant les premiers jours p.ov. alors qu'il devient de plus en plus organisé au cours du cycle et proportionnellement plus petit en fin de cycle.

L'avenir nous permettra grâce une technologie ultrasonographique encore plus perfectionnée de répondre à d'autre questions en matière de changements hémodynamiques des structures lutéales et de devenir encore plus précis lors de nos diagnostics.

Littérature

- Dael, P.F., DeMoraes, J.J., Stabenfeldt, G.H., Hughes, J.P., Lasley, B.L. (1991): The Corpus luteum: source of oestrogen during early pregnancy in the mare. *J. Reprod. Fert., Suppl.* 44, 501-508.
- Ginther, O.J. (1986): Ultrasonic imaging and reproductive events in the mare. Equiservices, Cross Plains, WI.
- McKinnon, A.O., Squires, E.L., Voss, J.L. (1987): Ultrasonic evaluation of the mare's reproductive tract; Part I. *Comp. Cont. Educ. Pract. Vet.* 9:336-345.
- Neely, D.P. (1983): Equine gestation. In: *Equine Reproduction*. Eds D.P. Neely, I.K. Liu, R.B. Hillmann. Veterinary learning System Co. Inc., Princeton Junction, NJ.
- Pierson, R.A., Ginther, O.J. (1985a): Ultrasonic evaluation of the corpus luteum of the mare. *Theriogenology* 23, 795-806.
- Pierson, R.A., Ginther, O.J. (1985b): Ultrasonic evaluation of the preovulatory follicle in the mare. *Theriogenology* 24, 359-368.
- Squires, E.L., Douglas, R.H., Steffenhagen, W.P., Ginther, O.J. (1974): Changes during the estrous cycle and pregnancy in mares. *J. Anim. Sci.* 38, 330-338.
- Townson, D.H., Ginther, O.J. (1989): Ultrasonic characterization of follicular evacuation during ovulation and fate of the discharged follicular fluid in mares. *Anim. Reprod. Sci.* 20, 131-141.

Remarque

Toutes les figures apparaissant dans ce texte font partie de la collection privée du Dr J.P. Hughes, Professeur et directeur du Département de Reproduction Equine, University of California Davis, USA. Mes sincères remerciements pour sa contribution.