

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **142 (2000)**

Heft 6

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Tous
Für die
les vermifuges
wirksamste
ne sont pas
Entwurmung
Eqvalan

Composition : Ivermectinum 18.7 mg, Excipients ad Pastam pour 1 g
Chaque applicateur unique contient 6.42 g d'Eqvalan et délivre 120 mg
d'Ivermectine. **Dosage/Application :** Eqvalan est utilisé oralement à la dose
recommandée de 200 µg d'Ivermectine par kilo de poids vif.
Délai de retrait : Viande et abats : 14 jours.

Zusammensetzung : Ivermectinum 18.7 mg, Excipients ad Pastam pro 1 g
Jeder Einmal-Applikator enthält 6.42 g Eqvalan und gibt 120 mg Ivermectin
ab. **Dosierung/Anwendung :** Eqvalan wird oral in der empfohlenen
Dosierung von 200 µg Ivermectin pro Kilogramm Körpergewicht appliziert.
Absetzfrist : Fleisch und Organe : 14 Tagen.

OICM/IKS N° 48107

Eqvalan* pâte / Paste
(ivermectine)

Le premier vermifuge complet
Das erste umfassende Wurmmittel



*© Merial
Produit par/Hersteller : Merck Sharp & Dohme - NL

Distribué par/Vertrieb durch : **biokema** 

BIOKEMA SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00



La seule assurance d'une protection complète
Die einzige Versicherung für einen vollständigen Schutz

FRONTLINE®



Frontline®: produce by Merial, distributed by:



biokema

BIOKEMA SA, CH- 1023 Crissier-Lausanne,
 phone 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00



Substance active : Fipronil 10% m/v (spot on), Fipronil 0.25% (spray). **Indication :** Traitement et prévention des infestations par les puces et les tiques chez le chien et le chat. **Effets indésirables :** aucun. **Présentations :** pipettes de 0.67 ml, 1 ml, 1.34 ml, 2.68 ml en carte de 3 pipettes et spray de 100 ml, 250 ml. **Catégorie de vente :** liste B.

Zusammensetzung : Fipronil 10% (Spot on), Fipronil 0.25% (Spray). **Indikationen :** Therapie und Prophylaxe des Floh- und Zecken-Befalls bei Hunden und Katzen. **Unerwünschte Wirkungen :** Keine. **Handelsformen :** Pipetten zu 0.67 ml, 1 ml, 1.34 ml, 2.68 ml auf Karten zu 3 Pipetten und Spray zu 100 ml, 250 ml. IKS-Liste : B.