

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 143 (2001)

Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Aktive Unterstützung des Zellschutzes

Mit Verantwortung füttern hat einen neuen Namen: ADVANCE™ – damit Ihre Katze rundum gesund ist und ihr genetisches Potential voll zur Entfaltung bringen kann. ADVANCE™ wurde in allen Aspekten gemäss dem exklusiven 4-Punkte-Konzept unserer Waltham-Ernährungsforschung entwickelt.

Moderne Nahrungsmittel berücksichtigen neue, wissenschaftlich belegte Erkenntnisse. Die geeignete Abwehr gegen freie Radikale sind die natürlichen

Antioxidantien. Diese sind somit ein wichtiger Faktor für ein gesundes Leben. Antioxidantien neutralisieren die freien Radikale und fördern somit die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers.

Für weitere Informationen wählen Sie unsere Info-Line 0848 844 800 (gebührenpflichtig*), Mo/Mi/Do 15–19 Uhr, oder schlagen Sie unsere Website auf: www.advance-cat.ch



ADVANCE™

MEHR FÜR'S LEBEN – EIN LEBEN LANG™

BICLOX® DC

Dry Cow



**Une combinaison unique
d'ampicilline et de cloxacilline offrant
une protection intramammaire
jusqu'à 10 semaines !**

**Ampicillin und Cloxacillin :
die einzige Kombination mit
einem intramammären Schutz
bis zu 10 Wochen !**

**BICLOX® DC
Suspension zur intramammären
Injektion beim Trockenstellen
der Milchkuh.**

Zusammensetzung : Jede Injektor enthält : Cloxacillin (ut C. benzathinum) 0,6 g, Ampicillin (ut A. trihydratum) 0,3 g. Excipient ad suspensionem pro vose ad 5,5 g.

Eigenschaften/Wirkungen : Biclo DC ist eine stabile und nicht eritogene Suspension von Cloxacillin und Ampicillin, halbsynthetische Penicilline-Derivate der 6-α-Penicillinsäure. Diese Substanzen sind wirksam gegen grampositive und gramnegative Erreger. Sie wirken auf verschiedene Staphylokokken, Corynebakterien, E. coli und anderen empfindlichen gramnegativen Erregern. Im Euter wird während der Galtzeit die wirksame Antibiotika-Konzentration ungefähr 10 Wochen lang aufrethalten.

Indikationen : Behandlung subklinischer Mastitiden beim Trockenstellen. Vorbeugung gegen Infektionen während der Galtzeit.

Dosierung / Anwendung : 1 Injektor pro Vie.

Applikation : Intramammär. Euter zuerst vollständig ausmachen. Zitzen vor der Applikation sorgfältig reinigen und desinfizieren. Bis zum Abkauen nicht mehr melken.

Anwendungseinschränkungen : Kontra-Indikationen : Nicht während der Laktation anwen-

den. Absetzfristen : Minimale Galtzeit : 56 Tage. Milch : falls die Galtzeit weniger als 56 Tage betrifft muss vor der Ablieferung der Milch eine Untersuchung auf Antibiotika-Rückstände durchgeführt wer-

Essbare Gewebe : wird ein Tier während der Galtzeit geschlachtet, müssen die essbaren Gewebe

Hemmstoff-Freiheit untersucht werden.

Sonstige Hinweise : Lagerung bei Raumtemperatur. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewah-

ren. Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "Exp." bezeichneten Datum verwendet werden.

Handelsformen : Packungen mit 4 Injektoren/120 Injektoren. IKS Nr.: 53'807 - A

**BICLOX® DC
Suspension pour injection intramammaire lors du
tarissement des vaches laitières.**

Composition : Chaque injecteur contient : Cloxacillin (ut C. benzathinum) 0,6 g, Ampicillin (ut A. trihydratum) 0,3 g. Excipient ad suspensionem pro vose ad 5,5 g. Propriétés/Effets : Biclo DC est une suspension stable et non irritante de cloxacilline et d'ampicilline, des penicillines semi-synthétiques, dérivés de l'acide 6-aminopenicillanic. Ces substances actives contre les germes grampositifs et gramnégatifs aussi bien que les staphylococciques (y compris les souches résistantes à la penicilline). Streptococcus agalactiae et d'autres streptococciques, les corynebactéries, coliformes et autres bactéries gramnégatives sensibles. Une concentration élevée des antibiotiques dans le lait pendant la période de tarissement dure jusqu'à 10 semaines. Indications : Traitement des mastites latentes et subcliniques lors de la mise à la piste. Prévention des nouvelles infections tout au long de la période de tarissement. Posologie/Mode d'emploi : 1 injecteur par quartier de lactation. Ne plus faire usage au séparateur. Limite d'application : Vider soigneusement le mamelle lors de la dernière traite. Nettoyer et désinfecter les traits avant application. Ne plus faire usage au séparateur. Limitations d'emploi : Contre-indications : Ne pas administrer pendant la période de lactation. Délais d'attente : Période minimale de tarissement : 56 jours. Lait : si la période de tarissement est inférieure à 56 jours, un contrôle des résidus d'antibiotiques dans le lait devra être effectué avant la livraison. Tissus consommables : les tissus consommables des animaux abatous durant le tarissement sont à examiner à l'égard de produits inhibiteurs. Remarques particulières : Conserver à température ambiante. Tenir hors de portée des enfants. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec mention "Exp.". Présentations : Emballages de 4 injecteurs/120 injecteurs. ICKM N°: 53'807 - A.

biokema

BIOKEMA SA, CH- 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021/ 634 28 45, fax 021/ 635 20 64