

**Zeitschrift:** Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire  
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

**Herausgeber:** Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

**Band:** 143 (2001)

**Heft:** 2

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 09.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



# Merilym®



## Le vaccin le plus utilisé en Europe contre la maladie de Lyme-Borreliose chez le chien

## Der in Europa am meistens benützte Impfstoff gegen Lyme-Borreliose beim Hund

## Il vaccino più utilizzato in Europa contro la malattia di Lyme-Borrelia nei cani



**Merilym** – Vaccin inactivé et adjuvé de la maladie de Lyme du chien. Suspension injectable. **Composition** – Chaque dose de 1 ml de vaccin contient: *Borrelia burgdorferi* inactivée, au minimum 330 unités ELISA sur l'animal de laboratoire, Al+++ (sous forme d'hydroxyde) 0,6 mg, Excipient qsp 1 ml. **Indication** – Prévention de la maladie de Lyme (*Borrelia burgdorferi*) chez le chien par immunisation active. **Mode d'emploi et posologie** – Voie d'administration: s.c. Dose: 1 ml. Agiter avant l'emploi. **Schéma de vaccination – Primovaccination**: 1ère injection: à partir de la 12ème semaine d'âge, 2ème injection: 3 à 5 semaines plus tard. **Rappel**: Annuel, avant la période à risque. En cas de risque important, rappel semestriel. **Contre-indications** – Aucune connue. **Effets secondaires** – Exceptionnellement, la vaccination est susceptible de révéler un état d'hypersensibilité. Instaurer alors un traitement symptomatique. La vaccination peut entraîner une réaction locale transitoire au point d'injection chez certains sujets. **Remarques importantes** – Ne vacciner que des sujets en parfait état de santé et correctement vermifugés 10 jours au moins avant l'intervention. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. **Conservation** – Entre 2°C et 8°C et à l'abri de la lumière. **Présentation** – Flaçon de 1 dose. Boîte de 1 ou de 10 flacons.

**Merilym** – Inaktivierter adjuvierter Lyme-Borreliose-Impfstoff für Hunde. Wässrige Suspension. **Zusammensetzung** – 1 ml Impfstoff enthält: *Borrelia burgdorferi* inaktiviert, minimal 330 ELISA-Einheiten im Versuchstier gemessen, Al+++ (als Hydroxid) 0,6 mg, Excipient qsp 1 ml. **Indikation** – Aktive Schutzimpfung gesunder Hunde gegen Lyme-Borreliose (*Borrelia burgdorferi*). **Anwendung und Dosierung** – s.c., Dosierung: 1 ml. Vor Gebrauch schütteln. **Impfschema – Erstimpfung**: Erstinjektion: ab einem Alter von 12 Wochen, Nachimpfung: nach 3 bis 5 Wochen. **Wiederholungsimpfungen**: In jährlichem Abstand vor der Zeitspanne besonderer Infektionsgefährdung (Zeckensaison). Bei besonders hoher Infektionsgefährdung halbjährliche Wiederholungsimpfung. **Kontraindikationen** – Keine bekannt. **Nebenwirkungen** – Ausnahmsweise können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, die symptomatisch zu behandeln sind. In gewissen Fällen können vorübergehend lokale Reaktionen an der Injektionsstelle auftreten. **Wichtige Hinweise** – Nur gesunde Hunde impfen, die mindestens 10 Tage vor der Impfung korrekt entwurmt wurden. Übliche aseptische Kautelen beachten. **Lagerung** – Zwischen 2°C und 8°C und im Dunkeln aufbewahren. **Handelsform** – Fläschchen zu 1 Dosis. Packung zu 1 oder 10 Fläschchen.

N° IVI : 1491



Produit par/Hergestellt durch:

Distribué par/Vertrieb durch: **biokema**

BIOKEMA SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021/ 633 31 31, fax 021/ 633 31 00

[www.biokema.ch](http://www.biokema.ch)