

Zeitschrift: Bulletin de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 16 (1924)

Artikel: Epervièrès nouvelles des Alpes et du Jura
Autor: Palézièux, Ph. de / Zahn, K. H.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099622>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Epervières nouvelles des Alpes et du Jura

par

Ph. de Palézieux et K. H. Zahn

Les diagnoses de nouvelles formes ou d'hybrides inédits d'Epervières, publiées ici, ont été établies par M. le Dr K. Hermann Zahn d'après les matériaux qui lui ont été communiqués par M. le Dr Ph. de Palézieux. Ces plantes, pour la plupart, proviennent d'excursions organisées par la Société botanique de Genève, entre les années 1916 (Valais) et 1924 (massif de la Fillière, Hte-Savoie); deux d'entre elles ont été récoltées dans les Alpes pennines françaises et italiennes et peuvent être considérées comme complément à l'herborisation de Tré-la-Tête, dans le massif du Mont-Blanc; une autre, enfin, appartient aux confins du territoire valaisan des Alpes Lémaniennes (massif de la Dent du Midi); toutes font suite au précédent mémoire de M. K.-H. Zahn (cf. p. 144), qui est, en quelque mesure, un petit supplément à la grande Monographie des « *Compositæ-Hieracium* » publiée de 1921 à 1923 dans le « *Pflanzenreich* » d'Engler, dans l'ordre duquel elles sont exposées.

(Réd.)

× **Hieracium Knappianum** Palézieux et Zahn = *H. bupleuroides* × *fulcratum*. — *Fulcrato* simile, sed folia basalia margine subtusque modice vel densiuscule, in petiolo ± dense longeque albopilosa; caulina margine substusque modice vel dorsali bas inversus tantum parce pilosa vel glabra. Capitula 2-4, rarius 1-cephala. Acladium 6-15 mm. Pedicelli graciles *bracteolis* 5-8 *foliaceis longis angustis conspicuis* pilisque solitariis *obtusis* sursum floccosi et subincrassati, raro glandulis valde solitariis præditi. Involucra permagna 13-15 mm. longa percrassa densiuscule dilute pilosa parce glandulosa, squamis latis acutiusculis vel acutis dilute (viridialbido-) marginatis

vel partim intense floccoso-marginatis. Ligulæ angustæ partim tubulosæ. Achaenia magna ca. 4 mm. longa, atra. — Inter *H. fulcratum* et *bupleuroides*.

Sabaudia : Ad rupes supra Usillon cum *H. fulcrato* (Palézieux).

H. Mougeotii Froel, ssp. **bornandinum** Pal. et Zahn. — Caulis 25-35 cm. tenuis vel gracilis, sæpe cum folia \pm rufo-violaceus, ubique subdensiuscule pilosus (pilis albis patentibus 2-3 mm. longis), usque infra medium floccosus, superne canescens et *glandulis dispersis brevibus tenellis* obsitus, 3-10 cephalus ; acladis 2-3 cm.; ramis 2-4 (-5) e foliorum caulinarum axillis octis 1-3-cephalis ; pedicellis canis modice vel densiuscule pilosis et *modice breviter tenuiter glandulosis*. Involucra sat parva 9-11 mm. longa similiter vestita, squamis subangustis vel sublatiusculis obscuris subdilutius (virescenti-) marginatis acutiusculis vel acutissimis *modice vel dense floccosis, margine \pm dense (sæpe usque ad apicem) floccosis*, internis virescentibus vel intense albidoviridi-marginatis. Styli *obscuri*. Folia oblongo-lanceolata utrinque pilosa (1,5—3 mm.) mucronato-denticulata acutiuscula et acuta longe in petiolum alatum attenuata, *margine sparsim glandulosa*, caulina basi petioliformi vel subattenuata sessilia leviter vel vix amplectentia margine parce glandulosa. — Capitula interdum \pm deformata microcephala. Pili ubique sat breves.

Sabaudia : inter « Tainè » et Petit Bornand (leg. de Palézieux).

H. bifidum Kit. ssp. **sinuosifrontiforma** Pal. et Zahn. — Folia oblonga vel lanceolata valde grosse triangulariter pluri-vel multidentata, dentibus valde inæqualibus, in foliorum basi partim latissime triangularibus longis, partim angustioribus vel parvis et in petiolum longum transeuntibus. Caulis leviter breviter pilosus (ut et foliorum margines et petioli) ca. 8 cephalus. Acladium 2-5 cm., rarius 3 valde remoti, imus longus \pm arcuato-erectus. Pedicelli viridicani parce vel disperse breviter pilosi disperse vel modice grandulosi. Involucra 9-10 mm. latissima disperse vel modice breviter pilosa modice vel disperse glandulosa. Squamæ sublatiusculæ acutiusculæ vel acutæ usque ad apicem obscuræ partim virescenti-marginatæ leviter (præsertim in margine et basin versus) floccosæ. Styli luteoli. Ligulæ breves partim longe dentatæ et \pm tubulosæ. Planta \pm glabrescens. Folia caulinum angustissimum

longum breviter dentatum. Foliorum petioli et caulis basis intense violacei.

Sabaudia : Col du Bonhomme près La Balme (leg. de Palézieux).

H. vulgatum Fr. ssp. **gimelense** Pal. et Zahn. — Caulis ca. 6 cm. hypophyllopodus, inferne molliter villosus-albopilosus (3-4 mm.), superne densiuscule vel modice pilosus (2-1 mm.), dense floccosus, parce breviter glandulosus, in determinato-paniculatus pleiocephalus, tenuis, viridis. Pedicelli tenues cani parce vel modice breviter glandulosi modice vel densiuscule pilosi. Involucra ca. 8-9 mm. *disperse vel modice pilosa* et modice vel magis breviterque glandulosa parce floccosa, squamis sublatiusculis acutiusculis vel plerisque acutis, atroviridibus \pm intense dilute (virescenti-) marginatis. Styli initio lutei. Folia 3-4 inferiora approximata longe subalato-petiolata (petiolis costisque dorsalibus sibvillosus-albopilosis, 2-3 mm.) sat magna ovata rotundato-obtusa vel ovato-oblonga vel ovato-lanceolata obtusa vel breviter acuta, abrupte vel sensim in petiolum attenuata, denticulata vel infra medium inæqualiter sat grosse vel breviter tantum dentata, in parte attenuata dentibus angustioribus prædita itaque sagittata, reliqua 8-10 folia remota sensim brevius petiolata vel sessilia ovato- vel oblongo-lanceolata \pm acuminata similiter dentata vel denticulata, superiora in costa dorsali etiam dense pilosa, *omnia mollia*, utrinque (margine dense) pilosa vel supra \pm glabrescentia, subtus albido-viridia.

Vaud : Forêt de Prévondavaux, près Gimel (leg. de Palézieux).

H. florentinum All. ssp. **hirsuticaule** Pal. et Zahn. — Caulis 3-6 cm. efloccosus sæpe usque infra medium glandulosus superne subdensiuscula obscure, deorsum dense dilute setosus (setis etiam in foliis basi atra præditis) paniculatus pleio- vel polycephalus ; aeladio 5-10 mm. ; ramis 3-7 remotis (apice sæpe cymosis) cum pedicellis densiuscula crasse nigroglandulosis et disperse vel sparsim nigrosetosis inferne \pm efloccosis sursum cum pedicellis modice vel densissime floccosis (junioribus tantum canescentibus). Involucra (4-) 5-6 mm. parva modice vel magis glandulosa epilosa vel disperse pilosa leviter tantum (basi densius) floccosa, squamis sublatiusculis acutis obscuris dilutius marginatis. Ligulæ parvæ. Folia exteriora lanceolato-spathulata, reliqua anguste lanceolata, efloccosa, margine costaque dorsali disperse, basin versus magis

setosa (2-4 mm.), caulina 2-5 setoso-ciliata (1-2 mm.), summum sæpe subglandulosum.

Valais : « Bois de Finges » près Sierre (Ph. de Palézieux).

H. Juranum Fr. ssp. **lycopifoliifrons** Pal. et Zahn. — Caulis 4-6 cm., aphyllopodus, pariter ac sæpe folia \pm eximie coloratus, inferne dense, sursum leviter pilosus, indeterminato-ramosus, ramnis ad 10, inferioribus arcuatis minute foliatis tenuibus. Acladium 10-25 mm. Anthela dense breviter glandulosa epilosa albidocanofloccosa. Involucra 9 mm., crassa, densissime vel subtomentosofloccosa epilosa dense breviter glandulosa. Squamæ subangustæ obtusiusculæ vel subacutæ virescenti-marginatæ dorso usque ad apicem obscuræ. Ligulæ apice breviter ciliatæ. Folia ad 15 sensim minora glaucescenti subtus glauco albido-viridia, supra luteo-virescentia, subtus disperse, margine costaque densiuscule breviter (inferiora tantum etiam supra) pilosa, superiora subtus parce floccosa, inferiora submagna elongata elliptico-vel oblongo-lanceolata ad basin petioli formam longe attenuata, sequentia brevius attenuata, media parum attenuata vel subpanduriformia late sessilia semiamplexicaulia, reliqua e basi lata semiamplectante latiora (elliptico-lanceolata) sursum longe tenuiter acuminata, summa sæpe parum amplectentia, omnia irregulariter (majora grosse) multidentata, dentibus plerumque brevibus acutis.

Vallesia : « Gorges du Van sous Salanfe » (Ph. de Palézieux).

H. umbrosum Jord. ssp. **visailense** Pal. et Zahn. — Folia basalia ovato-oblonga vel elliptica vel late ovato-lanceolata obtusiuscula vel breviter acuta subbreviter petiolata ; caulina ca. 6 subcito minora ovato vel oblongo-lanceolata magis acuminata, superiora parva sessilia, inferiora breviter alato-petiolata, basi parum amplectentia omnia in petiolum vel ad basin cito attenuata, micronato-denticulata vel breviter dentata multi-denticulata, supra leviter brevissime pilosa vel glabra, margine petioloque ut in caule dense pilosa (0-5, 2,5 mm.) subtus (basalia in costa (tantum) floccosa. Caulis ca. 4 cm. superne canescens brevissime pilosus et disperse glandulosus. Anthela squarrosa cum involucris densiuscule glandulosa. Involucra atroviridia parce floccosa, squamis acutiusculis vel acutis virescenti-marginatis.

Italia : « Au-dessus de Visaille dans l'Allée Blanche » (Ph. de Palézieux).