

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 18 (1987)

Artikel: À propos de Brachypodium rupestre (Host) Roemer & Schultes (Gramineae)
Autor: Theurillat, Jean-Paul
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099192>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A propos de *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes (Gramineae)

JEAN-PAUL THEURILLAT

RESUME

THEURILLAT, J.-P. (1987). A propos de *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes (Gramineae). *Saussurea* 18: 65-66. En français, résumés français et anglais.

Les caractères morphologiques permettant de distinguer *B. rupestre* de *B. pinnatum* sont donnés d'après SCHIPPMANN (1986).

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P. (1987). About *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes (Gramineae). *Saussurea* 18: 65-66. In French, French and English abstracts.

The morphological characters allowing to distinguish *B. rupestre* from *B. pinnatum* are given according to SCHIPPMANN (1986).

Dans un article paru dans le précédent numéro (THEURILLAT, 1987) nous avons indiqué (p. 109), suivant diverses flores, les caractères permettant de distinguer *Brachypodium rupestre* (Host) Roemer & Schultes de *Brachypodium pinnatum* (L.) P. B. La longueur de la ligule est un des caractères le plus souvent mentionné: "2 (3) mm de long chez *Br. rupestre* et jusqu'à 12 mm chez *Br. pinnatum*". D'aucuns nous ayant fait remarquer que la longueur indiquée pour *B. pinnatum* semblait excessive, il nous est apparu opportun, à la suite des travaux de SCHIPPMANN (1986) dont nous n'avions pas eu connaissance auparavant, de donner des précisions sur cette indication.

D'après Schippmann, l'indication de "12 mm" est manifestement une erreur typographique pour 1-2 mm, à partir des données de ST.-YVES (1934: 440): "Ligulae breves ...usque ad 2 mm ...", qui fut reprise sans autre par la suite dans les flores que nous avons consultées. Suite aux recherches morphologiques et anatomiques effectuées par Schippmann, il apparaît que la plupart des caractères morphologiques généralement retenus ne sont pas constants, exceptés la longueur de la ligule, ainsi que la couleur et la pilosité du limbe.

Brachypodium pinnatum et *B. rupestre* se différencient donc l'un de l'autre comme suit:

- Face inférieure de la feuille couverte de poils raides, courts, dirigés vers l'avant de la feuille (20 ×, mieux 50 ×), très rugueuse au toucher et d'aspect mat; ligule

de la deuxième feuille depuis le haut mesurant 1,6 — 2,8 mm de long; limbe plat, vert foncé; lemnes souvent poilues: *B. pinnatum*.

- Face inférieure de la feuille presque sans poils raides, ceux-ci uniquement présents isolément sur les nervures, d'où face lisse ou à peine rugueuse au toucher, manifestement brillante; ligule de la deuxième feuille depuis le haut mesurant 0,6 — 1,8 mm de long; limbe enroulé ou étalé, vert clair; lemnes souvent glabres: *B. rupestre*.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- SAINT-YVES, A. (1934). Contribution à l'étude des Brachypodium. *Candollea* 5: 427-493.
- SCHIPPMANN, U. (1986). Über Brachypodium rupestre (Host) Roemer et Schultes in Bayern. Unterscheidung und Verbreitung. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 57: 53-56.
- THEURILLAT, J.-P. (1987). Troisième note floristique sur la région d'Aletsch (Valais, Suisse). *Saussurea* 17: 103-117.