

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 28 (1997)

Artikel: Notes de floristique genevoise. 66-85
Autor: Theurillat, Jean-Paul / Latour, Cyrille / Gremaud, Michel / Jeanmonod, Daniel / Perret, Patrick
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099133>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes de floristique genevoise, 66-85

JEAN-PAUL THEURILLAT
CYRILLE LATOUR
MICHEL GREMAUD
DANIEL JEANMONOD
& PATRICK PERRET (éds.)

RÉSUMÉ

THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1997). Notes de floristique genevoise, 66-85. *Saussurea* 28: 77-108. En français, résumés français et anglais.

Une cinquième série de vingt "Notes de floristique" ayant trait au canton de Genève (Suisse) est présentée, regroupant 251 observations. Quatre espèces sont nouvelles pour le canton de Genève par rapport à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER: *Alchemilla xanthochlora* aggr., *Crepis pulchra* L., *Hornungia petraea* (L.) Reichb. et *Salix pentandra* L. De nombreuses observations sont nouvelles pour les trois secteurs genevois de l'"Atlas" pris individuellement. Par ailleurs, plusieurs observations concernent des taxons en danger de disparition, menacés ou rares, aussi bien sur le plan régional (Plateau suisse occidental) que sur l'ensemble de la Suisse.

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (eds.) (1997). Notes of floristics in Geneva, 66-85. *Saussurea* 28: 77-108. In French, French and English abstracts.

A fifth series of twenty "Notes of floristics" concerning the canton of Geneva (Switzerland) is presented, consisting of 251 observations. Four species are new for the canton according to the WELTEN & SUTTER's "Atlas": *Alchemilla xanthochlora* aggr., *Crepis pulchra* L., *Hornungia petraea* (L.) Reichb. and *Salix pentandra* L. Many observations are new for the three Geneva sectors of the "Atlas" taken individually. Moreover, several observations relate to endangered, vulnerable or rare taxa at the regional level (western Swiss Plateau) as well as at the national level.

Organisation des "Notes" 66-85

La cinquième série de "Notes" regroupe vingt contributions qui contiennent au total 251 observations réalisées dans les années 1992-1997.

L'organisation de ces "Notes" est identique à celle décrite dans les trois précédentes séries (THEURILLAT & al., 1994-1996).

Observations aux "Notes" 66-85

Une analyse des données par rapport à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982), au "Catalogue" de WEBER (1966) et à la "Liste rouge" de LANDOLT (1991) permet de faire ressortir l'intérêt des "Notes" 66-85. Les observations parmi les plus intéressantes ont été regroupées ci-après en indiquant entre parenthèses le numéro des "Notes" dans lesquelles elles se trouvent.

En se référant à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982), quatre nouvelles espèces sont signalées pour le canton de Genève:

Alchemilla xanthochlora (78)

Crepis pulchra (78)

Hornungia petraea (78)

Salix pentandra (78)

La plupart des autres taxons signalés figurent dans la "Liste rouge" (LANDOLT, 1991). Parmi ceux-ci, 4 taxons considérés comme "disparus" pour le Plateau occidental ont été retrouvés, et de nouvelles stations ont été découvertes pour 3 autres taxons de cette catégorie. Des stations ont été confirmées pour 42 taxons considérés comme étant "très menacés" de disparition, ainsi que pour 14 taxons considérés comme intrinsèquement "rares". La plupart des taxons "très menacés" sur le Plateau suisse occidental qui sont signalés sont en majeure partie également soit "très menacés", soit "menacés" ou "rares" sur l'ensemble de la Suisse. La liste ci-dessous regroupe les taxons "très menacés" et les taxons "rares" observés, avec l'indication de leur rareté à Genève, calculée d'après l'"Atlas" (r: rare; p: peu fréquent; voir THEURILLAT & al., 1990), et de leur degré de menace pour le Plateau occidental et pour la Suisse (Ex: disparu; E: très menacé; V: menacé; R: rare; A: attractif). Les taxons suivis d'un astérisque (*) ont déjà été cités dans les "Notes" 1-65.

Rareté à GE	Menace Plateau occid.	Menace Suisse	
r	Ex		<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (83)*
r	Ex	V	<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>racemosus</i> (83)
r	Ex	E	<i>Filago vulgaris</i> (75)
r	Ex	Ex	<i>Scrophularia auriculata</i> (78)*
r	Ex		<i>Sedum cepaea</i> (75)
r	(Ex)	(R)	<i>Sisymbrium irio</i> (78)*
p	Ex	V	<i>Papaver argemone</i> (71)
r	E		<i>Aira caryophylla</i> (78)*
r	E	V	<i>Alopecurus aequalis</i> (83)*
r	E		<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (71, 75)*
r	E	V	<i>Camelina sativa</i> (75)
r	E	V	<i>Chenopodium ficifolium</i> (83)
r	E		<i>Cirsium acaule</i> (84)*
r	E	E	<i>Coronopus squamatus</i> (78)*
r	E	A	<i>Cyclamen purpurascens</i> (78)
r	E	E	<i>Herniaria hirsuta</i> (73, 75)
r	E	E	<i>Himantoglossum hircinum</i> (78, 79, 85)*

r	E	E	<i>Isopyrum thalictroides</i> (66, 68, 78)*
r	E	E	<i>Lathyrus hirsutus</i> (78)*
r	E	E	<i>Leontodon saxatilis</i> (80)
r	E	E	<i>Lythrum hyssopifolia</i> (78)
r	E	V	<i>Ophrys apifera</i> subsp. <i>apifera</i> (72)*
r	E	E	<i>Ranunculus sardous</i> (75)*
r	E	V	<i>Rapistrum rugosum</i> (71)*
r	E	E	<i>Sedum rubens</i> (78)
r	E		<i>Tragopogon dubius</i> (78)*
r	E	E	<i>Vaccaria hispanica</i> (75)
r	E	E	<i>Verbascum phlomoides</i> (78)
r	E		<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>crassifolium</i> (78)
r	E	E	<i>Vulpia ciliata</i> (78)
p	E	R	<i>Agrimonia procera</i> (78)*
p	E		<i>Artemisia absinthium</i> (74)*
p	E	E	<i>Carduus tenuiflorus</i> (75, 83)
p	E		<i>Cerastium pumilum</i> subsp. <i>pumilum</i> (78)*
p	E	R	<i>Clematis recta</i> (78)
p	E		<i>Coeloglossum viride</i> (72)
p	E	R	<i>Erythronium dens-canis</i> (66, 70)*
p	E	E	<i>Filago pyramidata</i> (75)*
p	E		<i>Galium spurium</i> (78)
p	E	V	<i>Heliotropium europaeum</i> (71, 75, 78)*
p	E		<i>Lithospermum arvense</i> (75)*
p	E	V	<i>Minuartia hybrida</i> (71, 78)*
p	E	E	<i>Picris echioides</i> (75)
p	E	V	<i>Saxifraga granulata</i> (67)*
p	E	E	<i>Sison amomum</i> (78)*
p	E		<i>Tanacetum corymbosum</i> (81)*
p	E	V	<i>Torilis arvensis</i> (75, 78)*
p	E	V	<i>Trifolium ochroleucon</i> (78)*
p	E	E	<i>Valerianella rimosa</i> (71, 75, 78)*
r	(R)	E	<i>Althaea hirsuta</i> (78, 83)*
r	(R)		<i>Artemisia verlotiorum</i> (75, 78)
r	R		<i>Asarum europaeum</i> (74)
r	(R)		<i>Asparagus officinalis</i> (83)*
r	(R)	(R)	<i>Aster novae-angliae</i> (83)
r	(R)	(R)	<i>Euphorbia humifusa</i> (78)*
r	(R)		<i>Hieracium aurantiacum</i> (78)
r	(R)		<i>Lotus glaber</i> (78)*
r	(R)	V	<i>Onopordum acanthium</i> (75)
r	R		<i>Tanacetum parthenium</i> (78)*
r	(R)	V	<i>Trifolium patens</i> (78)*
r	R		<i>Veronica urticifolia</i> (84)*
p	R		<i>Bromus ramosus</i> (71)*
p	R		<i>Hieracium lachenalii</i> (78)

Par rapport aux secteurs de WELTEN & SUTTER (1982), 11 taxons sont nouveaux pour le secteur 201, et 5 indications "littérature" y sont confirmées. Pour le secteur 202, 9 taxons sont nouveaux, alors que 13 indications "littérature" et 4 indications "herbier" sont confirmées. Enfin, pour le secteur 203, 7 taxons sont nouvellement observés, alors que 3 indications "littérature" et 6 indications "herbier" sont confirmées. Cela porte le nombre de taxons recensés à 849 dans le secteur 201, 799 dans le secteur 202 et 810 dans le secteur 203, en ne tenant compte que des taxons retenus dans l'"Atlas".

Note de floristique genevoise 66

DAVID AESCHIMANN

Liliaceae

Erythronium dens-canis L.: Carouge, "Val d'Arve", 400 m, pente boisée (exposition nord), 500.50/115.30, 26-3-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 70].

Ranunculaceae

Isopyrum thalictroides L.: Chancy, entre le village de Chancy et le bord du Rhône, 350 m, au pied d'un vieil arbre mort étouffé par *Hedera helix*, 486.48/112.03, 14-5-1997, DAe5149.

Veyrier, "Sous Pinchat", bord du sentier faisant un raccourci dans le virage de la route montant du Val d'Arve à Pinchat, 395 m, sous-bois, 500.725/114.975, 21-3-1997, DAe5146.

[L, sect. 202; signalé à Chancy et à "Carouge, Sous-Pinchat" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 68 et 78].

Note de floristique genevoise 67

DAVID AESCHIMANN & CATHERINE LAMBELET

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Laconnex, "Allues", vers la réserve de Laconnex, 435 m, friche de quatrième année, 491.025/112.800, 15-6-1995, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Laconnex-Soral" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 43].

Note de floristique genevoise 68

DAVID AESCHIMANN & CHRISTINE VAZ

Ranunculaceae

Isopyrum thalictroides L.: Chancy, village de Chancy, Chemin des Carrés, en face de l'immeuble locatif, 355 m, haie, 486.45/111.75, 9-4-1997, DAe5147.

Chancy, au nord du "Bois des Crevasses", 150 mètres au sud-est du poste de douane de Chancy II, 360 m, forêt, 486.75/110.80, 9-4-1997, DAe5148.

[L, sect. 202; signalé à Chancy par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 66 et 78].

Note de floristique genevoise 69

PATRICK CHARLIER & CATHERINE LAMBELET

Leguminosae

Medicago minima (L.) L.: Laconnex, "Champ Courbe", 440 m, friche de troisième année, 490.90/112.30, 24-6-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Verbascum pulverulentum Villars: Laconnex, "Allues", 435 m, friche de cinquième année, 491.025/112.825, 12-6-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 75].

Note de floristique genevoise 70

PHILIPPE CUÉNOUD

Liliaceae

Erythronium dens-canis L.: Onex, "Bois de la Chapelle", 371 m, bord de sentier forestier, 496.30/116.45, 25.03.1995, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Onex, Rhône" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 66].

Note de floristique genevoise 71

MICHEL GRENON

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.: Avusy, Sézegnin, 400 m, champ, 489/111, 12-8-1995, SBG00130 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 30 et 75].

Caryophyllaceae

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Avusy, Sézegnin, 428 m, bloc de moraine, 489.96/111.29, 29-4-1995, SBG00122 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 8 et 49].

Moehringia trinervia (L.) Clairv.: Avusy, Sézegnin, 390 m, bord de la Laire, 489/111, 10-6-1995, SBG00119 [nouveau, sect. 202].

Compositae

Achillea ptarmica L.: Jussy, Monniaz, 495 m, champ, 512.26/121.82, 9-11-1996, SBG00134 [nouveau, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "jadis commun"; voir aussi "Notes" 18 et 39].

Cruciferae

Rapistrum rugosum (L.) All.: Avusy, Sézegnin, Route de Soral, 430 m, champ (station détruite en novembre 1996), 489.96/111.36, 10-6-1995, SBG00124 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 46 et 51].

Gramineae

Bromus ramosus Hudson: Avusy, Sézegnin, 400 m, 489/111, 2-11-1996, SBG00131 [L, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 23 et 61].

Milium effusum L.: Avusy, Sézegnin, 385 m, lisière, 489.00/111.14, 10-6-1995, SBG00126 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 43, 51 et 61].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Avusy, Sézegnin, 410 m, bas de talus, 489.90/111.30, 2-11-1996, SBG00127 [L, sect. 202; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 8, 16, 18, 30, 46 et 59].

Stachys arvensis (L.) L.: Jussy, Monniaz, 510 m, champ, 512.45/121.60, 9-11-1996, SBG00133 [H, sect. 202; station signalée par WEBER (1966)].

Leguminosae

Medicago arabica (L.) Hudson: Avusy, Sézegnin, Route de Soral, 410 m, bord de vigne, 489.95/111.34, 29-4-1995, SBG00121 [L, sect. 202; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18, 39, 49 et 57].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Avusy, Sézegnin, 400 m, bord de la Laire, sur troncs d'arbres couchés, 489.80/111.14, 25-3-1995, SBG00120 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 19, 49, 74 et 84].

Papaveraceae

Papaver argemone L.: Avusy, Sézegnin, Route de Soral, 430 m, champ (station détruite en novembre 1996), 489.97/111.36, 22-5-1995, SBG00125 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Polygonaceae

Rumex conglomeratus Murray: Jussy, Monniaz, "Les Châtaignières", 495 m, champ argileux, 512.10/121.98, 9-11-1996, SBG00136 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Notes" 47 et 78].

Ranunculaceae

Ranunculus tuberosus Lapeyr.: Jussy, Monniaz, 495 m, sous-bois, 512.20/121.40, 30-5-1992, SBG00132 [nouveau, sect. 203; pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"; voir aussi "Note" 57].

Rosaceae

Rosa corymbifera Borkh.: Avusy, Sézegnin, 420 m, lisière, 489.75/111.93, 22-5-1994, SBG00128 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Avusy, Sézegnin, Route de Soral, 430 m, champ, 489.96/111.36, 10-6-1995, SBG00123 [nouveau, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 18, 39, 61 et 75].

Note de floristique genevoise 72

ELISABETH HARTMANN

Orchidaceae

Coeloglossum viride (L.) Hartman: Vernier, “Bois de la Grille”, 426 m, plateau humide, clairière, 1996, 496/118, sine exsicc. [L, sect. 201; signalé au “Bois des Frères” par WEBER (1966)].

Ophrys apifera Hudson subsp. *apifera*: Vernier, Aïre, jardin, 420 m, talus, 496/117, 1996, sine exsicc. [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “jadis (...), Bois des Frères”; voir aussi “Notes” 15 et 39].

Orchis purpurea Hudson: Vernier, “Bois de la Grille”, ca. 420 m, clairière, 496/118, 08-5-1994, sine exsicc. [rare, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 73

ANDRÉ HENRIQUÈS

Caryophyllaceae

Herniaria hirsuta L.: Genève, gare des Eaux-Vives, 402 m, interstices entre dalles, 501/117, 1996, sine exsicc. [L, sect. 203; indiqué “assez commun” par WEBER (1966)]

Note de floristique genevoise 74

FERNAND JACQUEMOUD

Aristolochiaceae

Asarum europaeum L.: Chancy, “Moulin Roget”, ca. 370 m, ravin, à la lisière d’un sous-bois relictuel, 487/112, 16-4-1993, FJ5368 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 61].

Compositae

Artemisia absinthium L.: Chancy, “Meuron”, ca. 426 m, talus, 489/113, 13-5-1993, FJ5394 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Chancy, vallon boisé entre Passeiry et Cannelet, 410 m, au pied d’un *Carpinus*, 488/112, 19-9-1994, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 19, 49, 71 et 84].

Note de floristique genevoise 75

CATHERINE LAMBELET

Amaranthaceae

Amaranthus graecizans L.: Versoix, Sauvigny, "Château-des-Chavannes", 465 m, haie basse récemment plantée, 498.825/129.700, 17-9-1997, CLH9704 [fréquent, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.: Chancy, Passeiry, 420 m, friche de première année, 489.050/112.75, 6-6-1995, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 30 et 71].

Lithospermum arvense L.: Chancy, Passeiry, 420 m, friche de première année, 489.050/112.75, 6-6-1995, sine exsicc. [nouveau, sect. 202; n'est pas "commun" comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi "Note" 16].

Campanulaceae

Campanula rapunculoides L.: Laconnex, "Mollaz", le long du Chemin des Ecoliers, 435 m, bordure d'un champ de colza, 491.925/112.050, 21-6-1994, sine exsicc. [nouveau, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 19].

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix: Versoix, Sauvigny, "Château-des-Chavannes", 465 m, haie basse récemment plantée, 498.70/129.50, 18-6-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; indiqué "assez commun dans le S-O du canton" par WEBER (1966)].

Caryophyllaceae

Gypsophila muralis L.: Versoix, "Bois de la Gueule", lisière sud-est, direction "Le Biolay", 423 m, prairie fleurie semée en mai 1997, 499.825/127.500, 10-9-1997, sine exsicc.

Versoix, "Petit-St-Loup", 423 m, jachère florale (semée) d'une année, en lisière de bosquet, 500.525/127.100, 16-9-1997, sine exsicc.

Versoix, Sauvigny, "Château-des-Chavannes", 465 m, haie basse récemment plantée, 498.825/129.700, 17-9-1997, CLH9705.

Versoix, Douane de Sauvigny, 455 m, prairie fleurie semée en mai 1997, 498.55/129.75, 17-9-1997, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 8, 15, 18, 39 et 57].

Herniaria hirsuta L.: Laconnex, "Sur Chêne", 440 m, friche de première année, 491.38/111.95, 15-6-1992, CLH9201 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert: Choulex, “Les Creuses” sous “Carre d’Aval”, 430 m, jachère florale (semée) d’une année, 507.10/120.90, 18-6-1996, sine exsicc. [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Compositae

Artemisia verlotiorum Lamotte: Chancy, Passeiry, 420 m, jardin potager, 489.10/112.70, 6-6-1997, sine exsicc. [L, sect. 202; plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 78].

Aster novi-belgii aggr.: Avusy, “Champs Pointus”, 440 m, friche de première année, 491.00/111.80, 19-10-1993, sine exsicc.

Laconnex, “Sur Chêne”, 440 m, friche de première année, 491.38/111.95, 19-10-1993, sine exsicc.

[L, sect. 202; indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Bidens tripartita L. subsp. *tripartita*: Choulex, “Les Creuses”, 430 m, prairie avec traces de labour, 507.15/121.00, 21-8-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39 et 78].

Carduus tenuiflorus Curtis: Laconnex, “Champ Courbe”, 440 m, friche de deuxième année (station disparue en 1994 (gravière)), 490.400/112.425, 30-6-1993, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 83].

Filago pyramidata L.: Avully, “Ferrage”, 430 m, friche de première année, 489.40/113.55, 30-6-1993, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique “jadis très commun”; voir aussi “Notes” 3 et 46].

Filago vulgaris Lam.: Laconnex, “Lolliets”, 445 m, friche de première année, 491.533/111.900, 22-6-1994, CLH9401 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Onopordum acanthium L.: Laconnex, “Champ Courbe”, 440 m, friche de première année (retrouvé l’année suivante, puis disparu), 490/112, 6-7-1994, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Picris echioides L.: Avully, “Les Ronziers”, 425 m, talus entre chemin et champ, 489.25/112.90, 18-6-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique “en voie d’extension”; voir aussi “Note” 6].

Crassulaceae

Sedum cepaea L.: Versoix, “Petit-St-Loup”, 423 m, jachère florale (semée) d’une année, en lisière de bosquet, 500.525/127.100, 16-9-1997, CLH9703 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Cruciferae

Camelina sativa (L.) Crantz: Choulex, “Les Creuses” sous “Carre d’Aval”, 430 m, jachère florale (semée) d’une année, 507.10/120.90, 18-6-1996, sine exsicc. [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “jadis cultivé”].

Gramineae

Panicum dichotomiflorum Michaux: Collex-Bossy, “Le Seuchat”, 430 m, jachère florale d’une année, 498.50/125.70, 4-9-1997, CLHxxxx.

Versoix, Observatoire, lisière sud-ouest du “Bois Ruiné”, 455 m, jachère florale d’une année, 499.450/129.475, 3-8-1997, sine exsicc.

[Sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Notes” 8, 39, 47 et 49].

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Collex-Bossy, “Le Seuchat”, 430 m, jachère florale d’une année, 498.50/125.70, 22-5-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 201].

Chancy, Passeiry, 420 m, friche de deuxième année, 489.05/112.75, 13-6-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; voir aussi “Notes” 46, 57, 61, 76 et 83].

[N’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Collex-Bossy, “Le Seuchat”, 430 m, jachère florale d’une année, 498.50/125.70, 4-9-1996, sine exsicc. [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 7].

Lamium amplexicaule L.: Avully, “Ferrage”, 430 m, friche de première année, 489.40/113.55, 30-6-1993, sine exsicc.

Soral, “Lolliets”, 445 m, friche de première année, 491.50/111.20, 18-6-1992, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Note” 78].

Lamium hybridum Villars: Collex-Bossy, “Le Seuchat”, 430 m, jachère florale d’une année, 498.50/125.70, 22-5-1996, sine exsicc.

Collex-Bossy, “La Rosière”, 450 m, jachère florale (semée) d’une année en plein champ, 498.45/126.50, 24-5-1997, sine exsicc.

[L, sect. 201; signalé à “Bossy-Rosière” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18 et 62].

Leguminosae

Trifolium arvense L.: Versoix, Douane de Sauverny, 455 m, prairie fleurie semée en mai 1997, 498.55/129.75, 17-9-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; voir aussi “Notes” 2, 3, 7, 8, 18, 39 et 57].

Avully, “Ferrage”, 430 m, friche de première année, 489.40/113.55, 30-6-1993, sine exsicc.

Chancy, Passeiry, 420 m, friche de première année, 489.05/112.75, 6-6-1995, sine exsicc.

[Nouveau, sect. 202; voir aussi “Notes” 3, 18, 20 et 46].

[Est plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), mais pas “très commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Vicia tetrasperma (L.) Schreber: Versoix, “La Bécassière”, 410 m, jachère florale (semée) d’une année en bordure de haie, 501.65/127.90, 3-9-1997, sine exsicc.

Versoix, “Bois de la Gueule”, lisière sud-est, direction “Le Biolay”, 423 m, prairie fleurie semée en mai 1997, 499.825/127.500, 10-9-1997, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; signalé à la “Grande-Mouille” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15, 18 et 39].

Vicia villosa Roth subsp. *villosa*: Chancy, Passeiry, 425 m, friche de deuxième année, 489.05/112.75, 12-6-1996, CLH9601 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3 et 18].

Polygonaceae

Polygonum amphibium L.: Laconnex, “Mollaz”, champ le long du Chemin des Ecoliers, 435 m, friche de première année, 491.90/111.95, 19-10-1993 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “jadis plus commun”].

Ranunculaceae

Ranunculus arvensis L.: Chancy, Passeiry, 420 m, friche de première année, 489.05/112.75, 6-6-1995, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “assez commun dans le S-O du canton” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Ranunculus sardous Crantz: Choulex, “Les Creuses”, 430 m, prairie artificielle (semée), 506.95/121.15, 18-6-1996, sine exsicc. [sect. 203; nouveau pour le canton d’après WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons récoltés au siècle dernier dans l’herbier de Genève (G); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique “jadis assez commun”; il est possible que ce taxon soit confondu avec *R. bulbosus* L.].

Resedaceae

Reseda luteola L.: Laconnex, “Champ Courbe”, 440 m, friche de première année, 490.80/112.30, 3-7-1992, sine exsicc.

Laconnex, “Champ Courbe”, 440 m, friche de première année, 490.950/112.325, 6-7-1994, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Misopates orontium (L.) Raf.: Laconnex, “Allues”, vers la réserve de Laconnex, 440 m, friche de première année, 491.025/112.800, 3-7-1992, sine exsicc.

Laconnex, “Champ Courbe”, 440 m, friche de première année, 490/112, 6-7-1994, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Verbascum pulverulentum Villars: Chancy, Passeiry, 420 m, friche de deuxième année, 489.05/112.75, 12-6-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 69].

Umbelliferae

Torilis arvensis (Hudson) Link: Chancy, Passeiry, 430 m, friche de deuxième année, 489.05/112.75, 3-7-1996, CLH9604 [nouveau, sect. 202; n’est pas “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 16 et 55].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Chancy, Passeiry, 420 m, friche de première année, 489.05/112.75, 6-6-1995, sine exsicc. [nouveau, sect. 202; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 18, 39, 61 et 71].

Note de floristique genevoise 76

CATHERINE LAMBELET & PATRICK CHARLIER

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Avully, “Ferrage”, 430 m, friche de deuxième année, 489.40/113.55, 22-6-1994, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 46, 57, 61, 75 et 83].

Note de floristique genevoise 77

CATHERINE LAMBELET & PAUL MULLER

Labiatae

Stachys arvensis (L.) L.: Collex-Bossy, “La Foretaille”, 435 m, jachère florale (semée) d’une année en plein champ, 498.85/126.00, 27-8-1997, CLH9701 [rare, sect. 201; signalé à “Bossy à Champ-Fabry” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 57].

Ranunculaceae

Ranunculus arvensis L.: Collex-Bossy, “La Rosière”, 450 m, jachère florale (semée) d’une année en plein champ, 498.45/126.50, 24-5-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “assez commun dans le S-O du canton” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 25].

Note de floristique genevoise 78*

CYRILLE LATOUR

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Satigny, près de l’enceinte du CERN, 430 m, vignes, 492.42/120.85, 2-8-1994, CAL01131 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 3, 8, 18 et 35].

Amaranthus graecizans L.: Plan-les-Ouates, 460 m, friche, 498.22/112.52, 10-8-1994, CAL01175.

Plan-les-Ouates, Saconnex d’Arve Dessous, 422 m, au bord d’un champ de choux, 498.95/113.27, 16-9-1997, CAL02215.

Soral, 447 m, fossé en bord de route, 491.40/110.98, 29-7-1994, CAL01116.

[Rare, sect. 202; signalé à Plan-les-Ouates par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 30, 49 et 59].

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.: Satigny, Bourdigny, 440 m, vignes, 492.28/120.22, 2-8-1994, CAL01133 [rare, sect. 201; signalé à “Peney” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8, 39, 47 et 83].

Heliotropium europaeum L.: Vernier, Aïre, 390 m, terrain vague (station vouée à disparaître au profit de villas), 496.43/116.88, 8-8-1997, CAL02185 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à “Aïre” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

*Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Lithospermum officinale L.: Gy, “En Chambet”, rive droite du Chambet, 456 m, lisière du bois riverain, 509.32/122.07, 2-8-1995, CAL01643 [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Myosotis ramosissima Rochel: Vernier, route de la Renfile, 432 m, talus, 496.03/119.56, 25-3-1994, CAL00680-2 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15, 35, 39 et 62].

Campanulaceae

Campanula rapunculus L.: Meyrin, “La Maille”, 451 m, bord de champ, 493.60/122.15, 9-6-1995, CAL01413-2.

Vernier, 420 m, pré, 496.60/119.83, 22-6-1995, CAL01486.

[L, sect. 201; signalé à “Vernier, Aïre” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 15, 18, 55 et 62].

Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L.: Satigny, “Grand Champ”, 486 m, talus, 491.30/120.47, 18-7-1995, CAL01613 [nouveau, sect. 201].

Caryophyllaceae

Cerastium pumilum Curtis subsp. *pumilum*: Vernier, arrêt CFF, 430 m, bord de voie CFF, 496.31/119.65, 22-6-1995, CAL01480 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Cucubalus baccifer L.: Genève, Conservatoire et Jardin botaniques, 389 m, parc, au pied d’un *Picea asperata*, 500.22/120.10, 3-10-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; signalé à “Plainpalais et Petit-Saconnex” par WEBER (1966)].

Jussy, borne-frontière n° 121, 506 m, haie de ronces, 511.73/119.95, 12-9-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Satigny, près de l’enceinte du CERN, 430 m, vignes, 492.42/120.85, 2-8-1994, CAL01132 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 15, 29, 55 et 62].

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.: Meyrin, “La Maille”, 448 m, fossé humide, 493.64/122.08, 9-6-1995, CAL01412 [rare, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Compositae

Ambrosia artemisiifolia L.: Le Grand-Saconnex, environs de Palexpo, 425 m, bande herbeuse longeant l'autoroute, 497.95/121.15, 4-9-1996, CAL02099.

Meyrin, "La Berne", 443 m, champ de tournesols, 494.20/121.57, 6-7-1995, CAL01556.

[Sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Anthemis arvensis L.: Satigny, "Montfleury", 430 m, bande herbeuse en bord de route, 494.25/119.30, 6-6-1995, CAL01386 [nouveau, sect. 201].

Bernex, presqu'île de Loëx, "Les Deux Fonds", 388 m, bord de champ, 495/118, 24-6-1993, CAL00411-2 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "commun dans le S-O du canton" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 83].

Arctium minus Bernh. subsp. *minus*: Satigny, 430 m, bord de route, 494.48/118.75, 4-8-1994, CAL01145 [nouveau, sect. 201; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2 et 8].

Artemisia verlotiorum Lamotte: Bardonnex, "En Combe", dans l'enceinte de la gravière, 460 m, près de l'Arande, à l'ombre des arbres, 496.38/111.12, 24-9-1994, CAL01262 [L, sect. 202; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 75].

Aster novi-belgii aggr.: Vernier, 410 m, bord de sentier, 496.42/119.10, 26-8-1997, CAL02204 [L, sect. 201; signalé à "La Renfile" par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Note" 7].

Bidens tripartita L. subsp. *tripartita*: Le Grand-Saconnex, zone nature des "Prejins", 428 m, bord de l'étang, 497/121, 4-9-1996, CAL02097 [fréquent, sect. 201].

Jussy, "Les Grands Bois", 507 m, fossé qui longe le sentier forestier, 512.20/120.72, 23-8-1996, CAL02089.

Jussy, sur la frontière, 502 m, entre champ et lisière, 512.66/122.90, 23-9-1997, sine exsicc.

Presinge, "Les Faverges", 500 m, pré, 510/119, 5-8-1997, sine exsicc.

Presinge, bord de la route frontalière, 502 m, entre le champ moissonné et le fossé, 511.07/119.47, 12-9-1997, sine exsicc.

Vandœuvres, 431 m, bord de route, 505.70/118.59, 10-8-1995, CAL01668.

[Fréquent, sect. 203; voir aussi "Notes" 39 et 75].

[N'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme indiqué par WEBER (1966)].

Crepis pulchra L.: Bellevue, "Bois d'Avault", chemin qui mène à une cabane en lisière de forêt, 426 m, décombres, 499.81/124.40, 4-6-1997, CAL02128 [sect. 201].

Confignon, bord de l'autoroute, 400 m, talus, 496.05/114.17, 12-6-1997, CAL02144.

Plan-les-Ouates, bretelle d'accès à l'autoroute, 410 m, talus, 496.59/113.32, 12-8-1997, sine exsicc.

[Sect. 202].

[Nouveau pour le canton].

Galinsoga parviflora Cav.: Confignon, "Plaine de l'Aire", 402 m, bord de champ potager, 496.92/114.07, 27-8-1997, CAL02207 [nouveau, sect. 202].

Hieracium aurantiacum L.: Gy, "Les Platières", 468 m, au pied de la haie qui entoure la propriété, 510.27/122.42, 13-7-1995, CAL01589.

Thônex, zone résidentielle, 427 m, en bas d'un petit talus en-dessous d'une habitation, 505.81/117.15, 4-8-1997, CAL02181.

[Nouveau, sect. 203].

Hieracium lachenalii C. Gmelin: Soral, 420 m, bord de la Laire, bois riverain, 491/110, 29-7-1994, CAL01123-2 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Hieracium sabaudum aggr.: Collex-Bossy, "Bois Prodom", 465 m, fossé à la lisière du bois, 497.76/127.00, 15-7-1995, CAL01593 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 8].

Chancy, "Bois des Bouchets", 405 m, fossé en bord de chemin forestier, 487.14/110.62, 18-8-1994, CAL01203 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Note" 46].

[Indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Senecio jacobaea L.: Chancy, "Bois des Bouchets", 420 m, fossé en bord de chemin forestier, 487.05/110.31, 18-8-1994, CAL01192 [nouveau, sect. 202].

Serratula tinctoria L. subsp. *tinctoria*: Choulex, bord de la Seymaz, rive gauche, 429 m, en haut du talus, 506.97/119.95, 24-7-1997, CAL02170 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Sonchus arvensis L. subsp. *arvensis*: Collonge-Bellerive, "La Repentance", 437 m, friche, 506.52/123.22, 5-9-1996, CAL02105 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.: Pregny-Chambésy, petite route résidentielle, 382 m, jointure entre le bitume de la route et le trottoir, 500.56/121.90, 18-8-1997, CAL02192 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 55].

Tragopogon dubius Scop.: Plan-les-Ouates, zone industrielle, 400 m, bord de chemin, 497.35/114.02, 18-6-1997, CAL02151 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Note" 43].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Meyrin, entre “La Planta” et Mategnin, 435 m, bord de la route, 495.59/121.80, 25-6-1997, sine exsicc.

Satigny, Route de Peney, 419 m, bord de trottoir, 494.31/118.36, 23-6-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 7, 29, 39 et 57].

Plan-les-Ouates, Route de Base, 401 m, bord de trottoir, 497.06/114.07, 18-6-1997, sine exsicc. [L, sect. 202; voir aussi “Notes” 3 et 61].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Cruciferae

Bunias orientalis L.: Onex, bord de la route, près du point 404 m, en bas du petit talus, 497.45/115.15, 3-6-1997, CAL02127 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 83].

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch.: Lancy, “Ancien Prieuré de St. Georges”, 413 m, bord de chemin, 497.41/117.18, 10-7-1997, CAL02162 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 6].

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Genève, carrefour du Bouchet, 430 m, pied d’immeuble, 498.02/119.12, 20-6-1995, CAL01451 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 7 et 18].

Bardonnex, “Tuilerie”, 465 m, décombres plus ou moins humides, 496.47/111.67, 24-9-1994, CAL01259 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Erucastrum gallicum (Willd.) O. Schulz: Meyrin, zone industrielle de Zimeysa, au nord de Montfleury, 442 m, bord de voie ferroviaire de garage, 494.35/119.80, 6-6-1995, CAL01392.

Vernier, terrain de moto-cross, 410 m, 496.47/119.02, 22-6-1995, CAL01490.

[Nouveau, sect. 201].

Vandœuvres, 431 m, pied de mur, 505.70/118.59, 10-8-1995, CAL01664 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note” 18].

[Pas de station connue par WEBER (1966), qui indique “jadis assez commun”].

Hornungia petraea (L.) Reichb.: Collonge-Bellerive, près du point 374 m, parking à dériveurs, 505.27/124.48, 27-3-1997, CAL02106 [nouveau pour le canton, sect. 203; signalé uniquement sur le “toit du Conservatoire botanique, 1954-1966” par WEBER (1966), qui indique “jadis plusieurs colonies”; indication non reprise par WELTEN & SUTTER (1982)].

Lepidium rudemale L.: Meinier, village de Meinier, entrée de cour de ferme, 440 m, 507.10/122.44, 29-7-1995, CAL01641.

Puplinge, village de Puplinge, 430 m, banquette herbeuse, 506/118, 10-6-1995, CAL01421.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi “Notes” 1 et 18].

Lepidium virginicum L.: Satigny, Satigny-Dessous, gare de Satigny, 415 m, fente dans le bitume, 491/119, 25-8-1994, CAL01214.

Satigny, Satigny-Dessous, environs de la gare, 412 m, interstice en bordure de trottoir, 491/119, 11-8-1995, CAL01685.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 7, 8, 18, 37 et 39].

Sisymbrium irio L.: Genève, carrefour du Bouchet, 430 m, pied d'immeuble, 498.11/119.15, 20-6-1995, CAL01450 [L, sect. 201; signalé à la “gare de marchandises” par WEBER (1966)].

Cyperaceae

Carex demissa Hartman: Gy, près des “Prés de Villette”, aux environs de la borne-frontière n° 176, 470 m, sentier-clairière frontalier, 510/123, 9-6-1997, CAL02133 [H, sect. 203; taxon non retenu par WEBER (1966)].

Carex distans L.: Meyrin, bois de “La Citadelle”, 432 m, 495/121, 21-5-1995, CAL01363 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1966)].

Plan-les-Ouates, 406 m, butte végétalisée, 498.41/113.72, 15-5-1995, CAL01351 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note” 3].

[N'est pas “commun” comme l'indique WEBER (1966)].

Carex flava L.: Collex-Bossy, “Bois Prodom”, entre les bornes-frontière n° 15 et n° 16, 476 m, fossé humide du bord de route, en lisière, 497/127, 15-7-1995, CAL01602 [H, sect. 201; voir aussi “Note” 62].

Gy, 467 m, au bord d'un étang, 510.47/122.84, 9-6-1997, CAL02136 [H, sect. 203; voir aussi “Note” 48].

[Pas de station connue par WEBER (1966)].

Isolepis setacea (L.) R. Br.: Meyrin, “La Maille”, 450 m, fossé humide en bord de champ, 493.80/122.30, 9-6-1995, CAL01417 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “disparu” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 35].

Schoenoplectus tabernaemontani (C. Gmelin) Palla: Choulex, entre la haie arborée et le petit bois, 429 m, zone humide, 506.93/119.91, 24-7-1997, CAL02169 [L, sect. 203; pas de station connue par WEBER (1966)].

Dipsacaceae

Succisa pratensis Moench: Meyrin, forêt claire, 450 m, bord de sentier forestier, 493.31/122.00, 10-9-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 201].

Jussy, “Les Trembles”, 493 m, talus au bord de l'étang, 512/122, 23-9-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 203].

[N'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Ericaceae

Calluna vulgaris (L.) Hull: Collex-Bossy, lisière du “Bois Prodom”, 474 m, 497.37/127.20, 17-9-1997, CAL02217 [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Note” 83].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Meinier, entre “La Repentance” et “Les Varlioudes”, 446 m, champ moissonné, 506.75/123.27, 5-9-1996, CAL02102 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note” 39].

Euphorbia humifusa Willd.: Genève, “La Console”, 378 m, plate-bande, 500.45/120.23, 27-7-1995, CAL01636 [nouveau, sect. 201].

Gentianaceae

Gentiana germanica Willd.: Gy, Bois de Jussy, aux environs des “Prés de Villette”, près de la borne-frontière n° 176, 471 m, sentier-clairière frontalier, 510/123, 22-9-1997, CAL02220 [nouveau, sect. 203].

Gramineae

Aira caryophyllea L.: Meyrin, zone industrielle de Zimeysa, 429 m, talus, 494.17/119.95, 6-6-1995, CAL01395 [H, sect. 201; signalé à Meyrin par WEBER (1966); voir aussi “Note” 8].

Eragrostis minor Host: Vernier, village de Vernier, 445 m, pavement de cailloux (rue piétonne), 495.22/118.80, 21-09-1994, CAL01273 [L, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 7, 8, 18, 25, 27, 39 et 49].

Festuca gigantea (L.) Villars: Avully, environs de “Chalet du Bac”, 355 m, bois riverain le long du Rhône, 488.75/114.85, 5-8-1994, CAL01161.

Soral, sous “Rougemont”, 430 m, bois riverain le long de la Laire, 491.13/110.79, 29-7-1994, CAL01122.

[Nouveau, sect. 202; signalé “Arve et Rhône” par WEBER (1966)].

Festuca heterophylla Lam.: Bellevue, “Grand Bois”, 424 m, bois, 499.70/124.75, 7-7-1994, CAL00987-2 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 15 et 39].

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Gy, près du nouveau chemin du parcours Vita, 476 m, sous-bois, 510.86/122.42, 9-6-1997, CAL02131.

Jussy, petit parking en lisière de la forêt, 498 m, bouquet d'arbres, 512.50/122.61, 23-9-1997, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Jussy, La Forêt" par WEBER (1966)].

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.: Gy, près des "Prés de Villette", aux environs de la borne-frontière n° 176, 470 m, sentier-clairière frontalier, 510/123, 9-6-1997, CAL02132 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme indiqué par WEBER (1966)].

Milium effusum L.: Gy, Bois de Jussy, 459 m, au bord du Ruisseau du Tuernant, 511.57/124.10, 19-5-1997, CAL02113 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 48].

Rostraria cristata (L.) Tzvelev: Satigny, zone d'habitations au bord de la Route de Peney, 417 m, décombres, 494.32/118.22, 23-6-1997, CAL02154 [nouveau pour le canton, sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); signalé à la gare de Satigny par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 25].

Vulpia ciliata Dumort.: Meyrin, zone industrielle de Zimeysa, au nord de Montfleury, 442 m, bord de voie ferroviaire de garage, 494.35/119.80, 6-6-1995, CAL01393 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Genève, espace semi-naturel au nord de "Moillebeau", 425 m, 498.80/119.55, 20-6-1995, CAL01465.

Satigny, zone industrielle de Zimeysa, 427 m, surface herbeuse entre deux voies ferroviaires de garage, 493.90/119.72, 14-6-1995, CAL01436.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966), qui indique "jadis Genève, Champel; Satigny, Peney"; voir aussi "Notes" 3, 7, 8, 15, 18, 39 et 62].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Bellevue, "Champs du Bois", 425 m, champ moissonné, 499.54/123.88, 15-8-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 7, 8, 15, 18 et 39].

Presinge, près du point 488 m, lisière, 510.19/119.67, 5-8-1997, sine exsicc. [nouveau, sect. 203].

[Indiqué "assez commun" par WEBER (1966)].

Juncaceae

Juncus compressus Jacq.: Vernier, ancien terrain vague, actuellement construction du centre TCS, 420 m, décombres, 496.60/119.70, 22-6-1995, CAL01474 [nouveau, sect. 201; indiqué "jadis assez commun" par WEBER (1966)].

Labiatae

Lamium amplexicaule L.: Avusy, entre route et gravière, 435 m, monticule terreux, 490.10/111.50, 10-6-1994, CAL00868.

Bernex, presqu'île de Loëx, "Les Deux Fonds", 385 m, bord de champ, 495/118, 1-4-1993, CAL00026.

[Fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Note" 75].

Salvia glutinosa L.: Onex, bois riverain de l'Aire, rive gauche, 393 m, sous-bois, 496.92/114.70, 27-8-1997, CAL02206 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Satureja acinos (L.) Scheele: Bardonnex, sentier qui monte de "En Combe" au village de Bardonnex, 470 m, pré, 496.97/111.50, 24-9-1994, CAL01265 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Leguminosae

Astragalus glycyphyllos L.: Le Grand-Saconnex, zone résidentielle, 429 m, au pied d'une haie grillagée, 497.91/120.97, 22-8-1996, sine exsicc.

Satigny, chemin descendant dans les vignes depuis le village de Choully, 500 m, pied de muret, 491.27/119.99, 7-7-1997, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39 et 83].

Lathyrus hirsutus L.: Le Grand-Saconnex, sortie du tunnel du Grand-Saconnex, 413 m, haut de talus, 498.42/122.84, 6-7-1994, CAL00970-2 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 26 et 55].

Lotus glaber Miller: Bardonnex, "En Combe", en-dessous de la tuilerie, dans l'enceinte de la gravière, 468 m, gouille temporaire, 496.35/111.37, 24-9-1994, CAL01260 [rare, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 3].

Medicago polymorpha L.: Genève, Ecole Supérieure de Commerce André Chavanne, 445 m, plate-bande herbeuse, 498.35/119.72, 20-6-1995, CAL01469 [L, sect. 201; signalé au "chemin Colladon" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Trifolium alexandrinum L.: Corsier, jardinerie Roy & Fils, 434 m, friche, 506.42/123.51, 5-9-1996, CAL02103 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Trifolium hybridum L. subsp. *elegans* (Savi) Asch. & Graebner: Meyrin, “La Maille”, 455 m, bord de sentier, en lisière de forêt, 493.62/122.31, 25-7-1994, CAL01082 [L, sect. 201; voir aussi “Note” 8].

Soral, village de Soral, 451 m, pied de mur, 491.97/111.12, 27-7-1994, CAL01105 [rare, sect. 202; voir aussi “Note” 3].

Gy, 474 m, bord du fossé qui longe la lisière de la forêt, 510.66/122.45, 22-9-1997, CAL02219 [nouveau, sect. 203].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Trifolium ochroleucon Hudson: Vernier, au-dessus de la bretelle d'accès à l'autoroute, 410 m, terrain vague, 496.60/119.42, 22-6-1995, CAL01493 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8, 18 et 25].

Trifolium patens Schreber: Genève, Ecole Supérieure de Commerce André Chavanne, 445 m, plate-bande herbeuse, 498.35/119.72, 20-6-1995, CAL01468 [rare, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39, 57, 58, 61 et 62].

Lythraceae

Lythrum hyssopifolia L.: Presinge, 501 m, champ de blé moissonné, 510.85/119.61, 5-8-1997, CAL02182 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “Disparu?”].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Corsier, près du point 426 m, bord de fossé en bord de route, 506.54/124.48, 10-6-1997, CAL02141 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Onagraceae

Epilobium roseum Schreber: Satigny, “Chez Chevassu”, 420 m, bord du ru, 494.09/118.12, 4-8-1994, CAL01147 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 15, 18 et 39].

Bardonnex, à l'ouest de Bardonnex, 460 m, fossé au bord du ru, à l'ombre des arbres, 496.72/111.95, 24-9-1994, CAL01258 [L, sect. 202; voir aussi “Note” 46].

Puplinge, 440 m, décombres, 507/117, 16-8-1994, CAL01188 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Notes” 18 et 39].

[Indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Orchidaceae

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel: Pregny-Chambésy, près du point 379 m, surface plantée d'*Hypericum calycinum*, 500.67/122.02, 18-8-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 85].

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench: Confignon, verger de “Sur le Beau”, bord de sentier, 412 m, tas de déchets végétaux, 496.16/114.82, 27-8-1997, CAL02208 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Fallopia dumetorum (L.) Holub: Vernier, zone résidentielle, 439 m, banquette herbeuse entre route et trottoir, 497.70/120.07, 22-8-1996, CAL02087 [H, sect. 201; voir aussi “Notes” 8 et 39].

Cologny, “Les Petites Tattes”, 439 m, bord de champ, 503.06/118.42, 3-9-1996, sine exsicc. [rare, sect. 203; voir aussi “Note” 18].

[Indiqué “commun” par WEBER (1966)].

Rumex conglomeratus Murray: Jussy, forêt, 490 m, chemin forestier, 512.10/122.22, 23-9-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 47 et 71].

Primulaceae

Cyclamen purpurascens Miller: Jussy, près du point 487 m, sous-bois, 512.63/123.33, 19-8-1997, sine exsicc. [nouveau, sect. 203].

Pyrolaceae

Pyrola rotundifolia L.: Gy, Bois de Jussy, 456 m, sous-bois clair, au pied d’un *Quercus*, 511.87/124.18, 19-5-1997, CAL02111 [L, sect. 203; signalé à “Jussy, Echanex” par WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Clematis recta L.: Genève, Conservatoire et Jardin botaniques, 390 m, talus de la voie CFF, 500.18/120.18, 8-6-1995, CAL01408 [nouveau, sect. 201; signalé au “Jardin des Bastions” par WEBER (1966)].

Isopyrum thalictroides L.: Carouge, sous “Pinchat”, juste en amont de la clôture délimitant la plantation forestière, 385 m, sous-bois, 500.75/115.05, 1-4-1997, CAL02107 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 66 et 68].

Ranunculus tuberosus Lapeyr.: Russin, “Le Châtelet”, 405 m, bord de chemin forestier, bois riverain, 490.58/117.47, 20-6-1994, CAL00915-5 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique “jadis assez commun”].

Rosaceae

Agrimonia procera Wallr.: Bellevue, “Grand Bois”, 424 m, bord du chemin qui longe la lisière, 499.63/124.92, 7-7-1994, CAL00987-3 [rare, sect. 201; signalé à Bellevue par WEBER (1966), qui indique “assez commun dans la partie N-E du canton”; voir aussi “Note” 18].

Alchemilla xanthochlora aggr.: Puplinge, parking de Champ-Dollon, 429 m, pavage herbacé, 506.06/118.75, 10-6-1995, CAL01425 [nouveau pour le canton, sect. 203].

Rubiaceae

Galium spurium L.: Laconnex, 444 m, champ moissonné, 491.50/111.80, 26-8-1994, CAL01223 [nouveau, sect. 202; taxon non retenu par WEBER (1966); voir aussi “Note” 30].

Salicaceae

Salix pentandra L.: Vandœuvres, bord de la Seymaz, en aval du “Pont Bochet”, 427 m, 505.47/118.48, 10-8-1995, CAL01677 [nouveau pour le canton, sect. 203].

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata L.: Choulex, rive gauche de la Seymaz, 428 m, talus, 506.32/119.19, 24-7-1997, CAL02168.

Presinge, route frontalière, 501 m, fossé au bord de la route, 510.90/119.35, 5-8-1997, CAL02183.

[H, sect. 203; stations non signalées par WEBER (1966), qui indique “jadis assez commun”].

Verbascum phlomoides L.: Plan-les-Ouates, “Maison Forte”, 441 m, pré pâturé (moutons), 497.25/112.98, 19-9-1994, CAL01251 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Verbascum thapsus L. subsp. *crassifolium* (DC.) Murb.: Satigny, près de la source du Nant d’Avril, 410 m, talus au bord de la Route du Mandement, 492.88/120.12, 2-8-1994, CAL01140 [nouveau, sect. 201].

Veronica scutellata L.: Gy, 467 m, au bord d’un étang, 510.47/122.84, 9-6-1997, CAL02135 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 12].

Umbelliferae

Sison amomum L.: Satigny, au-dessus du rond-point à l’entrée du village, 434 m, pré en bordure de vigne, 491.67/119.37, 11-8-1995, CAL01682 [L, sect. 201; signalé à la “route de Russin” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 8].

Torilis arvensis (Hudson) Link: Thônex, carrefour au point 424 m, au pied d'une haie de buissons, 505.33/117.10, 4-8-1997, CAL02180 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme indiqué par WEBER (1966)].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Gy, "Les Longerayes", 471 m, bord de champ de tournesols, 510.47/122.51, 13-7-1995, CAL01588 [rare, sect. 203; n'est pas "assez commun" comme indiqué par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 79*

CYRILLE LATOUR, BÉATRICE BRESSOUD, MICHEL CHAPALAY,
PAUL MULLER & ANDRÉ PERONE

Orchidaceae

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel: Corsier, Route de Thonon, 436 m, talus en bord de route, exposition ouest-nord-ouest, 506.99/124.25, 10-6-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 1 et 15].

Note de floristique genevoise 80*

CYRILLE LATOUR & PAUL MULLER

Compositae

Leontodon saxatilis Lam.: Troinex, village de Troinex, 430 m, interstice entre pavés, 500.37/112.92, 27-8-1994, CAL01237 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 81

PAUL MULLER

Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle: Avully, "La Touvière", 350 m, phragmitaie, rive du Rhône, 487.85/114.24, 19-10-1996, PM01144 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

*Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Caryophyllaceae

Spergula arvensis L.: Collonge-Bellerive, 430 m, bord d'un trottoir, 504/121, 8-5-1994, PM00411-2 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 1].

Compositae

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz-Bip.: Bernex, 360 m, gravier au bord du Rhône, 493.96/116.71, 23-6-1996, PM00900-2 [rare, sect. 202; signalé au "nant de l'Agnon" par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 82

ANDRÉ PERONE

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench: Genève, Conservatoire et Jardin botaniques, 390 m, sur le toit de Bot III, 500/120, 25-8-1997, CAL02203 [nouveau, sect. 201].

Note de floristique genevoise 83

CHRISTIAN SCHNEIDER

Alismataceae

Alisma plantago-aquatica L.: Avusy, gravière à l'ouest de "Derrière Forestal", 430 m, étang, 490/112, 14-7-1996, CS00092 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.: Satigny, à l'est de "La Boverie", 410 m, bord de champ, 491/118, 12-7-1996, CS00097 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 39, 47 et 78].

Campanulaceae

Campanula patula L. subsp. *patula*: Laconnex, "Allues", 435 m, lisière de haie, 490/112, 14-7-1996, CS00110 [L, sect. 202; signalé à Laconnex par WEBER (1966), qui indique "assez commun"].

Campanula persicifolia L.: Avully, forêt en pente entre le camp militaire et le Rhône, 350 m, 487/113, 4-6-1996, CS00111 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Chenopodiaceae

Chenopodium ficifolium Smith: Russin, au nord du pont sur le Châtelet près de la route, 415 m, tas de déchets organiques, 490/117, 19-5-1996, CS00116 [nouveau, sect. 201].

Compositae

Anthemis arvensis L.: Soral, village de Soral, 450 m, pelouse, 492/111, 19-7-1996, CS00098 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "commun dans le S-O du canton" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 78].

Aster amellus L.: Russin, "Mauregard", 400 m, prairie sèche, 490/117, 14-8-1996, CS00101 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à l'Allondon par WEBER (1966)].

Aster novae-angliae L.: Avusy, à l'ouest de "La Folie", 430 m, haie de propriété privée, 489/113, 23-6-1996, CS00102 [nouveau, sect. 202].

Carduus tenuiflorus Curtis: Chancy, gravière à l'est de Passeiry, 425 m, monticule de terre, 488/113, 30-5-1996, CS00112 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 75].

Cruciferae

Bunias orientalis L.: Bardonnex, "En Combe", 470 m, bord d'un chemin agricole, 497/111, 5-6-1996, CS00108 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 78].

Cyperaceae

Carex otrubae Podp.: Avully, à l'est de "La Touvière", 350 m, bord du Rhône, 488/114, 3-7-1996, CS00113 [H, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 6 et 39].

Carex paniculata L.: Avully, à l'est de "La Touvière", 350 m, bord du Rhône, 488/114, 3-7-1996, CS00114 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Ericaceae

Calluna vulgaris (L.) Hull: Satigny, bois clair dans l'angle entre le Rhône et l'embouchure du Châtelet, 380 m, 491/117, 16-7-1996, CS00109 [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi "Note" 78].

Gramineae

Alopecurus aequalis Sobol.: Laconnex, “Allues”, 440 m, dépressions humides dans un pré semé, 490/112, 15-5-1996, CS00095 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 6].

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng: Avully, “Le Martinet”, 370 m, petit pré sec au bord de la route, 487/112, 5-8-1996, CS00104.

Avully, grand virage de la route menant de La Plaine à Cartigny, 365 m, pré sec, 488/114, 5-8-1996, CS00105.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966)].

Bromus racemosus L. subsp. *racemosus*: Russin, “Mauregard”, 390 m, bord d’un ruisseau près de sa source, 490/117, 21-5-1996, CS00106 [nouveau, sect. 201; taxon non retenu par WEBER (1966)].

Bromus tectorum L.: Bardonnex, à l’est de la tuilerie, 470 m, bord de champ, 496/111, 6-6-1996, CS00107 [H, sect. 202; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 43].

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Chancy, “Champ du Sac”, 470 m, bord de champ, 487/112, 5-8-1996, CS00090.

Soral, “La Feuillée”, 430 m, bord de champ, 493/112, 12-8-1996, CS00091.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 46, 57, 61, 75 et 76].

Leguminosae

Astragalus glycyphyllos L.: Satigny, au nord des “Fontaines”, 395 m, lisière de bois, 491/117, 16-7-1996, CS00103 [fréquent, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39 et 78].

Liliaceae

Allium scorodoprasum L.: Troinex, à l’est de Monthoux, 440 m, bord de chemin, 499/112, 12-6-1996, CS00093.

Troinex, au sud de Troinex-Ville, 435 m, bord de chemin, 500/112, 2-7-1996, CS00094. [H, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966)].

Asparagus officinalis L.: Chancy, à l’ouest d’Epagny, 390 m, talus, 488/113, 14-7-1996, CS00099 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3 et 46].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Bardonnex, à l’ouest de Charrot, 470 m, culture de fraises, 497/111, 17-7-1996, CS00096 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 57].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Soral, Route de Lully, 460 m, talus, 492/111, 3-6-1996, CS00089 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 84].

Polypodiaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.: Chancy, forêt en pente entre le camp militaire et le Rhône, 360 m, 487/113, 11-6-1966, CS00100 [L, sect. 202; signalé à Chancy par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 84

CHRISTIAN J. A. SIGRIST

Compositae

Cirsium acaule Scop.: Bernex, presque île de Loëx, 390 m, talus sec en lisière de forêt, 495/117, 7-8-1994, sine exsicc. [L, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 18].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Bernex, presque île de Loëx, 390 m, en bordure d'un pré pâturé, 495/117, 1-5-1994, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 83].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Bernex, presque île de Loëx, terrain de la société de tir à l'arc, 390 m, forêt, en bordure d'un ruisseau qui coule au fond d'un ravin, 495/117, 11-4-1996, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 19, 49, 71 et 74].

Polypodiaceae

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Bernex, presque île de Loëx, en face de Givaudan, 380 m, dans un ravin de la forêt riveraine, 495/117, 26-8-1997, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 19, 49 et 59].

Scrophulariaceae

Veronica urticifolia Jacq.: Bernex, presque île de Loëx, en face de Givaudan, 385 m, forêt riveraine, 495/117, 31-5-1992, CHS00001 [L, sect. 202; signalé à Bernex par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 18, 19 et 57].

Note de floristique genevoise 85

RODOLPHE SPICHIGER

Orchidaceae

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel: Genthod, entre Malagny et Versoix-le-Bourg, 390 m, bord de voie CFF, 501/125, 1994, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “jadis” à Genthod; voir aussi “Note” 78].

REMERCIEMENTS

Nous remercions le secteur informatique des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève pour l'aide apportée dans l'organisation et la gestion des données.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- LANDOLT, E. (1991). *Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes rouges nationales et régionales*, 183 pp., Office fédéral environnement, forêts, paysage, Bern.
- THEURILLAT, J.-P., B. VON ARX & E. CORBETTA (1990). Liste des plantes vasculaires du canton de Genève. *Saussurea* 21: 21-36.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1993). Notes de floristique genevoise, 1-10. *Saussurea* 24: 55-90.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1994). Notes de floristique genevoise, 11-30. *Saussurea* 25: 181-226.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1995). Notes de floristique genevoise, 31-51. *Saussurea* 26: 117-159.
- THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1996). Notes de floristique genevoise, 52-65. *Saussurea* 27: 93-120.
- WEBER, C. (1966). Catalogue dynamique de la flore de Genève. *Boissiera* 12, 259 pp.
- WELTEN, M. & R. SUTTER (1982). *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz*, 1 et 2, Birkhäuser, Basel.

Adresse des éditeurs: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.

Adresse des auteurs:

- D. Aeschimann, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- B. Bressoud, 36 r. du Fossard, F-74100 Annemasse.
- M. Chapalay, 54 av. des Communes-Réunies, CH-1212 Grand-Lancy.
- P. Charlier, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- Ph. Cuénoud, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- M. Gremaud, 14 ch. de Paris, CH-1233 Bernex.
- M. Grenon, 3 ch. Ami-Argand, CH-1290 Versoix.
- E. Hartmann, 11 ch. Nicolas Bogueret, CH-1219 Aïre.
- A. Henriquès, 30 av. Jacques-Martin, CH-1224 Chêne-Bougeries.
- F. Jacquemoud, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- C. Lambelet, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- C. Latour, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- P. Muller, 148 rue de Genève, CH-1226 Thônex.
- A. Perone, 3 ch. Aulne, CH-1212 Grand-Lancy.
- Ch. Schneider, Rue de l'Eglise, F-01630 St.-Jean de Gonville.
- Ch. J. A. Sigrist, 96 av. du Bois-de-la-Chapelle, CH-1213 Onex.
- R. Spichiger, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- Ch. Vaz, 13 ch. du Barbolet, CH-1213 Onex.