

**Zeitschrift:** Schweizer Schule  
**Herausgeber:** Christlicher Lehrer- und Erzieherverein der Schweiz  
**Band:** 33 (1946)  
**Heft:** 24

**Artikel:** Volumen des schief abgeschnittenen Kreiskegels und der entsprechenden Kegel-Hufe  
**Autor:** Schwegler, Theodor  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-538764>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 18.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

bis anhin keine wesentlichen Erfolge gezeitigt. Mit der Anwendung von Arzneien ist Vorsicht geboten, soweit es sich nicht um unschuldige Volksheilmittel handelt. Auswahl, Bestimmung und Abgabe des zutreffenden Arzneimittels ist ausschliesslich dem Arzt vorbehalten, der allein beurteilen kann, was in jedem einzelnen Fall das Richtige ist. Von der Aufzählung der zahlreichen blutdruckmindernden Heilkräutertees (wie sie auch von medizinischen Autoritäten anerkannt werden), kann hier Umgang genommen werden, da die Literatur darüber überreich ist.

All die vorstehenden Hinweise und Ausführungen bezwecken einzig das Ziel, darauf aufmerksam zu machen, dass die Blutdruckerkrankung

nicht zu gefährlich gewertet werden darf, dass sie heilbar und eine moderne Krankheit ist, dass ihr Erkennen und ihre Wertung reifes Studium voraussetzt und nur vom erfahrenen Arzt behandelt werden soll. Die Andeutungen mögen genügend dar tun, dass Belehrungen über die Blutdruckkrankheit nicht ins Pensum des Schulunterrichtsstoffes gehören, weil damit mehr unnötige Aufregung als Nutzen geschaffen würde. Hingegen wird der gewissenhafte Lehrer Anregung zum Nutzen seiner Schüler und für sich selbst aus dem Studium der Blutdruckkrankheit gewinnen. Wenn die vorstehenden Zeilen ihn zum Studium der volkstümlichen, fachärztlichen Literatur ermuntern, ist der Zweck erfüllt.

A. G., M.

## Mittelschule

### Volumen des schief abgeschnittenen Kreiskegels und der entsprechenden Kegel-Hufe

**Vorbermerkung.** Der bessern Uebersicht wegen sind in der Zeichnung die Schnittkreise nicht in den richtigen Verhältnissen gehalten und  $b$  nicht genau  $\parallel h$ .

Der Kegel sei gegeben durch den Oeffnungswinkel  $\varphi$  und die längste und kürzeste Mantellinie,  $m$  und  $n$ .

Bezeichnen  $a$  und  $b$  die Halbachsen der Basis-Ellipse und  $h$  die Höhe des symmetrischen Achsenschnittes, so gilt offenbar:


$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot h \cdot a \cdot b \cdot \pi$$

Wir ersetzen  $h$ ,  $a$  und  $b$  durch ihre Werte und berücksichtigen, dass

$$b^2 = R \cdot r = m \cdot n \cdot \sin^2 \varphi; \text{ und}$$

$$m : n = \cos(\varphi - \psi) : \cos(\varphi + \psi)$$

$$\begin{aligned} \text{Also } V_1 &= \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot m \cdot \cos(\varphi + \psi) \cdot \frac{m \cdot \sin 2\varphi}{\cos(\varphi - \psi)} \cdot \sqrt{m \cdot n \cdot \sin \varphi} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (m \cdot n)^{3/2} \cdot \sin^2 \varphi \cdot \cos \varphi \\ &= \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot b^3 \cdot \operatorname{ctg} \varphi. \end{aligned}$$



Bezeichnen nun  $V_2$  und  $V_3$  die Volumina der Kegel der längsten Mantellinie  $m$  bzw. der kürzesten Mantellinie  $n$ , so ist zunächst

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot R^3 \cdot \operatorname{ctg} \varphi \text{ und } V_3 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot \operatorname{ctg} \varphi;$$

also  $V_1 = \sqrt{V_2 \cdot V_3}$ :

Der schiefe Kreiskegel ist somit das geometrische Mittel der Kegel der längsten und der kürzesten Mantellinie.

Wir betrachten nun die beiden Hufe  $V_4 = V_2 - V_1$  und  $V_5 = V_1 - V_3$ , die gegeben seien durch  $s$ ,  $2a$  und  $2R$  bzw.  $2r$ .

Aus den Dreiecksflächen der Achsenschnitte

$$F_1 = Rs \cdot \cos \varphi \text{ und } F_2 = rs \cdot \cos \varphi \text{ folgt}$$

$$\cos \varphi = \frac{F_1}{Rs} = \frac{F_2}{rs}; \quad \text{weiter ist}$$

$$\sin \varphi = \frac{(2R)^2 + s^2 - (2a)^2}{4Rs} = \frac{(2a)^2 - (2r)^2 - s^2}{4rs}$$

ferner  $s^2 - (R - r)^2 = (2a)^2 - (R + r)^2$ ;  $s^2 = 4a^2 - 4Rr = 4(a^2 - b^2)$

also  $\sin \varphi = \frac{R^2 - b^2}{Rs} = \frac{b^2 - r^2}{rs}$ ;  $\operatorname{ctg} \varphi = \frac{F_1}{R^2 - b^2} = \frac{F_2}{b^2 - r^2}$

also  $V_4 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \operatorname{ctg} \varphi \cdot (R^3 - b^3) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \frac{F_1}{R+b} \cdot (R^2 + Rb + b^2)$

und  $V_5 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \operatorname{ctg} \varphi \cdot (b^3 - r^3) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot \frac{F_2}{r+b} \cdot (b^2 + rb + r^2)$

Ein solches Huf-Volumen ist somit gleich dem geraden Kreiskegelstumpf, dessen Halbmesser  $R$  bzw.  $r$  und  $b$  sind und dessen Höhe gleich ist derjenigen des Trapezes, das dem betreffenden Achsenschnitt flächengleich ist und dessen Basen  $2R$  bzw.  $2r$  und  $2b$  sind. Zu bemerken ist noch, dass sich die Höhen dieser Trapeze bzw. der Achsenschnitte dieser Kegelsstumpfe verhalten wie  $\sqrt{R} : \sqrt{r}$ .

Einsiedeln.

Dr. P. Theodor Schwegler O.S.B.

## Umschau

### Unser Unterrichtsheft \*

Drei Praktiker aus verschiedenen Kantonen berichten:

#### 1. Lehrer A. Krieg, Näfels:

Zu meiner Beschämung muss ich sagen, dass ich das Unterrichtsheft erst seit Jahresfrist regelmässig führe.

Und der Unterricht ist in diesem Jahre erfreulicher und vielgestaltiger geworden.

\* Unterrichtsheft, herausgegeben von der Hilfskasse des SKLV., 122 Seiten stark (Stundenpläne, Tagebuchblätter, Stoffverteilungsplan, Schülerverzeichnis, Notenverzeichnis, Schulbesuche etc.), 22/29 cm,

Fr. 2.40. Hauptvertriebsstelle: Lehrer Alb. Elmiger, jun., Littau (Luz.). Weitere Bezugsorte: Lehrmittelverlag Luzern, Lehrmittelverlag Uri, Altdorf, Lehrmittelverlag Appenzell I.-Rh., Appenzell.