Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 2 (1866-1868)

Heft: 5

Artikel: Description d'un Apion nouveau, suivie de la diagnose de plusieurs autres espèces du même genre

Autor: Desbrochers des Loges

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-400228

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Description d'un Apion nouveau, suivie de la diagnose de plusieurs autres espèces du même genre.

Von Mr. **Desbrochers des Loges.**

Apion sareptanum. Ovatus, curtior, niger, parum pubescens, vix nitidus; capite tenuiter striato, impunctato; rostro parum elongato valde arcuato, lævi, apice paululum nitido, obtuse utrinque post basim dilatato; antennis crassis villosulis, prope basim insertis; thorace quadrato, minus dense nec tenue punctato, obsolete ante scutellum substriato; Elytris convexis retrorsum ampliatis, apice obtuse rotundatis, sat profunde sulcato-punctatis, interstitiis angustis planis sublævibus; Pedibus haud tenuibus sat elongatis, nigro-piceis.

En ovale court, d'un noir terne, obsolètement pubescent. Tête moins large que le bord antérieur du prothorax fortément rétrécie en arrière, yeux grands, médiocrement saillants (un peu plus chez le ♂), occiput très lisse, brillant, front et rostre sans ponctuation visible, quelques rides très fines longitudinales entre les yeux.

Rostre très courbé, mince et cylindrique ♀; assez épais ♂; dilaté médiocrement mais d'une manière sensible à la hauteur des antennes, terne. Antennes presque basilaires, épaisses, peu allongées, finement pubescentes concolores, scape subconique à peine plus long que le premier article du funicule qui est en carré irrégulier.

Prothorax quadrangulaire, aussi long que large ♂, un peu plus large que long ♀, droit ou à peu près sur les côtés, subtronqué à la base et au sommet, très peu convexe, à ponctuation assez forte, assez profonde, peu serrée, surtout sur la ligne médiane; un petit trait obsolète antiscutellaire.

Elytres égalant trois fois, à peine, la longueur du prothorax, une fois et $^2/_3$ environ plus longues que larges dans leur plus grande largeur, très convexes, assez brusquement declives en arrière, élargies latéralement vers le milieu, puis, curvilinéairement rétrécies en arc raccourci, de ce point à l'extrémité qui est obtusément arrondie, sans avancement sensible, ponctuées striées assez profondément, stries moins larges que les intervalles qui sont très plans et à peu près lisses, à peine pubescents.

Pattes fortes, assez allongées, d'un noir de poire. Dessous, peu pubescent, à ponctuation peu serrée.

Long. $1^2/_3$ mill. Larg. $^2/_3$ mill.

Cette espèce doit prendre place entre l'*A. Caullei* Wencker et l'*A. obtusum* mihi. La forme générale la rapproche d'avantage de ce dernier. La petite taille, sa forme courte élargie en arrière, jointes à sa ponctuation particulière ne permettent de la confondre avec aucune autre espèce du même groupe.

Sarepta. Deux exemplaires, l'un ♂ l'autre ♀ obligeamment communiqués par Mr. le Docteur Stierlin.

Mr. Haag de Butenberg a bien voulu m'envoyer également, en communication, un autre Apion de Sarepta que j'avais cru un instant nouveau, ne le trouvant pas d'ailleurs, dans la recente monographie de Mr. Wencker, mais j'ai reconnu depuis, que cette espèce n'est autre que l'Apion *Steveni* dont Schönherr a donné une excellente description. C'est à grand tort que cette insecte a été réuni comme variété au *flavofemoratum* avec lequel il n'a de ressemblance que par la couleur des pattes. Le corps est entièrement glabre, le prothorax très inégalement et grossièrement ponctuée, les élytres très larges à la base à intervalles larges et très finement striées etc. etc.

Il doit être réintégré à la suite de l'Apion flavofemoratum dont il se rapproche un peu, par l'insertion des antennes et la couleur générale.

Depuis la publication du beau travail de Mr. Wencker, j'ai décrit quelques autres espèces de ce genre. (Voir Bulletin de l'academie d'Hippône 1866 et Rendu-compte des Assises scientifiques du Bourbonnais, même année.) Ce dernier recueil en particulier, étant assez difficile à consulter, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile de reproduire ici une courte diagnose de ces espèces.

1. A. robusticorne Desb. des L. Bull. Acad. Hipp. 1866. p. 44. — Niger, nitidus, elytris cœruleis, rostro cylindrico, c asso, basi haud excavato, antennis validissimis, basi rostri insertis; Prothorace nitido, fere cylindrico, sparsim punctulato pro scutello profunde foveolato; Elytris brevioribus, convexis, cum humeris prominentibus, striis laxe punctatis, intervallis latioribus. — Long. $2^1/_2$ mill. (rostro excluso), Lat. fere 1 mill. — Algérie.

2. A. obtusum. Desb. des L. Bull. Acad. Hipp. 1866, p. 47.

— Ovalis, parum pubescens, niger, elytris cœruleis; Capite haud impresso, dense punctato, rostro crasso ex utra parte obtuse dentato. Prothorace subtransversali, sat dense fortiter punctato; Elytris ovatis, parum elongatis, striato-punctatis, intervallis planis, postice obtuse rotundatis; pedibus nigris. Long. $1^2/_3$ mill. Lat. $^3/_4$ mill. — Mont Cenis.

3. A. tibiale Desb. des L. Assises scient. du Bourb. 1867. Ovalis, parum elongatus, sat convexus, ater, fere glaber. Capite antice depresso punctulato striatoque; oculis parum prominulis, rostro forma inæquali, valde curvato, antennis atris, pubescentibus, articulo 1° elongato, apice crassiore. Prothorace fere cylindrico, sat dense punctato, in medio sulcato. Elytris ovalibus subelongatis, interstitiis plerumque sat convexis. Pedibus coxisque atris, femoribus testaceis basi apiceque infuscatis. Long. $2^1/_2$—3 m. — Allier.

4. A. conspicuum Desb. des L. Breviter ovalis, obscure coerulescens, parum nitidus, parum pubescens, capite rostroque punctatis, hoc apice attenuato, nitido, oculis minus prominentibus; Prothorace subconico, lateribus evidenter nec rotundato, nec angulato, disco minus confertim punctato, in medio sulcato; Elytris brevioribus, convexis, punctato-sulcatis; pedibus nigris, sat elongatis. (♂)

Long. $2^1/_2$ mill. (rostro excluso).

A. Pomonæ proximus, minor, rostro curtiore, minus attenuato, elytris brevioribus etc. etc. Allier.

Beschreibung einiger neuen Käfer-Arten.

Von

Dr. **Stierlin.**

1. Platyprosopus bagdadensis.

Niger, opacus, subtilissime griseo-pubescens, antennis, palpis, ore, elytris, pedibus anoque rufis, capite magno, oblongo, subtilissime confertim undique punctato, antennis capite cum thorace brevioribus, thorace latitudine paulo longiore, obsolete carinato, subtiliter, punc-