

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 3 (1869-1872)

Heft: 10

Artikel: Matériaux complémentaires pour la Faune des Lépidoptères de la Suisse

Autor: Peierimhoff, H. de

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-400297>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

kann. Der Schmetterling steht jedem entomologischen Kollegen **zur** Besichtigung bei mir zur Verfügung.

Der Entdecker, Herr Gruet in Renan, schrieb mir über seinen interessanten Fund :

« Au mois de Juillet 1870 j'ai trouvé quelques chenilles sur la grande Epilobe des fossées au bord de la Suze; elles étaient de grandeur différente, avec des teintes plus ou moins foncées; alors je supposais, qu'elles étaient de la même espèce; mais en printemps de 1871 à l'éclotin du sujet en question, mon père était d'accord avec vous; il m'avait fait observer les mêmes renseignements. Le Porcellus se trouve aussi ici, cependant je n'ai pas encore pu découvrir la chenille. » —

Dem Schmetterlinge einen neuen Namen zu geben, bin ich nicht berechtigt. Ich würde diess erst dann thun, wenn nachgewiesen wäre, dass die Zwischenform sich fortpflanzt und einen eigenen neuen Typus darstellt. Wenn der Entdecker, Herr Gruet, die nöthige Sorgfalt darauf verwendet, so könnte diess vielleicht gelingen.

Die Diagnose der neuen Form müsste schliesslich etwa folgendermassen lauten :

Deilephila Porcellus † Elpenor. Deilephila corpore viridi, lateribus roseis, fascia media longitudinali nulla, thorace viridi, fasciis longitudinalibus roseis quatuor, antennis albis. Alis anterioribus olivaceis, margine exteriore fascia rubra, intus denticulata, in medio duabus fasciis obscurioribus et puncto albo instructis, ciliis rubris uni coloribus. Alis posticis in margine ad angulum interiorem incisura magna instructis, denticulatis, ciliis maculatis, in costis roseis, radice usque ad medium fere nigris, dein olivaceis, fascia terminali obscuriore.

Matériaux complémentaires pour la Faune des Lépidoptères de la Suisse.

Ayant dû faire deux séjours aux établissements de Gais et de Weissbad, j'en ai profité pour étudier, autant que je le pouvais, les

productions lépidoptériques de l'Appenzell. J'étais malheureusement, dans ces circonstances, hors d'état de me livrer aux courses fatigantes, et c'est à peine si j'ai pu, de temps en temps, franchir le seuil des régions alpestres. J'ai pensé toutefois que la liste des espèces que j'ai rencontrées pourrait ne pas manquer d'intérêt, précisément à raison du nombre considérable de personnes que leur santé amène dans le pays. Au point de vue scientifique, cette liste renferme trois espèces de *Tineina*, non signalées dans l'excellent catalogue des Microlépidoptères suisses, publiées dans les « *Mittheilungen* » par M. le professeur Frey, et découvertes depuis son impression.

J'ai séjourné à Weissbad du 15 Juin au 15 Juillet, et à Gais du 15 Juillet au 15 Août.

| | | |
|---|-----------|--|
| Parn. Apollo L. | très com. | Seealpthal et disséminé jusqu'à Gais. |
| Ap. Crataegi L. | id. | partout. |
| Pier. Napi L. ab. Bryoniae O. | ass. com. | Seealpthal. |
| Col. Phicomone Esp. | ass. rare | Ebenalp et pentes élevées du Seealpthal. |
| Polyom. Hippothœ L. (=Eurydice=Chryseis) | com. | Weissbad et Gais. |
| Lyc. Orbitulus Esp. | très com. | Ebenalp. |
| — Icarus Rott. | rare | Weissbad et Gais. |
| — Corydon Sc. | très com. | Seealpthal. |
| — Hylas Esp. (Dorylas) | rare | Gais. |
| — Minima Fuesl. (Alsus) | très com. | Seealpthal. |
| — Semiargus Rott. | com. | Weissbad et Gais. |
| — Alcon S-V. | ass. com. | Weissbad. |
| — Arion L. | ass. rare | Weissbad et Gais. |
| Van. Polychloros L. | rare | Gais. |
| Arg. Pales S-V. | très com. | Ebenalp. |
| — Amathusia Esp. | ass. com. | Gais et Seealpthal. |
| — Thore Hb. | rare | Seealpthal. |
| — Ino Esp. | id. | Gais. |
| — Niobe L. | id. | id. et Weissbad. |
| — ab. Eris Meig. | com. | id. id. |
| Ereb. Epiphron, ab. Nelamus B. | très com. | Ebenalp. |
| — Oeme Esp. | ass. rare | Seealpthal. |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Ereb. Stygne O. | très com. | Seealpthal. (type petit et presque tout noir). |
| — Gorge Esp. | ass. com. | Ebenalp. |
| — Manto S-V. | 1 exempl. passé | Ebenalp. |
| — Aethiops Esp. (Medea) | com. | Weissbad et Gais. |
| — Ligea L. | id. | id. id. |
| Pararg. Maera L. | id. | id. id. |
| — Hiera Hb. | rare | Seealpthal. |
| Epin. Hyperanthus L. | très com. | partout. |
| Coen. Pamphilus L. | id. | id. |
| — Tiphon Rott. (Davus) | id. | id. (prairies tourbeuses). |
| Syr. Serratulae Rbr. | ass. rare | Seealpthal. |
| Deil. Galii S-V. | ass. com. | Gais. Chen. sur Epilobium. |
| Pterog. Oenotheræ S-V. | ass. rare | id., avec le précédent. |
| Ses. Ichneumoniformis F. | ass. rare | bords rocaillieux du torrent, à Schwendi. |
| Var. Megilliformis Hb. | | Weissbad. |
| Thyr. Fenestrella Sc. | rare | prairies. |
| Ino Statices L. | très com. | Weissbad et Gais. |
| Zyg. Filipendulæ L. — Hippocrepidis Hb. | ass. com. | id. |
| Nud. Mundana L. | id. | Seealpthal. |
| Set. Irrorella L. | id. | id. |
| — Aurita, var. Ramosa F. | id. | id. |
| Lith. Lurideola Zk. | com. | id. |
| Gnophr. Rubricollis L. | ass. rare | Weissbad. |
| Nem. Plantaginis L. | id. | Seealpthal. |
| Epial. Humuli L. — Ganna Hb. | ass. com. | Gais, prairies. |
| — Hectus L. | 1 exempl. | Ebenalp. |
| Dasych. Fascelina L. | ass. com. | Seealpthal. |
| Harp. Vinula L. | id. | id. |
| Acron. Leporina L. — Euphorbiæ S-V. | 1 exempl. | Weissbad. |
| Agr. Cuprea S-V. | ass. com. | id., à Gais, comme chenille. |
| Mam. Pisi L. — Dentina S-V. | 1 exempl. | Gais. |
| Dianth. Proxima Hb. | com. | id., comme chenille. |
| Had. Strigilis L. | id. | Seealpthal, Weissbad. |
| Plus. Bractea S-V. — Jota L. | id. | id. |
| — Pulchrina Hw. (V. aureum) | ass. com. | (Var. rougeâtre). |
| | 1 exempl. | Gais. |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Phot. Captiuncula Tr. | ass. com. | Seetalpthal. |
| Cat. Nupta L. | 1 exempl. | Gais. |
| Acid. aversata L. (Lividata) | rare | id. |
| — Mutata Tr. | très com. | Seetalpthal, Gais. |
| — Punctata Tr. | ass. com. | Weissbad. |
| Cab. Pusaria L. | id. | id. |
| Ell. var. Prasinaria Hb. | com. | id. et Gais. |
| Mac. Signaria Hb. | ass. com. | Weissbad. |
| Boarm. Abietaria S-V. | rare | Gais. |
| — Secundaria S-V. | ass. rare | id. |
| Gnoph. Glaucinaria Hb. | ass. com. | id. et Weissbad. |
| — Dilucidaria S-V. | com. | id. id. |
| Psod. Trepidaria Hb. | ass. com. | Ebenalp. |
| — var. Chaonaria Fr. | id. | id. |
| — Quadrifaria Sulz. (Alpinata) | id. | id. |
| Orthol. Limitata Sc. | com. | Gais et Weissbad. |
| Min. Murinata Sc. | très com. | Seetalpthal. |
| Od. Atrata L. (Chærophyl.) | id. | Gais et Weissbad. |
| An. Præformata Hb. | rare | Weissbad. |
| Lig. Populata S-V. | ass. com. | Gais. |
| — Prunata L. | id. | id. |
| Cid. Variata S-V. | com. | id. et Weissbad. |
| — Bicolorata Hfn. | ass. com. | Weissbad. |
| — Truncata Hfn. | rare | Gais. |
| — Aptata Hb. | très com. | Weissbad. |
| — Turbata Hb. | 1 exempl. | Ebenalp. |
| — Salicaria Hb. | rare | Weissalp (passé). |
| — Didymata L. | très com. | Gais. |
| — Cæsiata S-V. | com. | Weissbad. |
| — Infidaria Lah. | ass. com. | id. (et ab. minor, sine luteo). |
| — Tophaceaata S-V. | ass. rare | id. |
| — Scripturaria S-V. | ass. com. | Seetalpthal. |
| — Verberata Sc. (Rupestrata) | très com. | Gais et Weissbad. |
| — Cambrica Curt. | 1 exempl. | id. |
| — Testaceaata Don. (Sylvata) | id. | Weissbad. |
| — Galiata S-V. | rare | Seetalpthal (type grand et dé- pourvu de rongeâtre). |
| — Minorata Tr. | ass. com. | Wildkirchli. |
| — Adæquaata Bkh. (Blandiata) | ass. rare | Gais. |

| | | |
|--|-----------|---------------------------------|
| Cid. Tersata S-V. | 1 exempl. | Weissbad. |
| Eup. Scriptaria H.-S. | ass. rare | Seealpthal. |
| — ? Expallidata Gn. | 1 exempl. | Gais. |
| — Strobilata Hb. | com. | Weissbad. |
| — Subfulvata Hw. | 1 exempl. | id. |
| — Veratraria H.-S. | ass. rare | Gais. |
| Scop. Pallida Stph. | rare | id. (tourbières). |
| — ? Ancipitella Lah. | ass. com. | id. (lisière des bois, troncs). |
| — Zelleri Wk. | rare | id. et Weissbad. |
| — Sudetica Z. | très com. | Seealpthal. |
| Herc. Schrankiana Hch. | ass. com. | Ebenalp et Seealpthal. |
| Bot. Nigralis F. | com. | Seealpthal. |
| — Cingulata L. | ass. rare | id. (type très grand). |
| — Punicealis S-V. | id. | id. |
| — Purpuralis L. | id. | id. |
| — Atralis Hb. | ass. rare | id. |
| — Uliginosalis Stph. (Montanalis H.-S.) | très com. | Ebenalp et Seealpthal. |
| — Lutealis Hb. | ass. rare | Seealpthal. |
| — Nebulalis Hb. | com. | id. |
| — Hyalinalis Hb. | ass. com. | Gais et Weissbad. |
| — Crocealis Hb. | ass. rare | Weissbad. |
| — Olivalis S-V. | 1 exempl. | id. |
| Orob. Sophialis F. | très com. | Seealpthal. |
| Cramb. Dumetellus Hb. | com. | Gais et Weissbad. |
| — Uliginosellus Z. | très com. | id. id. |
| — Pascuellus L. | com. | id. id. |
| — Sylvellus Hb. | ass. rare | Gais. |
| — Falsellus S-V. | id. | id. |
| — Conchellus S-V. | très com. | Seealpthal, près de Schwendi. |
| — Pyramidellus Tr. | ass. rare | id. |
| — Margaritellus F. | très com. | Gais et Weissbad. |
| — Combinellus S-V. | id. | Seealpthal. |
| Dioryc. Abietella S-V. | 1 exempl. | Weissbad. |
| Pemp. Adornatella Tr. | ass. rare | Seealpthal. |
| — Ornatella S-V. | com. | id. |
| Homæo. Binævella Hb. | 1 exempl. | Weissbad. |
| Ephest. Elutella Hb. | très com. | Gais et Weissbad. |
| Tort. Semialbana Gn. | ass. rare | Weissbad. |
| — Cinnamomeana Tr. | id. | Gais et Weissbad. |
| — Histrionana Fr. | rare | Gais. |
| — Forstersana F. | rare | Ebenalp. |
| — Viburnana F. | très com. | Seealpthal. |
| — Palleana, Var. | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Tort. Icterana Frøel. | très com. | Seealpthal. |
| — Steineriana Hbn. | ass. rare | id. |
| Sciaph. Osseana Sc. | com. | tourbières. |
| — Argentana Cl. (Gouana) | com. | Seealpthal et Ebenalp. |
| — Penziana Hb. | ass. rare | id. |
| — Wahlbomiana L. | ass. com. | Weissbad. |
| — Var. Virgaureana Tr. | com. | id. |
| — Var. Minorana Hb. | id. | id. |
| Conch. Decimana S-V. | rare | id. |
| — Badiana Hb. | ass. com. | Gais et Weissbad. |
| — Ciliella Hb. | ass. rare | id. |
| — Phaleratana H.-S. | rare | Weissbad. |
| — Rupicola Curt. | id. | id. |
| — Notulana Z. | id. | id. |
| Penth. Sauciana Hb. | id. | Gais. |
| — Oblongana Hw. | id. | Weissbad. |
| — Rufana Sc. | très com. | bords du torrent, près de Schwendi |
| — Metalliferana H.-S. | ass. com. | id. id. et Seealpthal. |
| — Siderana Tr. | rare | Seealpthal. |
| — Striana S-V. | com. | Gais et Weissbad. |
| — Palustrana Z. | ass. rare | id. id. (myrtilles, dans les bois). |
| — Rivulana Sc. | ass. com. | id. id. |
| — Cespitana Hb. | com. | Seealpthal (très beau type) |
| Aph. Lanceolana Hb. | com. | Tourbières. |
| Asp. Udmanniana L. | ass. rare | Weissbad. |
| Graph. Grandævana Z. | ass. com. | id. au Lœwenfall, tussilago. |
| — Hochenwarthiana Tr. | com. | id. et Gais. |
| — Tedella Cl. (Comitana) | com. | Gais. |
| — Penckleriana S-V. | ass. com. | id. et Weissbad. |
| — Cirsiana Z. | ass. rare | tussilago. |
| — Brunnichiana S-V. | très com. | id. Gais et Weissbad. |
| Stegan. Ratzeburgiana Rtz. | ass. com. | Gais. |
| Dichr. Subsequana Hw. | ass. rare | Weissbad, au Lœwenfall. |
| — Plumbana Sc. | rare | id. |
| — Cacaleana H.-S. | 1 exempl. | au Lœwenfall. |
| Tinea Arcella F. | rare | Weissbad. |
| Lamp. Prælatella S-V. | ass. rare | id. |
| Nem. Pilulella Hb. | id. | Gais. |
| Adel. Associatella Z. | id. | id. |
| — Cuprella S-V. | 1 exempl. | Seealpthal. (Nouvelle pour la faune suisse.) |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Nem. Metallicus Sc. | | | |
| (Scabiosellus). | ass. com. | Gais et Weissbad. | |
| — <i>Violellus S.-V.</i> | com. | id. id. | |
| <i>Prays Curtisellus Don.</i> | rare | id. frênes des ravins. | |
| <i>Cerost. Alpella Schiff.</i> | ass. rare | id. ravins. | |
| <i>Depress. Petasitis Std.</i> | ass. com. | Lœwenfall, près Weissbad. | |
| <i>Brachyc. Tripunctella S-V.</i> | com. | Gais et Weissbad. | |
| <i>Bryot. ? Alpicolella Hn.</i> | 1 exempl. | Weissbad (al. ant. pallidiss. cinereæ, immaculatæ, post. subdilucidæ). | |
| <i>Lita Artemisiella Tr.</i> | très com. | bords du torrent à Schwendi. | |
| — <i>Tussilaginis Frey</i> | 1 exempl. | au Lœwenfall. | |
| <i>Teleia Sequax ? Hw.</i> | rare | Seealpthal. (Exemplaires deux fois plus grands que ceux de plaine. M. Reutti, qui j'ai eu le plaisir de rencontrer à Weissbad, la croit distincte.) | |
| Anac. Anthyllidella ? Hb. | rare | Seealpthal. (Même observations que pour la précédente.) | |
| <i>Yps. Juniperellus L.</i> | ass. com. | Gais. | |
| <i>Soph. Humerella S-V.</i> | très com. | id. Seealpthal. | |
| <i>Hyperc. Citrinalis Sc.</i> | id. | Weissbad, derrière l'établissement. | |
| <i>But. Productella Z.</i> | rare | Seealpthal. | |
| — <i>Acanthella God.</i> | 1 exempl. | sur un monticule aride et rocheux, près Schwendi. (Nouvelle pour la faune suisse.) | |
| <i>Aechm. Thrasonella Sc.</i> | com. | Gais et Weissbad. | |
| <i>Chor. Bjerkandrella Thn.</i> | id. | Seealpthal. | |
| <i>Tin. Perdicellum Z.</i> | rare | Gais. | |
| <i>Ary. Conjugella Z.</i> | ass. com. | sorbiers. | |
| — <i>Mendica Hw.</i> | com. | Weissbad, prunelliers. | |
| — <i>Abdominalis Z.</i> | rare | Gais, genevriers. | |
| — <i>Sorbiella Tr.</i> | ass. rare | id. et Weissbad. | |
| — <i>Pygmæella Hb.</i> | id. | id. id. | |
| — <i>Aurulentella Stt.</i> | ass. com. | id. | |
| <i>Orn. Pfaffenzelleri Frey</i> | rare | Ebenalp. | |
| <i>Chaul. Pontificellus Hb.</i> | id. | Seealpthal. | |
| <i>Chrys. Linneella Cl.</i> | 1 exempl. | id. (Nouvelle pour la faune suisse.) | |
| <i>Laver. Schranckella Hb.</i> | rare | Weissbad. | |
| <i>Micr. Auratella Sc.</i> | ass. rare | Ebenalp. | |
| <i>Platypt. Gonodactylus S-V.</i> | com. | tussilago. | |
| <i>Pter. Serotinus Z.</i> | com. | Gais et Weissbad. | |
| — <i>Coprodactylus Stt.</i> | ass. com. | id. | |

Pter. Scarodactylus Hb. 1 exempl. Weissbad.
 — Osteodactylus Z. id. id.

A cette liste, peut être trop longue, bien que j'aie sans doute omis de noter bien des espèces communes partout, je devrais pouvoir ajouter une très belle Conchylis Tr., qui s'est échappée de mon filet, une Butalis Z., et quelque Elachista Z.; mais la crainte des erreurs m'oblige à les passer sous silence.

H. DE PEIERIMHOFF.

XII^e RECUEIL.

Descriptions d'un genre nouveau et de plusieurs espèces de coléoptères propres à la Russie méridionale et remarques synonymiques.

Schismatocera. (Nov. gen.)

♂ *Chaperon* large, rebordé, arrondi légèrement; échancré à l'avant; fortement échancré sur les côtés pour recevoir les yeux; ceux-ci gros, comme dans le genre *adoretus*.

Tête large, munie de trois carènes transversales; celles du vertex et du front tranchantes, celle du milieu formant quatre lobes granuleux.

Labre profondément échancré, bilobé, cilié.

Lobe externe des machoires divisé en deux dents au moins.

Sommet des mandibules visible pendant le repos.

Dernier article des palpes labiaux en cône allongé, aigu à l'extrémité; celui des *maxillaires* ovalaire.

Antennes de neuf articles. 1^{er}, en cône renversé, renflé à son sommet; 2^e, arrondi, globuleux; 3^e, plus allongé que les suivants; les trois derniers formant une massue allongée, plus longue que tous les autres articles réunis; les feuillets acuminés à l'extrémité.

Prothorax transversal arrondi sur les côtés.