Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 6 (1880-1883)

Heft: 3

Artikel: Syrische Hemiptern

Autor: Frey-Gessner, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-400405

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Cixius desertorum Fieb. - Beyrouth.

Hysteropterum grylloïdes Fieb. — Tibériade.

Tettigometra impressifrons M. R. (brach.) — Jaffa.

hispidula Fieb. — Tibériade.

costulata Fieb. — Caïffa.

Triecphora fasciata Kb. — Beyrouth. Bloudan.

sanguinolenta var. intermedia Kb. — Bloudan.

., ., obliterata Kb. - Tiberiade.

Pediopsis scutellata Boh. - Bloudan.

Thamnotettix fenestrata H-S. — Bloudan. Zebodani.

var. transversalis Put.

Variété avec une large bande blanche transverse sur les élytres depuis le sommet de l'ecusson jusqu'à celui du clavus.

Athysanus prasinus Fall? - Beyrouth.

Deltocephalus breviceps Kb. - Oued-Harris.

Alebra albostriella Fall. - Caïffa.

115 espèces, dont 39 étrangères à la France et à la Suisse (10 espèces et 5 variétés nouvelles).

Syrische Hemiptern

E. Frey-Gessner.

Im October 1879 hatte ich das Vergnügen, in Siders mit Herrn Hans Simon aus Stuttgart, dem eifrigen Sammler und Kenner der Pselaphiden und Paussiden zusammen zu kommen. Wir machten täglich Ausflüge miteinander ohne gerade viel für unsere Sammlungen zu gewinnen; die Gegend um Siders scheint wegen ihrer Trockenheit den Pselaphiden nicht günstig und meine jetzigen Lieblinge, die Hymenopteren, waren im October nicht mehr vorhanden. Wir plauderten desto mehr über Entomologie. Bei einer dieser Gelegenheiten versprach mir Herr Simon eine Sammlung Hymenopteren und Orthopteren, welche er aus Syrien, besonders aus der Gegend von Haïfa erhalten hatte. Die Sendung kam wohlbehalten an und noch einige hübsche Reihen von Hymenopteren aus Chili

und Nordamerika dazu, und ich bin immer noch in doppelter Schuld einer entsprechenden Gegensendung an Pselaphiden und an dem Bericht über den Inhalt der Sendung. Bei meinen Exkursionen um Genf wendete ich tausende von Steinen um, um Pselaphiden zu finden, es krochen aber nur Myrmedonia canaliculata, Brachinus crepitans, Anchomenus prasinus, kleine schwarze Milben, Poduren und dergleichen Gesindel herum, leider nie von den gewünschten Micros; und doch müssen nach Heer, Chevrier, Buess und Tournier viele und seltene Arten um Genf an der Unterseite von Steinen vorkommen. Mit dem Bestimmen ging es mir anders. Seit dem Spätherbst 1879 lagen die Schachteln mit den hübschen Syriern und Amerikanern auf meinem Traktandentisch, oftmals nahm ich sie vor und ebenso oft musste ich sie anderer Arbeit wegen wieder an ihren Platz stellen; nach und nach erlitten nachfolgende Sendungen anderer Art, besonders Hymenopteren aus verschiedenen Gegenden Europa's, dasselbe Schicksal. Mir wurde immer schwüler bei dem wachsenden Stock, und hätte ich doch so sehr gern meine werthen Herrn Correspondenten bälder bedient. Endlich vor ein paar Tagen gelang es mir, die Syrischen Hemiptern vorzunehmen und das Verzeichniss scheint mir immerhin werth, dass es bekannt werde. Die meisten Arten sind nur in einzelnen Stücken vertreten, andere sind zahlreich vorhanden; hervorzuheben sind unter letztern besonders Tritomegas dubius Scop., Nezara Heegeri Fieb, Ischnotarsus melanotus Fieb. und Reduvius testaceus H.-Sch. Interessant war für mich besonders eine ganz kleine Notonecta, vielleichl nanula Walk. Dass Graphosoma lineata Linn., Carpocoris nigricornis Fabr. und dergleichen abundante Ubiquisten auch unter den Syriern in Anzahl vorhanden sind, ist kaum erwähnenswerth. Dass die Phytocoriden beinahe fehlen, mag in deren Zartheit liegen. Die Schulkinder, welche mit dem Fang der Insekten beschäftigt waren, nahmen begreiflich in erster Linie das weg, was ihnen am auffallendsten in die Augan stach.

Das Verzeichniss ergiebt folgende hübsche Reihe: Odontoscelis fuliginosus Linn. mit Varietäten und Larven.

,, plagiatus Germ. Q mit signatus Fieb. ♂.

Odontotarsus grammicus Linn. mit einigen kleinen Stücken ♂ Q

von bloss 8—8½ mill. Länge.

Eurygaster maurus Fabr. mit Larven.

Ancyrosoma albolineatum Fabr. Scutellera (Graphosoma) semipunctata Fabr.

., lineata Linn.

Cydnus flavicornis Fabr.

Macroscytus brunneus Fabr. mit viel Larven.

Geotomus elongatus H.-Sch.

Tritomegas dubius Scop.

Menaccarus arenicola Schultz.

Sciocoris luteolus Fieb.

" ochraceus Fieb.

Strachia picta H.-Sch.

" dominula Harr.

" Meyeri Fieb.

Carpocoris nigricornis Fab

,, lunula Fabr.

,, verbasci D. Geer.

Nezara Heegeri Fieb.

", prasina Linn.

Zicrona cœrulea Linn.

Phyllomorpha laciniata Will.

Pseudophlœus auriculatus Fieb.

Coreus pilicornis Burm.

Stenocephalus neglectus H.-Sch.

Verlusia sulcicornis Fabr.

Enoplops scapha? Fabr., mit beid-

seitig erweitertem drittem

Fühlerglied.

Centrocarenus spiniger Fabr.

Corizus abutilon Rossi.

" truncatus Ramb.

" capitatus Fabr.

Pyrrhocoris apterus Linn. mit und ohne Membran.

, ægyptius Linn.

Lygæus maculicollis Germ., ungeflügelt.

, militaris Fabr.

Nysius thymi Wolff.

Plinthisus bidentulus H.-Sch.

Pterotmetus dimidiatus? Fieb., mit je einem deutlichen schwarzen Fleck auf den Flügeldeckenstummeln.

Dieuchus melanotus Fieb., nebst viel Larven.

Dieuchus pulcher H.-Sch.

Lethæus niger Dall.

Beosus saturnius Rossi.

Emblethis pilifrons Zett.

" arenarius Linn.

Ischnopeza scaphula Bär.

Phygadicus urticæ Fab.

Monanthia Wolffi Fieb.

Capsus rutilus H.-Sch.

Heterocordylus tibialis Hhn.

Triphleps niger Wolff.

" lævigatus Fieb.

Oncocephalus notatus Ramb.

Harpactor variegatus Fieb.

Coranus ægyptius Fabr.

Reduvius testaceus H-Sch.

Holotrichius maurus Fabr. Q.

Pirates ululans Rossi, und Larve.

Metastemma æneicolle Stein.

Notonecta nanula? Walk.

Tettigometra costulata Fieb.

Pediopsis diadema Fabr.