

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 8 (1888-1893)

Heft: 1

Artikel: Nachträge zur Fauna coleopt. Helvetiae

Autor: Rätzer, A.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-400476>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Von *Balaninus nucum* durch verlängerte Fühlerglieder, von *venosus* durch geringere Grösse, rothe Beine, andere Bekleidung verschieden.

Schwarz mit rothem Rüssel, Fühlern und Beinen, und mit anliegender grauer, auf den Flügeldecken etwas scheckiger Behaarung, der Rüssel ist an der Wurzel nicht dicker als in der Mitte, die Fühler dünn, die äussern Glieder alle viel länger als breit, alle Schenkel mit starkem Zahn, der Zahn der Hinterchenkel ist an seiner Hinterseite etwas ausgerandet.

Vorbemerkung.

Folgende Nachträge waren meiner Intention nach ursprünglich nicht für den Druck der Mittheilungen, sondern für eine event. totale oder partielle Neu-Edition der *Fauna col. Helv.* bestimmt, sonst würde eine räumlich bescheidenere und zugleich gehaltvollere wie ansprechendere Form der Darstellung gewählt haben. Immerhin bin froh, bei dieser Gelegenheit mich öffentlich einer ältern und neuern Dankeschuld entledigen zu können gegenüber den Herren Fauvel und Eppelsheim, die mit unermüdlicher Geduld und Beflissenheit meine vielen dubiosen Staphilinen bestimmten, sowie gegenüber den Herren Weise, Reitter und Stierlin, die so gütig waren, mich über andere schwierige Gruppen zu orientiren.

Nachträge zur Fauna coleopt. Helvetiae

besonders aus dem Gebiete

des berner Seelandes, des Jura und der Walliser Alpen.

Von **A. Rätzer.**

- | | |
|---|---|
| <i>Notiophilus rufipes</i> , Siselen s. | <i>Leistus ferrugineus</i> , Siselen, Sol.-Jura s. |
| <i>Omophron limbatum</i> , Bielersee von Erlach bis Hagneck häufig. | — <i>nitidus</i> , Simplon, n. s. |
| <i>Elaphrus uliginosus</i> , Gadmen bei 3500' häufig. | <i>Carabus intricatus</i> , der gemeinste Car., nam. im Winter in faulen Stöcken. |
| — <i>cupreus</i> , Büren n. s. | — <i>depressus</i> , ebenso, doch seltener; Simplon n. s. |
| — <i>littoralis</i> , Büren im Aaregrien häufig. | — v. <i>Bonellii</i> , Gadmen am Steingletscher, n. s. |
| <i>Nebria picicornis</i> , Bielersee bes. bei Hagneck äusserst gemein; Gadmen, Findelsee, Mattmark bei 8000'. | — v. <i>Cychroides</i> , Val Entremont und Ferret n. s. |
| — <i>brevicollis</i> , im Solothurner-Jura (Wandfluh) im Frühling häufig. | — <i>Fabricii</i> , Gadmeralpen, n. s. |
| — <i>fulviventris</i> , St. Bernhard. | — — v. <i>Heeri</i> , Gadmen am Sustenpass. |
| — <i>castanea</i> , auch im Jura, Chasseralkamm s. | — <i>auronitens</i> , var. <i>ped. nigris</i> , Gadmen, s. |

- Carabus cancellatus*, v. *fusus*=*carinatus*, Bern, Büren hfg.
 — *monilis*, im bern. Seeland auf Feldwegen im Herbst häufig. *)
 — var. *Schartowi*, Berner und Soloth. Jura, (Chasseral, Wandfluh etc.) n. s.
 — *arvensis* var. *pomeranus*, im Soloth. Jura n. s.
 — *catenulatus*, Chasseralkamm hfg.
 — *nemoralis*, Bern. u. Sol. Jura, stark metallglänzend.
 — *alpinus*, Simplon, Susten u. Urneralpen hfg.
 — var. *Bernhardinus*, St. Bernhard häufig.
 — *auratus* v. *Honoratii*, Gadmen statt d. typ. F., aber selten.
 — *silvestris*, Sol. Jura, doch selten, stark messingglänzend.
 — var. *nivalis*, Gadmen, Niesen, n. s.
 — *purpurascens*, im wärmeren Seeland, bes. bei Siselen, in Wäldern und auf Wegen z. hfg.; seltener im Jura.
 — var. *exasperatus*, im Berner Hügel-land (Ferenbalm, Büren etc.) n. s.
Brachinus efflans, Val Entremont s. s.
 — *sclopeta*, Val Entremont s.
Cymindis cingulata, Simplon südl. n. s.
 — *axillaris*, Nyon, s.
 — *coadunata*, Gadmen bei 4300' n. s.
 — *punctata*, auch in den Berneralpen, namentl. Grimsel, Susten etc. hfg.
Dromius unipunctatus, Büren, im Aaregrien n. s.
 — *marginellus*, Büren, unter Kiefern-rinde, s.
 — *fenestratus*, Gadmen, Sol. Jura s.
 — *melanocephalus*, Entremont.
Apristus quadrillum, Büren hfg.
 — v. *bipunctatum*, " "
Lebia haemorrhoidalis, bern. Seeland, im Herbst auf Aspen u. Birken n. s.
Dischirius aeneus, Seeland, bes. Büren, im Aaregrien, z. hfg.
 — *politus*, Seeland, bes. Büren, n. s.
 — *angustatus*, Büren i. Aaregrien, n. s.
 — *semistriatus*, " " " " "
Loricera pilicornis, Seeland, in Waldgräben. Chasseral, n. s.
Panagaeus 4 pustulatus, Gadmen b. 5500' n. s. (nie von der Ebene).
- Callistus lunatus*, Gadmen, sonnige Weiden b. 4300' n. s., s. i. d. Ebene.
Chlaenius spoliatus, Bielersee, bes. b. Gerlafingen, n. s. s.
Chlaenius agrorum, Bieler- u. Murten-see hfg.; Büren seltner.
 — *nigricornis*, Bielersee selten, Büren z. hfg., Sol. Jura bei 4000'.
 — *holosericeus*, Bielersee, b. Lüscherz selten.
Oodes helopioides, Büren, im Aaregrien n. häufig.
Licinus depressus, Gadmen, Chasseral, Val Entremont.
Badister peltatus, Siselen unt. Moos, Büren im Aaregrien häufiger.
 — *humeralis*, Seeland, überall n. s.
Stomis pumicatus, ebenda nicht selten.
Anisodactylus signatus, Siselen in Kornfeldern z. s.; Büren im Aaregrien, unter faulenden Samenkolben von typha hfg.
Diachromus germanus, Seeland, stellw. hfg., gern unter Sphagnum und in Lehm-boden.
Bradycellus collaris, Gadmen, Simplon, Sol. Jura, Bern und Siselen, nir-gends hf., einmal ans Licht fliegend.
 — *similis*, Gadmen, unter Rinden s. s.
Harpalus var. *laticollis*, Gadmen und Simplon n. s.
 — *cordatus*, Simplon n. s.
 — *puncticollis*, Siselen, Chasseral s.
 — *calceatus*, stellenw. hfg. (gern ans Licht fliegend).
 — *hottentotta*, Siselen, Chasseral s.
 — *laevicollis*, im Jura hfg. wie in den Alpen mit d. var. *satyrus*.
 — var. *nitens*, Seeland hie u. da.
 — *sulphuripes*, Berner oberland s.
 — *ignavus*, Simplon, hfg.
 — *distinguendus*, Seeland, nam. Bielersee s. gem. Simplon n. s.
 — *attenuatus*, Simplon s.
 — *discoideus* " "
 — *luteicornis*, Val Ferret, Macugnaga.
 — 4 *punctatus*, Gadmen, Simplon, Chasseral, n. s.
 — *fuliginosus*, Simplon n. s.
 — *Fröhlichii*, Gadmen, Siselen s.
 — *flavitaris*, Siselen mit *tardus* im Frühling hfg.

*) Nach Fauvel's Angaben=*consitns*; *monilis* typ. (=regularis) von der Lenk und aus dem Wallis (obsoletus false Liniger Mitth. VII. 238); v. *rufofemoratus* vom Niesen, beide einzeln.

Acupalpus, skrimshiranus, Berner Oberland s.

- *vespertinus*, Seeland bes. Siselen unt. Moos n. hfg.
- *v. Ziegleri*, Büren, Siselen hfg.
- *flavicollis*, Siselen, Bielersee, Chasseral n. hfg., Büren im Aaregrien unter Samenkolben *v. typha* s. gem.
- *dorsalis*, Siselen, Büren s.
- *v. maculatus* Ziegl. = *Lucasi*, Siselen u. Moos stellenw. n. s., Büren s.

- *brunnipes*, Siselen, unt. Moos s.

Platyderus rufus, Val Entremont und Ferret, Berner Oberland.

- *ruficollis*, Val Entremont u. Ferret.

Pterostichus var. affinis, Simplon z. s.

- *pauciseta*, Gadmen, Simplon, Jura, und noch a. d. Gurten b. Bern hfg.
- *var. cupreoides*, Simplon, Chasseral nicht selten.

- *lep. var. transalpinus*, Simplon a. Laquinwasser hfg. (synon. c. sequ.?)

- *var. viridanus*, Simplon, mit vor.

- *gracilis*, Siselen im Herbst u. Moos, z. hfg. (anthrac. fehlt dort), Büren s.

- *minor*, ebenso, noch viel hfg.

- *interstinctus*, Seeland, Jura, Gadmen, n. s.

- *diligens*, Gadmen n. s. Bern.

- *angustatus*, Simplon, Macugnaga häufig.

- *concinus*, Seeland n. s., Jura wie Alpen gemein.

- *aethiops*, Waadtl. Berge, bern. Voralpen, Bern hfg.

- *Jurinei*, *v. Zahlbruckneri*, Gadmen am Steingletscher s.

- *v. Heydeni*, ebenda z. hfg.

- *Hagenbachii*, Berner- u. Sol. Jura, nur auf den Kammhöhen, namentl. Chasseral (wo *Honoratii*, wenn je vorhanden, sicher verschwunden) und Wandfluh nicht selten.

- *cribratus*, Simplon wie Macugnaga hfg. bis gemein.

- *metallicus*, Jura, oberste Waldzone, in reducirter Form.

- *unctulatus*, Simplon, auf der Rossbodenalp zieml. hfg.

- *spadiceus*, Berner u. Soloth. Jura bes. i. Herbst u. Laub hfg., Gadmen seltner.

- *striola*, Berner wie auch Waadtl. Alpen b. ü. d. Baumgrenze gem.

- *exaratus*, Macugnaga n. s.

- *oblongus*, Simplon in der Gondoschlucht n. s.

Amara consularis, Gadmen s.

- *ingenua*, Chasseral s.

- *bifrons*, Simplon hfg.

- *Solieri*, Macugnaga (M. Moro) hfg.

- *acuminata*, Gadmen, Entremont.

- *lunicollis*, Gadmen n. s., Siselen s.

- *spretta*, Simplon selten.

- *curta*, Gadmen, Entremont, Chasseral n. s.

- *ovata*, Gadmen.

- *similata*, Siselen i. Wint. u. Moos hfg.

- *montivaga* Siselen, im Winter unt. Moos häufig.

- *plebeja*, Siselen, im Winter unter Moos gemein.

- *tricuspidata*, Siselen im Winter unter Moos n. s.

- *striatopunctata*, Siselen im Winter unter Moos sehr selten.

Calathus punctipennis, Simplon selten.

- *fuscus*, " n. hfg.

- ? *luctuosus* an *longicollis*, Entremont.

Taphria nivalis, Entremont, Zermatt, Wimmis.**Anchomenus var. depressus, Simplon wie Macugnaga hfg.**

- *impressus*, Bielersee bei Hagneck, Büren im Aaregrien stellenw. gem.

- *ericeti*, Val Ferret n. s.

- *var. alpestris*, Entremont s.

- *gracilipes*, Siselen unt. Moos s. s.

- *austriacus*, Bielersee b. Lüscherz s.

- *lugens*, Siselen i. Herbst u. Moos n. s.

- *var. moestus*, Seeland i. Waldgräben und unter Schilf gemein.

- *var. emarginatus*, Siselen z. hfg.

- *versutus*, Neuenb. Jura (Noiraigue), Berneralpen (Wimmis) s.

- *antennarius*, Gadmen, V. Ferret s.

- *micans*, Büren im Aaregrien gem.

- *gracilis*, Siselen im Wint. unt. Moos, Lüscherz am Bielersee n. s.

- *puellus*, Clarens, am Genfersee s.

Patrobus excavatus, Büren im Aaregrien n. s. s.

- *septentrionis*, Wimmis s.

Trechus discus, Büren stellenw. n. s.

- *longicornis*, Büren i. Aaregrien s.

- *rubens*, Büren s.

- *obtusus*, Gadmen, Chasseral, Entremont, Lausanne n. s.

- *strigipennis*, Simplon wie Mt. Moro, doch selten, Mattmark n. s.

- *laevipennis*, Gadmen, s.

- Trechus glacialis*, Gadmen a. Steingl. stellenw. hfg.
 — *Schaumii*, Gadmen s.
 — *secalis*, Büren mit discus n. s.
- Perileptus areolatus*, Bielersee b. Er-lach u. Hagneck, hfg.
- Tachypus caraboides*, Gadmen, Brig a. d. Rhone, Büren im Aaregrien hfg.
 — *pallipes*, Entremont hfg., Siselen s., Büren i. Aaregrien hfg.
- Bembidium foraminosum*, Bielersee hfg.
 — *striatum*, Büren im Aaregrien hfg.
 — *punctulatum*, Murten u. Bielersee, Büren.
 — *pygmaeum*, Gadmen, Büren hfg.
 — *pyren. v. rhaeticum*, Val Ferret hfg.
 — *tenellum*, Büren im Aaregrien äuss. gemein.
 — *Doris* " " " s.
 — *Sturmii* " " " Hag-neck a. Bielersee s.
 — *4 guttatus*, Büren im Aaregrien s.
 — *4 pustulatus*, Siselen z. s.
 — *albipes*, Büren i. Aaregrien hfg.
 — *ruficorne*, Simplon, Ferret, Büren z. s.
 — *modestum*, Bielersee, Büren i. Aaregrien hfg.
 — *eques*, Büren, Wimmis a. d. Simme häufig.
 — *fulvipes*, Büren s., Brig, Sidens a. d. Rhone hfg. noch bei Saas.
 — *decorum*, Gadmen, Bielersee bei Hagneck, Büren im Aaregrien hfg.
 — *monticola*, Berner oberland.
 — *fasciolatum*, Bielersee, Büren, Brig überall gemein.
 — *cumatile*, Bielersee b. Hagneck.
 — *conforme*, Gadmen s.
 — *tricolor*, " Wimmis n. s.
 — *Andreae*, " Bielersee gem.
 — *femoratum*, Bielersee gemein.
 — *obsoletum*, " Büren im Aaregrien hfg.
 — *lunatum*, Büren im Aaregrien gem.
 — *bisignatum*, Brig, Sidens a. d. Rhone s. hfg., noch bei Saas.
 — *varium*, Bielersee s.
 — *adustum*, Büren im Aaregrien äuss. gemein.
 — *flammulatum*, im ganzen Seeland gemein.
 — *assimile*, Büren im Aaregrien, z. s.
 — *biguttatum*, Seeland mit *flammulatum* fast ebenso gemein.
- *guttula*, Lausanne am Seeufer, Büren im Aaregrien z. s.
 — *obtusum*, Brig, Bern, Entremont n. s.
 — *Mannerheimi*, Sol. Jura (Wandfluh) n. d. Schneeschmelze n. s.
 — *5 striatum*, Siselen an Hofmauern, in der Nähe alter Linden n. s.
 — *6 striatum*, Bielersee, Büren im Aaregrien hfg.
 — *nanum*, Gadmen, Siselen hfg., selt. Büren.
- Scotodipnus glaber*, Macugnaga im Pfrundwald unter grossen Steinen n. s.
- Hydaticus Hübneri*, Siselen im Wald u. Moos u. in Waldgräben n. s.
- Colymbetes collaris*, Büren im Aaregrien n. s.
- Agabus congener*, Berneralpen, nam. Grimsel s. hfg.
 — *Sturmii*, Gadmen bei 5500'.
 — *didymus*, " hfg. Simplon.
 — *bipunctatus*, Entremont.
 — *Solieri*, Berneralpen (Susten, Grimsel) s. hfg. wie im Riffelsee bei Zermatt.
- Hydroporus griseostriatus*, Entremont n. s.
 — *reticulatus*, Büren im Aaregrien n. s.
 — *bicarinatus*, Büren im Aaregrien z. hfg.
 — *12 pustulatus*, Büren im Aaregrien s. s.
 — *elegans*, Büren im Aaregrien s. s.
 — *rufifrons*, " Aarberg n. s.
 — *melanarius*, Siselen s. s.
 — *marginatus*, Aarberg.
 — *victor*, Ferret z. s.
- Haliphus flavicollis*, Büren im Aaregrien s.
 — *lineatus*, Büren im Aaregrien n. s.
 — *Heydenii*, " " " z. hfg.
 — *cinereus*, " " " s. gem.
 — *lineatocollis*, " " " hfg.
- Gyrinus marinus*, Siselen n. s.
 — *Suffriani*, Siselen n. s.
- Cercyon obsoletum*, Gadmen, Siselen n. s.
 — *quisquillum*, Büren s. s.
 — *laterale*, Gadmen am Steingl.
 — *aquaticum*, Jura s. s.
 — *plagiatum*, Val Piora, n. s. s., Jura s.
 — *lugubre*, Büren s.
 — *anale*, Seeland z. s.

- Falagria thoracica*, Siselen s.
 — *sulcata* } Büren z. s.
 — *sulcatula* }
- Bolitochara lunulata*, Büren u. Moos s.
 — *bella*, Büren.
 — *obliqua*, Büren u. Weisstannen u. Buchenr. n. s.
- Silusa rubiginosa*, Siselen s. s.
Ocalea castanea, Siselen u. Moos s.
 — *badia*, Berner Jura im Herbst u. Laub gem.
- Stichoglossa semirufa*, Bern s.
Ischnoglossa rufopicea, Gadmen u. Ahornr. z. s., Aarberg, Büren u. Eichen- u. Buchenr. hfg.
 — *corticina*, Büren u. Rinde hfg.
 — *prolixa*, Val Ferret s.
- Leptusa fumida*, Gadmen u. Ahornr. n. s., Büren u. Eichenr. u. in faulen Buchenstöcken hfg.
 — *analis*, Berner Jura s.
 — *ruficollis*, Gadmen (Tannen), Siselen (Eichen), Büren (Buchen u. Weisstannenr.) n. hfg.
- Thiasophila angulata*, Büren b. form. *rufa* gem.
- Euryusa laticollis*, Büren s. s.
Aleochara lata, Siselen an gröss. Aas n. s.
 — *rufipennis*, Seeland z. hfg. u. Moos.
 — *tristis*, Bielersee s.
 — *villosa*, Büren z. s.
 — *latipalpis*; Siselen s.
 — *brevipennis*, Bern, Büren n. s. s.
 — *lanuginosa*, Seeland u. Moos u. in Kellern, Berner- u. Sol. Jura hfg.
 — *rufitarsis*, Val Ferret s., Steingl. hfg.
 — *moesta*, Siselen, Büren z. s.
 — *incospicua*, Gadmen s. s.
 — *brunneipennis*, Siselen mit *moesta* in Baumstämmen.
 — *moerens*, Val Ferret s., Bern.
 — *bilineata*, Chasseral.
 — *nitida*, Bern, Seeland, Gadmen, Riffel n. hfg.
 — *morion*, Seeland u. Moos s.
- Atemeles paradoxa*, Siselen u. Moos s.
 — *emarginata*, " " " "
- Myrmedonia collaris* " s.
 — *humeralis*, Simplon, Jura, Büren s.
 — *limbata*, Siselen s.
- Ilyobates rufus*, Büren s. s.
Calodera aethiops, Büren s.
 — *umbrosa*, Siselen u. Eichenr. s.
- Chiloporus longitarsis*, Seeland, in Waldgräben u. an Ufern gemein.
- *rubicundus*, Simplon, Riffel, Val Ferret s., Büren im Aaregrien n. s.
Tachyusa balteata, Büren im Aaregrien s.
 — *constricta*, " " " s. gemein.
 — *coarctata*, " " " hfg.
 — *umbratica*, " " " sltnr.
 — *exarata*, " " " s.
 — *scitula*, Büren mit Tr. *discus*, n. s. s.
- Oxypoda luteipennis*, Seeland, nam. b. Kallnach in Waldgräben gemein.
 — *vittata*, an Aas.
 — *opaca*, Seeland auf Gesträuch u. Laub hfg.
 — *cuniculina*, Simplon, Siselen s.
 — *togata*, Val Ferret s.
 — *exigna*, Gadmen n. s.
 — *haemorrhoea*, Büren b. form. r. hfg.
 — *formiceticola*, Val Ferret s., Büren b. f. r. hfg.
 — *fuscula*, Chasseral s.
 — *annularis*, Siselen, Büren n. s. s. u. Moos.
 — *pallidula*, Gadmen, Entremont n. s.
 — *sericea*, Büren s.
- Notothecta flavipes*, Büren b. f. r. n. hfg.
 — *anceps*, Büren b. f. r. s. hfg.
- Alianta plumbea*, Büren s. s.
- Homalota currax*, Solothurn z. hfg.
 — *cambrica* = *velox*, " " "
 — *umbonata*, Siselen, Büren an sonnig. Waldrändern u. Moos n. s., Gadmen noch am Steingl.
 — *nitidula*, Gadmen u. Moos.
 — *hypnorum*, Siselen u. Moos s.
 — *picipes*, Gadmen, Büren, Siselen s.
 — *alpestris*, Jura s, s.
 — *longicollis*, Siselen s.
 — *insecta*, Büren im Aaregrien n. s.
 — *melanocera*, Büren im Aaregrien s. s.
 — *gregaria*, Büren an sonn. Waldrändern n. s.
 — *elongatula*, Seeland, nam. b. Siselen u. Kallnach gemein.
 — *fluvialis*, Büren im Aaregrien n. s.
 — *luridipennis*, Kallnach, Solothurn s.
 — *luteipes*, Siselen, Büren n. s.
 — *labilis*, Büren u. Rinde s.
 — *gemina*, Siselen s. s.
 — *hygrobia*, Solothurn hfg.
 — *aequata*, Seeland, nam. u. Eichen- u. Buchenr. gemein.
 — *angustula*, Val Ferret s.

- Homalota linearis*, Büren u. Moos n. s. s.
 — *debilis*, " " Rinde s. s.
 — *plana*, Gadmen u. " " "
 — *cuspidata*, Seeland und Jura u. Eichenr. (Buchenr.) hfg.
 — *exilis*, Siselen, Büren u. Moos n. s.
 — *indocilis*, Entremont s.
 — *talpa*, Büren bei form. r. hfg.
 — *silvicola*, Val Ferret s.
 — *brunnea*, Siselen, Bern, Jura u. Steinen z. hfg.
 — *succicola*, Siselen, u. Rinde n. hfg.
 — *merdaria*, Seeland, namentl. im Jura an Pilzen gemein.
 — *depressa*, Val Ferret s.
 — *granigera*, " " "
 — *trinotata*, Gadmen, Val Bagne, Siselen, Büren u. Moos. u. an Pilzen n. s.
 — *sericans*, Seeland an Pilzen hfg.
 — *nigritula* Gyll., Siselen, Büren in Pilzen z. s.
 — *nigritula*, Seeland, nam. Siselen gemein.
 — *pallidicornis*, Büren s.
 — *sodalis*, Seeland u. Moos u. Rinden, Büren n. s.
 — *angusticollis*, Siselen s.
 — *nigricornis*, Büren u. Eichen- u. Weisstannenr. n. s.
 — *coriaria*, Bern n. s.
 — *gagatina*, Seeland in Pilzen hfg.
 — *myrmecobia*, Büren n. s.
 — *testaceipes*, Gadmen, Siselen u. Moos n. s.
 — *oblita*, Siselen s., Büren s.
 — *amicula*, Büren i. Excr. n. s.
 — *livida*, Gadmen, Chasseral u. Steinen s.
 — *marcida*, Seeland in Pilzen hfg.
 — *picipennis*, Büren u. Weisstannenr., Gadmen, Riffel z. s.
 — *intermedia*, Büren s.
 — *longicornis*, Seeland, nam. Siselen i. Frühling u. Steinen n. s.
 — *atramentaria*, Gadmen, Siselen s.
 — *contristata*, Gadmen, Sol. Jura z. s.
 — *villosula*, " " " s. s.
 — *laevana*, Büren s.
 — *subtilis*, Büren s. s.
 — *cadaverina*, Bern, Büren s.
 — *procera*, Büren u. Pilzen, s. s.
 — *ravilla*, Solothurn s. s.
 — *palustris*, Siselen n. hfg. u. Moos.
 — *sordida*, Siselen, Berner oberland u. Steinen s.
 — *aterrima*, Büren. u. Moos. Jura.
 — *nigerrima*, Büren s. s.
 — *pygmaea*, Siselen, Büren an sonn. Waldrändern z. hfg.
 — *laticollis*, Seeland, in Pilzen n. s.
 — *subsINUATA*, Gadmen, Siselen n. s.
 — *Zosteræ*, Macugnaga s., Büren n. s. s.
 — *picipes=stercor.*, Büren u. Moos n. s. s.
 — *celata*, Seeland u. Moos n. s.
 — *pulchra*, " " " z. s.
 — *fungi* " " s. gemein.
 — *orphana*, Büren mit *pymaea* n. s.
 — *clientula*, Büren u. Laub n. s.; Berner Jura.
 — *tibialis*, Gadmen, V. Ferret, Chasser.
Placusa complanata, Entremont n. s.
 — *humilis*, Büren s.
 — *infima*, Siselen, Büren, Entrem. z. s.
Phloeopora reptans, Büren, u. Weisstannen od. Dählenr. n. hfg.
 — *corticalis*, Siselen u. Eichenr. n. s.
 — *major*, " " " s.
Hygronoma dimidiata, Siselen u. Moos s.
Oligota pusillima, Siselen s.
Gyrophæna gentilis, Siselen unt. Moos, auch an Aas, selten, Büren.
 — *pulchella*, Siselen an Pilzen hfg., Entremont.
 — *affinis*, Gadmen, an Ahornschwämmen n. s.
 — *Poweri*, Siselen, Büren u. Moos u. an Pilzen hfg.
 — *fasciata=congrua*, Büren hfg.
 — *bihamata*, Siselen, Büren u. Moos s.
 — *laevipennis*, Siselen s.
 — *laevicollis*, Büren n. s. s.
 — *strictula*, Büren a. Eichenschw. hfg.
 — *polita*, Siselen, Büren, z. s.
Hypocypus seminulum, Gadmen u. Moos s.
Habrocercus capillaricornis, Gadmen, Siselen, Büren z. s.
Tachinus rufipennis, Gadmen im Pfarrhauskeller, Berner Jura, im Rossmist, s. s.
 — *proximus*, Büren n. s. s.
 — *rufipes*, Gadmen, Seeland, Jura n. s.
 — *pallipes* Büren, Chasseral s.
 — *marginellus*, Büren, Chasseral s.
 — *collaris*, Gadmen n. s., Jura s.
 — *elongatus*, Gadmen, Entremont s. s.
Tachyporus formosus, Seeland, fast überall gemein.

Tachyporus ruficeps, Entremont, Val Ferret z. s., Büren s. s.
 — **solutus**, Seeland n. s.
 — **ruficollis**, Gadmen, u. Moos hfg., Chasseral, Bern, Büren seltener.
 — **humerosus**, Siselen, Büren, Val Ferret, Entremont n. s.
 — **transversalis**, Siselen s. s.
 — **scitulus**, Gadmen, Ferret u. Entremont, Chasseral n. s.
 — **pusillus**, Gadmen, Simplon, Entremont n. s., Büren s. s.
 — **erythropterus**, Entremont s.
Conurus fuscus, Siselen, Büren unt. Moos n. s.
 — **bipustulatus**, Büren a. Vegetabil. z. s.
Boletobius analis, Gadmen, Entremont z. s., Seeland hfg.
 — **cingulatus**, Siselen s. s.
 — **punctatus**, Gadmen, Simplon b. 7000'.
 — **brunneus**, " " Jura.
 — **pachyrhaphis**, Simplon s. s.
 — **splendens**, Gadmen, Val Ferret, bis 7000', Seeland hfg.
 — **splendidulus**, Gadmen, Seeland u. Moos z. hfg.
Euryporus picipes, Chasseral s.
Quedius lateralis, Siselen, Büren, im Herbst unter Stachelpilzen n. s.
 — **fulgidus**, Siselen, Büren, hfg. in Kellern mit mesomelinus.
 — **ochripennis**, Val Ferret s.
 — **xanthopus**, Gadmen n. s. in faulen Stöcken, Val Ferret, Berner und Soloth. Jura s.
 — **cruentus**, Büren s.
 — **scitus** " "
 — **laevigatus**, Gadmen, Simplon, unt. Steinen, Chasseral hfg. in faulen Baumstäcken.
 — **cinctus**, Gadmen, Seeland, namentl. Kallnach in Waldgräben gemein.
 — **tristis**, Siselen, Bern. Jura n. hfg.
 — **picipes**, " s., Chasseral hfg.
 — **ochropterus**, Simplon, Val Ferret h.
 — **robustus**, Gadmen, am Steingl., Simplon, Mattmark z. hfg.
 — **dubius**, Gadmen, stellenweise gem.
 — **fumatus**, Bern, Val Ferret, Sol. Jura.
 — **limbatus**, Simplon, Chasseral, n. s.
 — **auricomus**, Simplon, Macugnaga (M. Moro) s. s.
 — **alpestris**, Simplon, Macugnaga, Gadmen, Val Entremont, n. hfg.

— **attenuatus**, Seeland, Jura, Zermatter-Alpen.
 — **fulvicollis** Epp., Chasseral s. s.
 — **scintiilans**, Büren s.
 — **paradisianus**, Simplon n. s. s., Riffel.
 — **boops**, Chasseral, Bern s.
Staphylinus lutarius, Jura s. s.
 — **stercorarius**, Val Ferrez, Büren n. h.
 — **chalcocephalus**, Siselen an Aas u. Excrem n. s.
 — **latebricola**, Siselen s.
 — **fulvipes**, Gadmen, Siselen in sonnigen Lagen u. Steinen n. s. s.
 — **erythropterus**, Gadmen, n. s., Siselen.
 — **fossor**, Gadmen, hfg. in höhern Lagen, Sol. Jura, Val Ferret.
 — **brachypterus**, Gadmen, (olens vertretend) n. s.; auch im höh. Jura s.
 — **alpestris**, Gadmen s.
 — **brunnipes**, Büren u. Weisstannenr., Siselen, Jura, Val Ferret.
 — **fuscatus**, Jura s.
 — **fulvipennis**, Gadmen, Jura n. s. Val Ferret, Büren s.
 — **pedator**, V. Ferrez, Macugnaga n. s. s.
 — **ater**, Büren an unterird. Orten n. s. s.
 — **edentulus**, Siselen z. hfg., Gadmen s.
Philonthus intermedius, Siselen, Jura n. selten.
 — **nitidus**, Gadmen, Val Ferrets. i. Jura.
 — **proximus**, Jura s.
 — **carbonarius**, Bern, Siselen z. hfg., Büren.
 — **temporalis**, Gadmen, V. Ferrez s. s.
 — **punctatus**, Siselen s.
 — **puella**, Sol. Jura s.
 — **cephalotes**, Büren, in Kellern hfg.
 — **umbratilis**, Siselen, Büren n. s.
 — **sordidus**, Sol. Jura s.
 — **sanguinolentus**, Entremont, Sol. Jur. im Mist n. s.
 — **immundus**, Siselen, Chasseral, Berneroberland, Entremont n. s.
 — **ventralis**, Bern, Gadmen, Berner Oberland.
 — **debilis**, Seeland, z. hfg. Entremont, Ferret s.
 — **scutatus**, Entremont s. s.
 — **atratus**, Seeland gar n. hfg. Jura s.
 — **nimbicola**, Simplon, Val Ferret, n. s., auch Macugnaga.
 — **montivagus**, Gadmen am Steingl., Val Ferret, Simplon.
 — **laevicollis**, Gadmen (4—7000)' Niesen, Jura (Bern. u. Sol. Jura) n. s.

- Philonthus aerosus**, Simplon, Val Ferret, Macugnaga.
 — **laetus**, Simplon n. s., Macugnaga s.
 — **decorus**, Seeland u. Jura hfg.
 — **lucens**, Gadmen, Bern. u. Sol. Jura, Seeland n. s.
- Philonthus varius**, Seeland, nam. bei Siselen, d. gemeinste Phil., unt. Moos.
 — **v. bimaculatus**, Siselen s.
 — **marginatus**, Gadmen z. hfg., Jura s.
 — **cruentatus**, Entremont, Chasseral s.
 — **frigidus**, Gadmen, v. Ferret in höheren Lagen, gemein.
 — **corvinus**, Seeland nam. b. Siselen mit varius gem., Bern u. Bernobld. s.
 — **fimetarius**, Siselen an Aas, Büren unt. faulenden Satanspilzen hfg.
 — **opacus**, Gadmen, Siselen, Simplon, Bern u. nam. Sol. Jura i. Rossmist hfg.
 — **agilis**, wie voriger, doch s.
 — **albipes**, Entremont, Bern u. Sol. Jura.
 — **vernalis**, Gadmen n. s., Büren s.
 — **quisquiliarius**, Jura s.
 — **splendidulus**, Gadmen, Siselen, Büren u. Rinde hfg.
 — **fumarius**, Bern. Oberld., Siselen unter Moos s.
 — **nigrita**, Siselen unt. Moos s.
 — **virgo**, " " " s. s.
 — **micans**, im ob. Seeland nam. Siselen unt. Moos hfg., anderw. s.
 — **astutus**, Simplon, Solothurn s.
 — **rubripennis**, Büren s. s.
 — **concinus**, " " "
 — **exignus**, Büren n. s. unt. Moos.
 — **tenuis**, Büren im Aaregrien n. s.
 — **cinerascens**, Siselen unt. Moos s.
 — **procerulus**, " Büren s.
- Xantholinus glabratus**, Büren s.
 — **glaber**, Bern, Siselen, Büren s. s.
 — **tricolor**, Seeland u. nam. Jura n. s.
 — **distans**, Büren n. s.
 — **fulgidus**, Bern, Siselen s.
 — **lentus**, Gadmen, Entremont in faulen Stöcken, Büren unt. Weisstannenrinde stellenw. hfg.
- Metoponcus brevicornis**, Büren unt. Weisstannenr. n. s. s. (sammt 1 Larve).
- Leptacinus batychnus**, Gadmen, Siselen.
 — **formicetorum**, Büren b. f. r. hfg.
- Baptolinus alternans**, Gadmen, Siselen s.
 — **pilicornis**, Gadmen, v. Ferret s.
 — **longiceps**, Gadmen, Sol. Jura s. s.
- Othius punctipennis**, Gadmen s.
 — **laeviusculus**, Büren s. s.
 — **melanocephalus**, Gadmen, am Steingletscher n. s., V. Ferret.
 — **lapidicola**, Jura (Sol. u. Bern.) s.
 — **myrmecophilus**, Seeland an sonn. Waldr. n. s., Chasseral.
- Lathrob. brunnipes**, Büren z. s.
 — **boreale**, Büren n. s. s.
 — **laevipenne**, Büren, Solothurn n. s.
 — **filiforme**, Seeland z. s.
 — **longulum**, Gadmen, Seeland n. hfg.
 — **scutellare**, Siselen s. s.
 — **quadratum**, Seeland s. s.
 — **terminatum**, " hfg.
 — **fovulum**, Siselen s. s.
 — **pallidum**, " " "
- Lithocharis castanea**, Büren s.
 — **fuscula**, Siselen n. s.
 — **brunnea**, " hfg.
 — **ruficollis**, Entremont n. s.
 — **melanocephala**, Seeland bes. Siselen im Frühling unter Steinen s. hfg.
- Scopaeus laevigatus**, Seeland z. hfg.
 — **cognatus**, Seeland etw. selt.
 — **sulcicollis**, Gadmen, les Avants s.
 — **sericans**, Büren s. s.
- Domene scabricollis**, Chasseral s.
- Stilicus fragilis**, Büren s. s.
 — **subtilis**, Siselen, Büren n. s.
 — **similis**, Gadmen, Siselen, Büren s.
 — **geniculatus**, Büren u. Moos z. hfg.
 — **affinis**, Seeland bes. Siselen hfg.
 — **orbiculatus**, " " Büren u. Rinde hfg.
- Sunius filiformis**, Siselen, Entremont, Ferret hfg.
 — **intermedius**, Seeland z. s.
- Paederus meridionalis**, Aosta s.
 — **brevipennis**, Gadmen n. s., Jura s., einm. auch in der Ebene b. Büren.
 — **caligatus**, Büren s. s.
 — **limnophilus**, Büren i. Aaregrien hfg.
 — **sanguinicollis**, " " " etw. später u. selt. als ruficollis.
- Dianous coeruleus**, Solothurn, Büren.
- Stenus bipunctatus**, Bicersee gemein,
 — **longipes**, Siselen s. s., Büren hfg.
 — **stigmula**, Büren i. Aaregrien z. hfg.
 — **alpicola**, Sol. Jura s.
 — **asphaltinus**, Val Ferret.
 — **Guynemeri**, Simplon, Ferret, Entremont s.
 — **fossulatus**, Siselen, Büren, Jura s.
 — **aterrimus**, Büren b. form. r. s.
 — **incanus**, Berner oberl., Büren s.

- Stenus declaratus*, Seeland, z. gemein.
 — *guttula*, Solothurn, n. s.
 — *bimaculatus*, Büren, im Aaregrien u. Schilf hfg.
 — *ater*, Seeland, nam. Siselen gem.
 — *circularis*, Seeland, nam. Siselen s.
 — *pusillus*, Büren s.
 — *melanarius*, Seeland, Lausanne, Fluss- und Seeufer gemein.
 — *melanopus* = *nitidus*, Siselen s.
 — *morio*, Seeland unt. Moos hfg.
 — *crassus*, Gadmen s.
 — *humilis*, Siselen s.
 — *nigritulus*, Büren s.
 — *brunnipes*, Büren, Chasseral, z. hfg.
 — *montivagus*, Bern. Jura s.
 — *geniculatus*, Büren s.
 — *rusticus*, Bern hfg.
 — *lustrator*, Büren s. s.
 — *crassiventris*, Gadmen s.
 — *unicolor*, Siselen unter Moos hfg.
 — *cicindeloides*, Bern hfg., Seeland s. s.
 — *binotatus*, Seeland gar nicht hfg.
 — *nitidiusculus*, Siselen. Büren, im Herbst unt. Moos u. faul. Pilzen z. s.
 — *flavipes*, Seeland, doch s.
 — *subaeneus*, Siselen, Büren s.
 — *aerosus*, Büren, hier u. Moos n. s. mit *impressus*.
 — *impressus*, Seeland gemein.
 — *palustris*, Siselen s.
 — *fuscicornis*, Seeland u. Moos n. s.
 — *Erichsoni*, Büren s.
Oxyporus rufus, Gadmen, Siselen.
Bledius littoralis, Seeland n. s.
 — *erraticus*, Siselen s., Büren hfg.
 — *longulus*, Aarberg s.
 — *crassicollis*, Büren n. s.
 — *cribricollis*, Büren s.
Platysthetus capito, Entremont s.
 — *cornutus*, Bern s.
 — *laevis*, Mattmark s.
 — *nitens*, Seeland s.
Oxytelus insectatus, Siselen in sonnig. Lagen, unt. Steinen n. s.
 — *laqueatus* = *luteip.* Gadmen, Sol. Jura s.
 — *nitidulus*, Bern, Siselen n. s. s.
 — *complanatus*, Gadmen, Siselen s.
Haploderus caelatus, Siselen s.
 — *caesus*, Berner oberland s.
Trogophloeus arcuatus, Büren i. Aaregrien z. hfg.
 — *bilineatus*, Seeland nam. b. Kallnach in Waldgräben gemein.
 — *elongatulus*, Seeland unt. Eichenr. n. s., Jura.
 — *Erichsoni*, Seeland g. s.
Ancyrophorus aureus, Solothurn n. s. s.
Deleaster dichrous, Wimmis, Büren i. Aaregrien hfg.
Anthophagus spectabilis, Gadmen, Val Ferret auf Erlen.
 — v. *elytr. fere nigr.*, Val Ferret mit der Stammart.
 — *fallax*, Gadmen, Simplon, Ferret, Zermatt, n. s.
 — *omalinus*, Val Ferret hfg., Saas s.
 — *scutellaris*, Bern. Obld. Ferret Juras.
 — *testaceus*, Siselen, Pieterlen a. Jura n. hfg., Büren, Bern gemein.
 — *praeustus*, Bätterkinden (Steck).
 — *brevicornis*, Ferret, Macugnaga. Zermatt, Gadmen hfg.
 — *aemulus*, Simplon, Macugnaga, Mattmark n. s., Gadmen a. Steingletscher s.
Geodromicus plagiatus, v. *nigrita*, Gadmen s.
Deliphrum tectum, Val Ferret.
Lesteva pubescens, Simplon s.
 — *Pandellei*, Findelsee üb. Zermatt.
 — *longelytrata*, Seeland hie und da, Bern. u. Sol. Jura bis z. Chasseralkamm stellenw. gemein.
 — *monticola* = *Sharpi*? Gadmen am Steingl. n. s., Ferret, Hoch-Jura s.
Olophrum alpinum, Val Piora n. s., Gadmen a. Steingl. s.
Lathrimäummelanocephalum, Gadmen s.
 — *atrocephalum*, Siselen in Schwämmen unt. Moos hfg.
Amphichroum canaliculatum, Gadmen im erst. Frühling auf *Salix*, später *Sorbus*blüthen gemein, Jura n. s.
 — *hirtellum*, Gadmen, Simplon, Ferret wie voriges.
Acidota crenata, Büren s. s.
Arpedium quadrum, Büren i. Aaregrien z. hfg.
 — *trogloodytes*, Val Ferret s. s.
Homalium excavatum, Gadmen, Sol. Jura i. Rossmist, s. s.
 — *caesum*, Gadmen, Seeland, Jura, Entremont, n. s.
 — *monilicorne*, Chasseral u. Ahornrinde in Anzahl.
 — *minimum*, Seeland, unter Eichen- u. Weisstannenr. hfg.

- Homalium planum*, Büren unter Eichenrinde, Val Ferret n. hfg.
 — *deplanatum*, Gadmen s.
 — *concinnum*, Siselen, Simplon, Entremont u. Ferret, Sol. Jura z. s.
 — *lineare*, Val Ferret s. s.
 — *vile*, Siselen unter Moos mehrmals.
 — *funebre*, Mattmark s. s.
- Anthobium florale*, Siselen (prim. off.) gemein, Sol. Jura, Waadtl. Berge.
 — *abdominale*, Gadmen, Entremont n. s., Sol. Jura.
 — *signatum*, Siselen (anem. nemor. u. Faulbaum) gemein; Simplon, Entremont n. s.
 — *limbatum*, Gadmen, Siselen, Berner- und Sol. Jura gemein, hier s. dunkel.
 — *atrum*, Entremont, Saas bis Mattmark, Jura z. s., Büren a. blüh. *Corrago* gem.
 — *primulae*, Sol. Jura (Wandfluh) mit folg. auf prim. off. hfg.
 — *robustum*, ebenda, Nesselboden am Weissenstein hfg., Büren 1 Ex.
 — *anale*, Gadmen bei 7500' an rhodod. gemein, Val Ferrez.
 — *longulum*, Simplon s. s.
 — *nitidicolle*, Simplon im Laquintal n. s., Macugnaga i. Gras.
 — *sparsum* Fauvel, Macugnaga.
 — *foveicolle*, Simplon, Macugnaga s., Mattmark.
 — *palligerum*, Macugnaga hfg. i. Gras a. d. Anza, Simplon, Ferret, Gurnigel (Bern. Voralpen) n. s.
 — *longipenne*, Gadmen n. s. auf blüh. sorb. aucup.
 — *stramineum*, " " " Val Ferret.
 — *pallens*, Simplon, Macugnaga hfg.
 — *rectangulum*, Simplon, Macugnaga n. s. s., Bern. Jura s.
 — *Marshami*, Gadmen, Entremont, Sol. u. Bern. Jura auf blüh. sorbus u. *crataegus* hfg.
 — *rhododendri*, Sol. Jura, auf ribes stellenw. n. s.
- Proteinus macropterus*, Büren, z. s.
 — *atomarius*, Siselen.
- Megarthrus depressus*, Gadmen, Sol. Jura n. s.
 — *denticollis*, Berner oberland s.
 — *sinuaticollis*, Siselen in Pilzen s.
- *hemipterus*, Gadmen, Seeland, nam. Siselen in Pilzen hfg.
Phloeob. clypeatum, Büren u. Moos s.
-
- Ctenistes palpalis*, Val Ferret n. s.
Trichonyx Märkelii, Siselen s.
Tyrus mucronatus, Gadmen unter Ahornr. bei 3—5000' n. s.
Bryaxis sanguinea, Siselen, Büren u. Steinen u. im Röhricht z. s.
 — *haematica*, Siselen, Büren u. Steinen.
 — *juncorum*, " " hier an sonn. Waldr. u. Moos z. hfg.
 — *impressa*, Büren im Aaregrien und Schilf s.
 — *Helferi*, Siselen, an salpeterhaltigen Mauern s.
- Bythinus puncticollis*, Büren u. Moos z. s.
 — *Curtisii*, Siselen, Büren u. Moos s.
 — *securiger*, " stellenweise hfg., Büren z. s.
 — *clavicornis*, Val Ferret s.
 — *nodicornis*, Büren, im Frühling u. Moos s.
 — *Burellii*, " " " " Moos s.
- Euplectes Fischeri*, Büren u. Eichenr. s. s.
 — *signatus*, Büren u. Eichenr. s. s.
 — *Karstenii*, Bern u. Platanenr., Siselen, Büren u. Moos, Steinen, Eichenr. n. s. s.
 — *nanus*, Siselen, Büren u. Moos. u. Buchenr. s.
 — *ambiguus*, Siselen, Büren u. Moos n. s. s.
- Trimium brevicorne*, Siselen z. s., Büren u. Moos gemein.
 — *?v. brevipenne*, Büren m. vorigem n. s.
- Scydmaenus Godarti*, Siselen s. s.
 — *collaris*, Siselen im Frühling z. s. u. Steinen, Büren u. Moos gemein.
 — *scutellaris*, Entremont.
 — *pusillus* Siselen im erst. Frühling u. Steinen hfg., Büren u. Moos s.
 — *elongatulus*, Siselen n. s.
 — *pubicollis*, Gadmen, s.
 — *denticornis*, Siselen, Büren s.
 — *hirticollis*, Büren u. Moos.
 — *Wetterhalii*, Siselen im erst. Frühlg. s. u. Steinen.
 — *Hellwigii*, " " " " s. u. Steinen.
 — *tarsatus*, Siselen im erst. Frühling s. u. Steinen.

- Cephenium thoracicum*, Seeland, hfg. u. Moos.
-
- Catops fuscus*, Gadmén, Siselen z. s.
 — *picipes*, Büren s.
 — *nigricans*, Siselen, Büren s.
 — *morio*, " " u. Moos n. s. s.
 — *tristis*, Chasseral s.
 — *alpinus*, Siselen an Fuchsaas hfg.
 — *neglectus*, Siselen s. s.
 — *fumatus*, Siselen n. s., Gadmén.
 — *Wilkinii*, Büren u. bes. Jura u. Laub hfg.
 — *antisotomoides*, Siselen s.
- Scapidium quadrimaaulatum*, Gadmén u. Ahornr. n. s.
- Platysoma frontale*, Büren s.
 — *angustatum*, Büren stellenw. hfg.
 — *lineare*, Büren u. Weisstannenr. s. s. Gadmén u. Ahornr.
- Hister merdarius*, Siselen z. hfg.
 — *funestus*, Siselen s.
 — *12striatus*, " hfg., Entremt. s.
 — *corvinus*, " z. hfg.
 — *helluo (modestus)*, Aarberg s. s.
 — *ruficornis*, Entremont s. s.
- Paromalus flavicornis*, Siselen n. hfg., Büren u. Weisstannenr. hfg.
- Deudrophilus punctatus*, Siselen u. Moos u. Steinen, n. s. s.
 — *pygmaeus*, Büren b. form. *rufa* z. hfg.
- Tribalus minimus*, Büren mit *Par. flav.* selten.
- Saprinus nitidulus*, Büren an Fellen äuss. gem.
 — *quadristriatus*, Büren im Aaregrien s.
- Gnathoncus rotundatus*, Siselen, Büren s.
 — *punctulatus*, Büren s. s.
- Phalærus*.
- Olibrus aeneus*, Gadmén.
 — *bicolor*, Meiringen gem.
 — *liquidus*, Siselen u. bes. Büren gem.
 — *affinis*, Siselen, Büren s.
 — *geminus*, " " "
 — *atomarius*, Büren u. Moos z. s.
- Brachypterus pubescens*, Gadmén, Ferret, Sol. Jura z. s.
 — *cinereus*, Ferret s.
- Ipidia quadrinotata*, Gadmén u. Ahornrinde s.
- Epuraea melina*, Gadmén, Simplon, Jura-höhe, hfg.
- *deleta*, Pieterlen, Solothurn hfg.
 — *neglecta*, Siselen, Büren, u. Eichenr. z. s.
 — *pygmaea*, Gadmén, Büren u. Ahorn- u. Eichenr. hfg.
 — *pusilla*, Gadmén, Ferret, Jura, Büren z. s.
 — *oblonga*, Büren, Ferret s. s.
 — *longula*, Saas s.
- Soronia punctatissima*, Seeland s.
- Thalycra fervida*, Büren s.
- Meligethes hebes*, Gadmén, Jura, Seeland bes. Büren hfg.
 — *symphyti*, Gadmén, Jura s., Büren a. *borrago* gem.
 — *obscurus*, Büren s.
 — *maurus*, Siselen, Büren, Ferret hfg.
 — *umbrosus*, Bern, Büren, Siselen, Pieterlen hfg.
 — *difficilis*, Siselen z. s.
 — " v. Kunzli, Siselen z. s.
 — *assimilis*, Büren s., Bern. Jura n. s. s.
 — *brunnicornis*, Sol. Jura s.
 — *haemorrhoidalis*, Sol. Jura s. s.
 — *murinus*, Siselen u. Moos s.
 — *coracinus*, Bern. Oberland.
 — *gagathinus*, Siselen u. Moos s.
- Cychramus quadripunctatus*, Seeland s., Bern hfg.
- Jys ferruginea*, Gadmén, Ferret hfg.
- Rhyzophagus depressus*, Gadmén, Büren hier u. Weisstannenr. s. gem; (auch u. Buchenrinde).
 — *perforatus*, Gadmén, Siselen, Büren s. s.
 — *nitidulus*, Gadmén i. höhern Bergwäldern n. s. s.
 — *dispar*, Gadmén, Jura, Büren gem.
 — *politus*, Seeland bes. Büren n. s.
 — *cribratus*, Gadmén, Ferret, z. hfg.
- Colydium elongatum*, Gadmén l Ex. u. Buchenrinde! Siselen u. Eichenrinde!
- Cerylon angustatum*, Büren hfg.
 — *impressum*, Büren s.
 — *fagi*, Büren s. s.
 — *deplanatum*, Seeland z. s.
- Brontes planatus*, Aarberg an Eichen hfg.
- Laemophloeus duplicatus*, Siselen z. s.
 — *pusillus*, Büren a. geschälten Eichen s.
 — *testaceus*, Visp an Birken s.

- Psammoechus bipunctatus*, Büren im Schilf s. s., (Liniger).
- Silvanus frumentarius*, Büren u. Dählenrinde s.
— *similis*, Büren u. Moos n. s.
- Monotoma conicicollis*, Büren b. form. *rufa* s. s.
— *picipes*, Entremont s.
- Mycetophagus 4pustulatus*, Gadmen hfg. u. Ahornr, Entremont.
- Dermestes Frischi*, Büren an Fellen s. gemein.
— *undulatus*, Büren an Fellen n. s. hfg.
— *holosericeus*, Sierre in Pityocampa-Nestern (Steck).
- Attagenus Schäfferi*, Gadmen, Entremont n. s.,
— *megatoma*, Entremont, Siselen.
- Syncalypta paleata*, Büren i. Aaregriens stellenw. hfg., Siselen.
— *Reichei*, Entremont s.
- Byrrhus striatus* Steff., Sol. Jura s.
— *pilula* var. *Dennyi*, Büren i. Aaregrien z. hfg.
— v. *aurovittata* = *Dennyi*, Gadmen, bes. am Steingl. n. s.
— *fasciatus*, Macugnaga, Mattmark, Ferret z. hfg.
— — v. *Dianae* etc., Ferret z. hfg.
— — v. *fasciata*, " " "
— — v. *bilunulata*, Mattmark (trans.).
— *pilosellus*, Macugnaga, Simplon s.
- Morychus modestus*, Macugnaga, Ferret, Mattmark n. s. s.
— *nitens*, Büren s.
- Limnichus versicolor*, am Bielersee s.
— *pygmaeus*, Büren im Aaregrien hfg.
- Georyssus substriatus*, Büren i. Aaregrien n. s.
- Parnus prolifericornis*, Seeland n. s.
— *striatopunctatus*, Wimmis a. d. Simmen, n. s.
— *viennensis*, Brig, Büren hfg.
- Heterocerus sericans*, Büren s.
- Aplidia transversa*, V. Vedro a. Simplons.
- Melolontha hippocastani*.
- Anomala oblonga*, Val Vedro z. hfg.
- Cetonia morio*, " " s.
- Poicilonota conspersa*, Gadmen s. s.
— *rutilans*, Bern i. d. Lindenalleen s.
— *decipiens*, Bielersee b. Erlach auf Erlen s.
— *festiva*, Brig.
- Ancylochira rustica*, Gadmen an Zäumen z. hfg.
- *punctata*, Gadmen s.
- Chrysobotrys chryso stigma*, Gadmen z. s., Val Ferret hfg.
— *affinis*, Gadmen s., Siselen an gefällten Eichen n. s.
- Anthaxia nitidula*, Seeland bes. bei Siselen auf weissen Rosen hfg.
— *nitida*, Siselen s.
— *sepulchralis*, Siselen, Ferret, s.
— *morio*, Gadmen bes. auf Hieracien hfg., Ferret z. hfg.
— 4 *punctata*, Gadmen, Entremont, Ferret, Bagne hfg.
- Agrilus biguttatus*, Siselen s.
— *coeruleus*, Gadmen auf Salix hfg.
— *viridis*, Gadmen s. hfg., Simplon, Ferret.
— v. *bicolor*, Siselen s.
— *hyperici*, Val Bagne s.
— *aurichalceus*, Martigny, Val Ferrets.
- Aphanisticus emarginatus*, Siselen s.
- Eucnemis capucina*, Siselen s.
- Adelocera lepidoptera*, Gadmen u. Rinde b. 5000' s. s.
— *fasciata*, Gadmen u. Rinde n. s.
- Elater cinnabarinus*, Gadmen s., Bern hfg., Büren n. s.
— *sanguinolentus*, Gadmen, Hagneck a. Bielersee s.
— *pomorum*, Gadmen, Seeland hfg.
— *crocatus* " s.
— *balteatus*, " n. s., Entremont Ferret.
— *erythrogonus*, " Solothurn. Jura, Büren s.
— *scrofa* " n. s., Ferret, Chasseral,
— *nigrinus*, " mit *balteatus* u. Rinden u. mit *Bructeri* auf Weiden, hfg.
- Betarmon bisbimaculatus*, Monbovon (Kt. Freiburg) s.
- Cryptorhynchus gracilis*, Gadmen a. Steingletscher n. s. s., Saas.
— *Meyerivar.*, Simplon hfg., Val Bagne, Macugnaga.
— *riparius*, Gadmen n. s., Chasseral.
— *tenuicornis*, Aarberg s., Büren n. s.
— *pulchellus*, Bielersee b. Hagneck, Büren s.
— *dermestoides*, Gadmen, Simplon, Zermatt, St. Bernhard, Val Bagne, Ferret hfg.
— v. 4 *guttatus*, St. Bernhard n. s.
— *meridionalis*, Büren im Aaregrien s.

- Cryptorhynchus minutissimus*, Entremont, Solothurn a. blüh. Gestr. hfg.
- Cardiophorus ruficollis*, Gadmen s.
- *rufipes*, Brig, Entremont, Ferret hfg. besonders auf Hippophaës.
 - *vestigialis*, Ferret, Visp.
 - *nigerrimus*, Entremont s.
 - *atramentarius*, Martigny, Ferret
 - *musculus*, Büren i. Aaregrien n. s., Macugnaga.
 - *cinereus*, Entremont n. s.
- Melanotus niger*, Val Ferret z. s.
- *castanipes*, Gadmen an Hausmauern u. Gebüsch, i. W. i. Nadelholzstöcken hfg., Entremont, Ferret, Sol. Jura.
 - *rufipes*, Val Ferret z. s., Macugnaga.
- Limonius cylindricus*, Gadmen, Siselen n. s., Ferret.
- *minutus*, Gadmen noch bei 4000' n. s.
 - *parvulus*, „ Seeland bes. Siselen hfg.
 - *Bructeri*, „ auf Weiden gemein, Entremont, Siselen 1 mal auf Reben.
- Athous tomentosus*, Macugnaga.
- *vittatus* v. *Oscayi*, Gadmen auf Salix, Simplon, Val Ferret hfg. auf Lärchen.
 - *longicollis*, Siselen in Gärten n. s.
 - *undulatus*, Gadmen auf Weiden n. s. s.
 - var. *bifasciatus*, „ „ s. s.
 - *Zebei*, Gadmen, Simplon, Ferret i. Frühling auf Erlen und Weiden, später auf Nadelholz.
- Corymbites pectinicornis*, Gadmen an Zäunen, Anfang Juni auf blumigen Wiesen in Anzahl schwärmend, Val Ferret.
- *cupreus* et v. *aeruginosus*, Gadmen sammt Uebergängen mit vorigem, Chasseral n. s.
 - *aeneicollis*, Gadmen, Simplon etc. hfg.
 - v. *signatus*, Bern n. s., Siselen.
 - *sulphuripennis*, Gadmen auf Salix z. hfg., Val Ferret, Simplon.
 - *affinis*, Gadmen auf jungen Eichen u. Arven n. s., Simplon s.
 - *quercus*, Büren i. Aaregrien, auf Weiden hfg.; die hellbraune Var. noch hfg.
 - *melancholicus*, Simplon auf Lärchen u. u. Steinen n. s. s.
- v. *simplonicus* Stierl. mit vorigem hfg., Ferret.
 - *amplicollis*, Val Ferret s. s.
 - *aeneus* a. *nitens*, Gadmen, Chasseral gemein.
 - b. *pedib. rufis*, Simplon, hier fast ausschl. Form.
 - c. *aeneus*, Gadmen n. hfg., Chasseral.
 - d. *germanus*, Gadmen hfg., Chasseral z. s.
 - e. germ. v. *violaceonigra*, Simplon.
 - *rugosus*, auch i. d. Berneralpen (Grimsel, Susten) gemein.
 - *latus* Clarens, z. hfg.
 - *bipustulatus*, Siselen auf Eichen s.
 - *cinctus*, Gadmen, Val Ferret z. s.
- Agriotes Laichartingi*, V. Vedro, Ferret s.
- *sobrinus*, Gadmen hfg., Seeland seltener.
 - *picipennis*, Innertkirchet (Oberld.) auf jungen Linden, Weissenstein (Sol. Jura) auf jungen Buchen hfg.
 - *gallicus*, Gadmen z. s., Siselen hfg.
- Sericosomus brunneus* et *fugax*, Gadmen auf Salix u. Sorbus gemein.
- *subaeneus*, Gadmen auf Erlen u. Weiden wie auf Tannen mit *subfuscus* n. s., Simplon, Berner- u. Sol. Jura.
- Adrastus axillaris*, Val Ferret, Gadmen.
- *lacertosus*, Gadmen, Simplon, Brig, Visp, Martigny, Büren, Bielersee hfg.
 - *pusillus*, Brig auf Hippoph. stellenw. hfg.
 - *humilis*, Siselen u. Jura s.
- Microcara testacea*, Bern, Büren.
- Cyphon coarctatus*, Seeland, bes. Siselen gemein.
- *Putoni*, Siselen s.
 - *Paykulli*, Siselen n. s. s.
 - *ruficeps*, „ „ „ „
 - *pallidulus*, Visp z. s.
 - *nitidulus*, Siselen.
 - *varabilis*, „ gemein.
- Helodes marginatus*, Büren s., St. Bern- hfg., Berneralpen.
- Eros aurora*, Gadmen hfg., Büren s.
- *minutus*, „ i. Septemb. s.
 - ? *Cosnardi* „
- Phosphaenus hemipterus*, Siselen n. s.
- Drilus ater*, Siselen s.

- Podabrus alpinus* et v. *lateralis*, Gadmen hfg., Chasseral, Siselen n. s.
 — v. *annulatus*, Simplon, Zermatt, Bagne, Entremont, Ferret hfg.
- Telephorus violaceus*, Gadmen mit abdominalis, d. s., Siselen s.
 — *albomarginatus*, Berneralpen s. hfg.
 — *pulicarius*, Simplon, Ferret n. s.
 — *fibulatus*, " " " "
 — *assimilis*, Gadmen z. s. auf Tannen, Büren, Entremont.
 — *fulvicollis*, Entremont, Macugnaga hfg.
 — *thoracicus*, Büren s.
 — *discoideus*, Pieterlen a. Jura s.
 — *rufus*, Seeland gemein.
 — *pilosus*, Gadmen n. s. auf Tannen, auch Chasseral.
 — *rufescens*, Gadmen n. s. auf Erlen u. Tannen, Simplon.
 — *fuscicornis*, Entremont, Macugnaga, Büren n. s.
 — *nigripes*, Gadmen, Simplon, Entremont hfg. bis gemein.
 — *femorialis*, Siselen s. s.
 — *elongatus*, Berneralpen u. Voralpen n. s., Simplon, Entremont hfg.
- Pygidia laeta*, Macugnaga s.
Malthinus frontalis, Entremont s.
Malthodes trifurcatus, Gadmen, Simplon, Saas, Macugnaga hfg.
 — *misellus*, Gadmen n. s., Büren s. hfg.
 — *sanguinolentus*, Büren, z. s.
 — *flavoguttatus*, Siselen hfg., Büren, Biel.
 — *guttifer*, Simplon, Ferret, Saas.
 — *maurus*, Ferret n. s.
 — *mysticus*, Büren.
 — *nigellus*, Entremont, Ferret.
 — *spathifer*, Jura, Ferret n. s.
- Malachius scutellaris*, Büren i. Aaregrien s.
 — *inornatus*, Entremont, Sierre.
 — *geniculatus*, Gadmen, Entremont, Ferret, Pieterlen a. Jura n. s.
 — *elegans*, Gadmen, Ferret s.
 — *pulicarius*, Siselen n. s.
- Attalus amictus*, Visp auf Hippoph. s., Siders hfg. i. Schilf.
 — *analis*, Entremont, Ferret s.
- Anthocomus sanguinolentus*, Büren i. Aaregrien auf Weiden u. Schilfblüthe gemein.
- Ebaeus perspicillatus*, Bern n. s. s.
 — *thoracicus*, Seeland n. s.
- Dasytes bipustulatus*, Grono i. Misox (Steck).
 — *coeruleus*, Gadmen, Chasseral bis über 5000' n. hfg., Siselen auf Salix hfg., Larve in Buchenholz.
 — *obscurus*, Gadmen, Simplon, Entremont, Macugnaga hfg.
 — *alpigradus*, Riffel b. Zermatt, Val Piora, Ferret hfg.
- Haplocnemus alpestris*, Gadmen, Simplon, Entremont, Saas z. hfg.
 — *serratus*, Siselen (1 Ex. i. Tannenhartz).
 — *nigricornis*, Entremont z. s.
 — *pini*, Entremont s.
 — *floralis*, " Macugnaga s.
- Danacaea nigritarsis*, Gadmen, Simplon, Entremont s. auf Nadelholz.
 — ? *montivaga*, Simplon, Ferret, n. s. s.
 — *denticollis*, Entremont, Ferret n. s.
- Tillus elongatus*, Münchenbuchs. (Bern).
Opilus domesticus, Gadmen s. s.
Clerus formicarius, Gadmen bis 5500', Entremont, Ferret, hier in sehr grossem Typus.
- Corynetes ruficornis*, Gadmen, Sol. Jura, Seeland.
 — *ruficollis*, Bern, Büren an Fellen gemein.
 — *rufipes*, Büren a. Aas.
 — *violaceus*, Siselen, Büren (1 Ex.).
- Laricobius Erichsonii*, Val Ferret z. s.
Hylecoetus dermestides, Gadmen n. s.
Hedobia imperialis, Simplon, Ferret, Macugnaga.
 — *regalis*, Büren s.
- Ptinus 6 punctatus*, Bern n. s.
 — *pusillus*, Gadmen, Bern u. b. Seeland n. s.
 — *subpilosus*, Siselen, Bern s.
 — *pusillus*, Büren s.
 — *bicinctus*, Büren hfg.
 — *quisquiliarum*, M. Moro s. s.
 — *latro*, Siselen s., Büren n. s., Entremont.
 — *bidens*, Gadmen, Siselen s., mit fur. n. s. s. (= raptor).
- Niptus hololeucus*, Bern, Büren, Siselen, überall s. verbreitend.
 — *crenatus*, Gadmen i. Sammlung), Simplon, Siselen gemein; Chasseral (an globosus)?
- Dryophilus pusillus*, Simplon, Ferret gemein.
- Priobium castaneum*, Gadmen s., Entremont, Ferret hfg.

- Priobium planum*, Bern. Jura a. Schirm-
tannen s. s.
- Anobium denticolle*, Siselen n. s.
— *pertinax*, Gadmen, Simplon, Ferret
n. s.
— *fulvicorne*, Siselen z. s.
— ? *rufipenne*, Siselen in Buchen-
holz s. s.
— *emarginatum*, Siselen s., Bern n. s.
— *immarginatum*, Val Ferret.
- Xestobium tessellatum*, Gadmen, Siselens.
— *velutinum*, Siselen in Buchen-
holz s. s.
- Liozoum abietis*, Gadmen, Simplon,
Ferret, Jura n. s.
— *abietinum*, Berner Jura hfg.
— *molle*, Gadmen, Val Bagne, Ferret,
Bern n. s.
— *pini*, Entremont n. s., Sol. Jura s.
— *longicorne*, Siselen i. Buchen-
holz s. s., Saas s.
- Cis rugulosus*, Gadmen an Ahornstäm-
men n. s. (id boleti).
— *micans*, Gadmen, Büren hfg.
— *nitidus*, Siselen u. Eichenr. s.
— *glabratus*, " " " n. s. s.
— *Jacquemarti*, Gadmen s.
— *alpinus*, Gadmen an Ahornstämmen
n. s. s., Büren s.
— *festivus*, Gadmen s.
- Octotemnus glabriculus*, Gadmen hfg.
- Platydemia violacea*, Siselen u. Eichenr.
mehrfach.
- Gnathonus cornutus*, Wimmis (Li-
niger).
- Alphitobius diaperinus*, Bern in
Menge erzogen (Jenner), (mit oder
anstatt *Tenebrio*?)
- Uloma culinaris*, Gadmen i. Tannen-
stöcken hfg., Siselen u. Eichenr. s.
- Hypophloeus castaneus*, Gadmen unt.
Ahornr. s., Siselen.
— *linearis*, Gadmen s. s.
- Cistela ceramboides*, Gadmen, Simplon
auf Gesträuch u. Lärchen s.
- Isomira hypocrita*, Gadmen u. bes.
Simplon, Entremont hfg., Ferret.
- Eryx ater*, Siselen s.
- Podonta nigrita*, Gadmen s.
- Omophlus lepturoides*, Leukerthal hfg.
- Salpingus ater*, Riffel b. Zermatt, Büren s.
— *mutilatus*, Entremont, Jura s. s.
— *foveolatus*, " Ferret, n. s.
Chasseral.
- Rhinosimus planirostris*, Gadmen, Macu-
gnaga s.
- *ruficollis* L., Gadmen an Ahorn-
stämmen n. s.
— *viridipennis*, Chasseral an Ahorn-
stämmen, Büren z. s.
- Orchesia minor*, Ferret n. s.
- Dircaea 4 maculata*, Bern i. Tannen-
stöcken stellenw. n. s., (v. H. Benteli
wieder aufgefunden).
— *livida*, Gadmen, mit *dermestoides*
u. *Molorch minor*, an Klafterholz
n. s. s.
- Marolia variegata*, Macugnaga s.
- Pyrochroa coccinea*, Gadmen hfg., Chasse-
ral, Seeland s.
— *rubens*, Siselen, Neuenburg. Jura,
Entremont hfg.
- Mylabris flexuosa*, Saas hfg. (Benteli
u. a.).
- Pyrochroa pectinicornis*, Gadmen n. s.
- Notoxus monoceros*, Visp auf *Hyppo-*
phae, Lausanne (Seeufer), Entre-
mont).
— *brachycerus*, stellenw. n. s.
— *cornutus*, Entremont hfg., Büren.
- Anthicus luteicornis*, ? Lausanne a. See-
ufer gemein.
— *hispidus*, Siselen hfg.
— *antherinus* " s.
— *unicolor*, Büren l. Aaregrien z. s.
- Mordella 6 punctata*, Bern, (Benteli,
Steck).
— *abdominalis*, Gadmen, Entremont,
Seeland n. s.
— *lateralis*, Siselen auf *Spiräen* n. s.
— ? *grisea*, Entremont s.
— *micans*, " "
- Anaspis monilicornis*, Gadmen, Entremt.
— *Geoffroyi*, Siselen s.
— *ruficollis*, Simplon z. s.
— *thoracica*, Siselen n. s.
— *flava*, Entremont gemein.
- Silaria latiuscula*, Gadmen, Ferret hfg.
— *bicolor*, Macugnaga, Visp n. s.
- Meloë autumnalis*, Gadmen n. s.
— *brevicollis*, Gadmen n. s.
— *rugosus*, Seeland z. s.
- Calopus serraticornis*, Gadmen, Macu-
gnaga s.
- Anoncodes adusta*, Büren a. Oenothe-
ra s.
- Dryops femorata*, Wimmis i. Berner
Oberland (Liniger).
- Oedemera coerulea*, Siselen n. s.
— *tristis*, Gadmen auf *petasites*, Entre-
mont, n. s.

- Mycterus curculionoides*, Visp s.
Bruchus cisti, Gadmen, Ferret s.
 — *debilis*, Visp s.
 — *granarius*, noch bis hoch in's Entremont u. auf den Jurakamm.
 — *pubescens*, Seeld., Siselen u. Büren auf Spiräen u. Rosen gemein.
Urodon rufipes, Entremont, Büren gem.
 — *suturalis*.
Brachytarsus scabrosus, Siselen s.
 — *varius*, Gadmen, Siselen, Jura n. s.
Tropideres niveirostris, Siselen s.
Platyrhinus latirostris, Gadmen, Siselen u. Eichenr.
Anthribus albinus, " " n. s. s.
Liophloeus aquisgranensis, Meiringenmäher auf Weiden u. Wegen n. s. s.
 — *ovipennis*, Büren auf d. Strasse neben sumpfigen Wiesen s. hfg.
 — *geminatus*, Gadmen n. s.
 — *cyanescens*, Clarens.
 — *pulverulentus*, Büren i. Aaregiens.
 — *alpestris*, Val Ferret n. s.
 — *rotundicollis*, Berner oberld. u. Waadtl. (Freiburger) Alpen s.
Barynotus obscurus, Gadmen z. s.
 — *moerens*, Gadmen, Jura n. s.
Strophosomus faber, Simplon s.
Platytarsus hirsutululus, Büren bei form. r. s. s.
Eusomus ovulum, Gadmen s.
Brachyderes incanus, Brig, Visp, Simplon, Entremont, Ferret gemein.
Sitones puncticollis, Entremont s.
 — *tibiellus*, Siselen auf Sumpfwiesen n. s. s.
 — *lateralis*, Büren s.
 — *callosus*, Val Ferret n. s. s.
 — *inops*, Büren, Walliser Alpen n. s.
Metallites mollis, Seeland (Siselen u. Büren) wie im Jura gemein auf Tannen.
Polydrusus fulvicornis, Gadmen wie Simplon, Entremont u. Ferret gemein.
 — *paradoxus*, Simplon hfg., doch mehr auf Nords.
 — *impressifrons*, Val Ferret, Zermatt, Simplon gemein.
 — *pterygomalis*, Siselen a. Eichen hfg.
 — *flavovirens*, " " "
 — *corruscus*, Büren a. Weiden s. gem.
 — *cervinus*, Gadmen wie anderwärts bis zu 6000'.
 — *amoenus*, Gadmen, Simplon, Ferret n. hfg.
Tanymecus palliatus, Büren n. s. s.
Chlorophanus viridis, Gadmen hfg.
 — *pollinosus*, Visp auf Hippophaes Büren i. Aaregrien s. gemein.
 — *graminicola*, ebenda.
Otiorhynchus fuscipes v. *haematopus*, Gadmen a. Steingl.
 — *substriatus*, Chasseral s. auf Tannen mit *tenebricosus*.
 — *amplipennis*, Simplon gemein auf Lärchen u. Erlen (immer mit schw. Beinen), Macugnaga hfg. (meist mit rothen Beinen).
 — *scabripennis*, Gadmen u. Berner oberld. auf Haseln n. s.
 — *unicolor* v. *memnonius*, Gadmen n. s.
 — *ligneus*, Büren s.
 — *chrysocomus*, Simplon, Val Ferret u. nam. Gadmen gemein.
 — *porcatus*, Seeland, Siselen u. Büren u. Steinen u. Moos gemein.
 — *subcostatus*, Val Ferret s.
 — *uncinatus*, Büren an Waldrändern u. Moos s.
 — *picipes* v. *Cheovolati*, Val Ferret n. s.
 — *varius*, Gadmen n. hfg., St. Bernhard, Val Ferret u. bes. Macugnaga hfg.
 — *difficilis*, Simplon äuss. gemein auf Erlen, Lärchen wie auch in Macugnaga.
 — *lepidopterus*, Gadmen i. Frühling auf Weiden, Erlen, z. auf Fichten hfg. wie auf Simplon.
 — *funicularis*, Val Ferret, Macugnaga n. s. s.
 — *sulcatus*, Seeland nam. Siselen in sonnigen Lagen n. s.
 — *helveticus*, Simplon, Zermatt, Entremont u. Ferret n. s.
 — *nubilus*, auch in den Berneralpen (Grimsel, Susten), ab. n. s. hfg.
 — *subrotundatus*, Val Ferret s. s.
 — *Gestleri*, Chasseral s. s.
 — *muscorum*, Simplon, Ferret u. bes. St. Bernhard hfg.
 — *pauxillus*, Gadmen, Simplon, St. Bernhard, Ferret n. s.
Peritelus griseus, Entremont, Ferret, Seeland, hfg.
Omius pellucidus, Siselen hfg. in wasser-gefüllten Wagengleisen d. Waldwege.

- Omius violatus*, Siselen, sltnr.
 — *brunnipes*, Büren s.
 — ? *oblongus*, Sol.- u. Berner Jura s.
Trachyploeus alternans, Ferret n. s. } ?
 — *scabriculus*, Gadmen s. }
 — *squamulatus*, Ferret n. s. } ?
 — *ventricosus*, „ „ „ }
Phyllobius mus, Visp auf Hippophae s. gemein.
 — *sinuatus*, Büren s.
 — *artemisiae* Desbr., Entremont, Ferret n. s.
 — *uniformis*, nur in Pieterlen a. Jura auf *Carpinus* u. bes. *sanguisorba* Knöpfen in Menge, (fehlt d. Bern. Mittelland u. übr. Seeland).
 — *pomoniae*, Entremont, Ferret s.
 — *viridicollis*, St. Bernhard, Ferret äuss. gemein, Chasseralgipfel u. Weissenstein n. s.
Tropiphorus mercurialis, Gadmen, St. Bernhard, Ferret, Zermatt, ab. nirg. hfg.
 — *globatus*, Gadmen i. Frühling u. Zaunlatten s.
Dichotrachelus sulcipennis, Gornergrat b. Zermatt s.
 — *Rudeni*, Gadmen am Oberthalgl., Grimsel, Simplon.
Liosoma ovatum, Gadmen, Chasseral s.
Plinthus caliginosus, Chasseral, bes. ob St. Imier n. s.
Alophus triguttatus, Gadmen, Entremont, Ferret, Chasseral, Siselen nirgends hfg.
Hypera oxalis, Entremont s.
 — *ovalis*, Gadmen u. Berneroberld., Chasseral n. hfg.
 — *comata*, Entremont s.
Cleonus turbatus, Entremont s.
 — *albidus*, Entremont s.
 — *segnis*, Visperthal s.
 — *cinereus*, Entremont z. s.
 — *alternans*, Simplon s.
 — *roridus*, Zermatt s.
 — *grammicus*, Entremont s.
 — *sulcirostris*, Martigny.
Larinus sturnus, Gadmen z. hfg.
 — *turbinatus*, Siselen auf Disteln hfg.
 — *planus*, „ „ „ „
 — *carlinae*, „ „ „ „
Lixus bardanae, Siselen s.
Hylobius pineti, Simplon, Entremont n. s.
Pissodes piceae, Bern hfg., Seeland sltr.
 — *strobyli*, Bern, Büren, Ferret.
- *Harcyniae*, Gadmen, St. Bernhard n. s.
 — *piniphilus*, Val Ferret n. s.
Grypidius brunnirostris, Wimmis im Berneroberld., Büren s. s.
Erirehinus bimaculatus, Büren im Aaregrien i. d. Samenkolben v. *typha* hfg., Bielersee b. Hageneck s.
 — *infirmus*, Büren i. Aaregrien auf Weiden gem.
Dorytomus variegatus, Siselen n. s. s.
 — *costirostris*, Gadmen n. s., Siselen u. Moos, i. Frühling auf *salix capr. h.*
 — *flavipes*, Entremont u. Ferret s.
 — *agnathus*, Val Ferret hfg.
 — *villosus*, Gadmen, Siselen s., Büren.
 — *tortrix*, Siselen s., Gadmen, Entremont n. s.
 — *filirostris*, Büren n. s.
 — *dorsalis*, Siselen, Büren, Bern n. s.
 — *affinis*, Siselen s.
 — *pectoralis*, Ferret s., Büren n. s. s.
 — *majalis*, Entremont, Ferret hfg.
 — *salicis*, Büren im Aaregrien an blüh. Weiden n. s.
 — *agnathus*, Büren i. Aaregrien sltnr.
 — *minutus*, „ „ „ „ s. s.
 — *punctator*, Entremt., Ferret, Büren n. s.
 — *nebulosus*, Büren s.
Hydromus alismatis, Büren im Aaregrien s.
Bagous lutulentus, Büren im Aaregrien n. s.
 — *lutosus*, Büren s.
Apion cerdo, Siselen auf *vicia silo* hfg.
 — *obtusum* Desbr., Entremont u. Ferret n. s.
 — *pulchellum*, Pieterlen a. Jura s. s.
 — *rubens*, Gadmen, Simplon, Siselen s.
 — *sanguineum*, Siselen s. s.
 — *carduorum*, Siselen s.
 — *penetrans*, „ „
 — *elegantulum*, Ferret z. s.
 — *vorax*, Siselen s., Ferret n. s.
 — *punctigerum*, Siselen hfg.
 — *platalea*, „ n. s. u. Moos.
 — *morio*, „ „ „ „
 — *columbinum*, Ferret, Büren s. s.
 — *malvae*, Siselen s.
Rhynchites cupreus, Gadmen auf *salix* u. bes. *sorbus* gemein, Seeland sltr.
 — *aeneovirens*, Siselen z. s.
 — *alliariae*, „ s.
 — *germanicus*, „ n. s.

- Rhynchites pauxillus*, Büren n. s. s.
 — *ophthalmicus*, Büren z. s.
 — *tristis*, Gadmen i. schattigen Bergwäldern an jungen Ahornen n. s.
- Rhinomacer attelaboides*, Büren s.
- Magdalinus violaceus*, Bern, Büren hfg., Gadmen n. s.
 — *frontalis*, Simplon n. s., Entremont, Chasseral.
 — *cyanipennis* Desbr., an Heideni? Simplon n. s., Zermatt, Macugnaga s.
 — *asphaltinus* (verus), Gadmen n. s. s.
 — *phlegmaticus*, Büren s.
 — *carbonarius*, Bern s.
 — *rufus*, Brig auf Fichten n. hfg.
 — *barbicornis*, Siselen s.
- Balaninus glandium*, Siselen n. s. s., Ferret.
 — var., Grimsel im Todtensee, in 6 übereinst. Exempl.
 — *tesselatus*, Siselen, Entremont n. s.
 — *villosus*, Büren s.
- Anthonomus varians*, Siselen s. s.
 — *ulmi*, Entremont s.
 — *pedicularius*, Jura hfg.
 — *rufus*, " s. s.
 — *pyri*, Siselen s.
- Orchestes rufus*, Entremont, Ferret n. s. Büren s.
 — *ilicis*, Siselen s.
 — *tomentosus*, Berner oberl. d. s.
 — *rusci*, Entremont z. s.
 — *decoratus*, Entremont n. s.
 — *stigma*, Gadmen, Siselen z. hfg.
 — *saliceti*, Simplon, Entremont, Ferret hfg.
- Ellescus bipunctatus*, Gadmen, Entremont n. s.
- Tychius albovittatus*, Büren s. s.
 — *squamulatus*, Pieterlen a. Jura s.
 — *junceus*, Pieterlen a. Jura n. s.
- Sibynus canus*, " " " n. s.
 — *pellucens*, " mit vorigem s.
- Cionus Olivieri*, Entremont n. s.
 — ? *ungulatus*, " s.
 — *pulchellus*, Siselen, Büren z. hfg.
 — *blattariae*, Büren, Val Vedro am Simplon gemein.
- Nanophyes globulus*, Büren n. s. s.
- Gymnetron spilotus*, Münchbuchs. (Bern) n. s.
- Orobitis cyaneus*, Siselen a. sonn. Mauern n. s.
- Acalles Aubei*, Büren s.; *camelus* Jura.
- Ramphus flavicornis*, Entremont n. s.
- Mononychus pseudacori*, Seeland bes. bei Siselen gemein, selbst auf Garten Iris.
- Coeliodes ruber*, am Jura s.
 — *exignus*, Macugnaga, Simplon hfg.
- Centorhynchus assimilis*, } auch i. Entremont.
 — *Erysimi*, }
 — *cochleariae*, i. höhern Jura.
 — *topiarius*, Büren s. s. u. Moos.
 — *viduatus*, Siselen im Frühling u. Steinen n. s.
 — *litura*, Siselen s. s.
 — *asperifoliarum*, Siselen, Entremont n. s.
 — *campestris*, Büren i. W. u. Moos gemein.
 — *chrysanthemi*, Bern, Siselen s.
 — *arquatus*, Gadmen, Siselen s.
 — *vidnatus*, Siselen n. s. s.
 — *raphani*, Büren auf borrago hfg.
 — *quadridens*, Gadmen noch b. 4000' hfg.
 — *rapae*, Siselen s.
 — *cyanopterus*, Bern. Jura i. lichten Wäldern b. 4000'.
 — *cyanipennis*, Bern. Jura, Ferret s.
 — *setosus*, Seeland n. s. u. Moos.
 — *parvulus*, Entremont hfg.
 — *syrites*, Ferret n. s., Büren.
- Centorhynchideus floralis* noch i. Entremont.
 — *pulverulentus*, Siselen, Büren s.
- Rhitydosomus globulus*, Büren s.
- Litodactylus leucogaster*, " n. s.
- Phytobius granatus*, Büren im Aaregrien s.
 — *4 tuberculatus*, Lausanne a. Seeufer n. s.
 — *velaris*, Büren im Aaregrien s.
 — *Waltoni*, Büren n. s. s., Siselen s. s.
 — *comari*, Büren n. s. s.
- Rhinoncus castor*, Siselen, Büren s. s.
 — *bruchoides*, Gadmen gemein, Seeland sltnr.
 — *inconspectus*, Lausanne a. Seeufer hfg., Büren s.
 — *subfasciatus*, Seeland z. s.
- Baridius artemisiae*, Siselen s.
 — *coerulescens*, " auf Kohl s.
 — *chlorizans*, " s.
 — *Abrotani*, Büren a. reseda s. gem.
- Rhyncolus chloropus*, Gadmen i. faulen Stöcken hfg.
 — *truncorum*, Büren i. Häusern n. s.

- Hylastes cunicularius**, Gadmen s.
 — *linearis*, Entremont s.
 — *opacus*, Gadmen.
 — *decumanus*, Gadmen s. s.
- Dendroctonus micans**, Münchenbuchsee (Bern), Jura s.
- Polygraphus pubescens**, Gadmen, Siselen z. s.
- Xyloterus domesticus**, „ n. s.
- Chryphalus fagi**, Siselen, stellenw. hfg.
 — *piceae*, Büren n. s.
- Xyleborus monographus**, Seeland bes. Siselen hfg.
 — *dispar*, noch bei Gadmen.
 — *Saxesenii*, Seeland n. hfg.
- Dryocoetes autographus**, Gadmen u. Tannen — bes. ab. Buchenr. gemein; Siselen, Büren (Weisstannenr.) hfg.
 — *villosus*, Siselen u. Eichenr. s.
- Pytiophtorus Lichtensteini**, Gadmen s.
- Tomicus cembrae**, Gadmen n. s.
 — *suturalis*, Siselen hfg. (vertritt dort *laricis*).
 — *bispinus*, Siselen gemein.
 — *bidens*, Bern, Siselen s.
- Scolytus pruni**, Münchenbuchsee.
 — *rugulosus*, Siselen n. s.
- Platypus cylindrus**, Siselen z. s.
- Prionus coriarius**, Seeland n. s., Abends an Waldrändern schwärmend.
- Tragosoma deparium**, Gadmen s. s.
- Cerambyx cerdo**, Seeland bes. b. Täuffelen n. s. s.
- Purpuricenus Köhleri**, Val Vedro am Simplon.
- Rosalia alpina**, Gadmen.
- Rhopalopus hungaricus**, Gadmen.
- Callidium castaneum**, Val Ferret s.
 — *rufipes*, Siselen s.
- Semanotum coriaceum**, Ferret.
- Tetropium fuscum**, Gadmen mit *luridum* an Klafterholz n. s.
 — *femoratum*, Gadmen mit *luridum* an Klafterholz z. s.
- Criocephalus rusticus**, Gadmen, Büren s.
- Clytus detritus**, Seeland b. Ferenbalm.
 — *arcuatus*, Seeland b. Siselen hfg.
 — *lama*, Gadmen, Simplon, hier n. s. s.
 — *verbasci*, Visperthal z. gemein, noch in Gadmen.
 — *sulfureus*, Visperthal s.
 — *massiliensis*, „ Siselen s.
 — *mysticus*, Siselen n. s.
- Obrium brunneum**, Jura b. Twann auf Spiräen z. s.
- Stenopterus rufus**, Visperthal hfg., Siselen s.
- Molorchus minor**, Gadmen a. fr. Klafterholz gemein, Münchenbuchsee in Tannenholz, Seeland bes. Siselen auf Spiräen hfg.
- Necydalis major**, Visperthal s. (Steck).
- Astynomus atomarius**, Büren s. s.
- Acanthoderus varius**, Gadmen a. Buchenstöcken z. hfg.
- Pogonocherus ovatus**, Büren s., Jura n. s.
 — *fasciculatus*, Gadmen s.
 — *hispidulus*, Gadmen, Siselen s.
 — *dentatus*, Jura b. Pieterlen s.
- Exocentrus lusitanus**, Siselen s.
- Mesosa curculionoides**, Büren s.
 — *nubila*, Siselen in Buchenholz, Bern. Jura s.
- Agapanthia lineatocollis**, Siselen s.
 — *angusticollis*, Büren, n. s. auf Disteln.
 — *micans*, Gadmen s.
- Anaerea carcharias**, Bern auf pop. trem. stellenweise n. s., Gadmen.
- Saperda scalaris**, Gadmen auf Gesträuch u. frisch entw. a. kranken Kirschbäumen n. s., Macugnaga, Ferret.
- Stenostola ferrea**, Gadmen, Siselen, Val Ferret, Büren s.
- Oberea oculata**, Gadmen n. s., Büren.
 — *pupillata*, „ auf *lonicera* n. s., Siselen s.
 — *linearis*, Siselen auf Haseln s.
- Phytoecia cylindrica**, Gadmen z. s., Ferret.
- Opsilia molybdaena**, Siselen s.
- Rhagium mordax**, Seeland nam. b. Siselen an Eichen u. Buchen n. s.
 — *bifasciatum*, Seeland auch u. Buchen u. Eichenr.
- Toxotus cursor** Var. ♀ *nigra*, Gadmen b. 6000'.
 — Var. ♂ et ♀ *elytris totis flavis*, Gadmen.
- Pachyta interrogationis** } St. Bernhard,
 v. *curvilineata*, } Ferret u. bes.
 — v. *ebenina*, } Simplon u.
 Macugnaga auf *Geranium silvat.* hfg.
- *clathrata* v. *nigrescens*, Simplon n. s.
- Acmaeops pratensis**, Val Ferret n. s.
 — *septentrionis* = *simplonica* Stierl. Gadmen s. s.
 — *trifasciata*, Simplon, Val Ferret n. s.
- Strangalia 4 fasciata**, Gadmen, Ferret n. s. Siselen s.
 — *revestita*, Siselen s.
 — *attenuata*, Seeland. Jura b. Biel u. Val Vedro gemein.
- Leptura virens**, Gadmen z. hfg.
- Vadonia livida**, Martigny, Val Vedro gemein, auch a. Jura b. Biel hfg.

- Anoplodera sexguttata*, Jura b. Traun s.
Pidonia lurida, Gadmen auf sorbus hfg.
Grammoptera analis, Siselen s. s.
 — *ustulata*, Jura b. Pieterlen auf *crataegus* s.
Donacia sagittariae, Gümmenen (Bern) n. s., Büren s.
 — *impressa*, Büren gemein.
 — *nigra*, Martigny n. s.
 — *linearis*, Seeland i. Moosgebiet an Iris hfg.
Zeugophora scutellaris, Büren, Ferret s.
 — *flavicollis*, Gadmen n. hfg., Entremont, Zermatt auf Weiden u. Erlen gemein.
 — *frontalis*, Seeland i. Lattrigen-Wald auf pop. trem. n. s. s.
Lema puncticollis, Siselen, Büren u. Moos s.
 — *Erichsonii*, Siselen, Büren u. Moos s., Ferret, Macugnaga.
 — *flavipes*, Siselen s. s.
 — ? *gallaeciana* Heyd., Simplon s.
Crioceris brunnea, Gadmen s., Seeland a. Zihlkanal hfg.
 — *alpina*, Gadmen s. s.
 — *dedecastigma*, Seeland b. Kerzers z. s.
Clythra tridentata, Entremont s.
 — *longimana*, Simplon, Bagne, Ferret hfg.
 — *laeviuscula*, Macugnaga n. s., Saas.
 — *cyanipennis*, Macugnaga n. s.
Clythra scopolina, Gadmen s., Entremont hfg.
Chrysochus pretiosus, Val Vedro hfg.
Pachnophorus arenarius, Entremont hfg.
 — *villosus*, Entremont z. s.
Cryptocephalus imperialis, Jura b. Biel u. Pieterlen, Entremont, Val Vedro n. s. s.
 — *Coryli*, Gadmen z. hfg.
 — *variegatus*, Saas hfg. a. *tamarix*, Hagneck s.
 — *variabilis*, Gadmen hfg, Entremont, Siselen s.
 — *interruptus*, Gadmen, Leukerbad, Entremont s.; Seeland a. Bielersee auf Strandweiden hfg.
 — *fasciatus*, Jura (Bern. u. Sol.), Entremont, Ferret n. s.
 — *hydrochaeridis*, Gadmen, Simplon, Macugnaga hfg.
 — *rugulipennis*, Gadmen n. s., Simplon.
 — *villosulus*, Val Vedro n. s.
 — *pini*, Gadmen s.
 — *nitidulus*, Gadmen hfg.
 — *marginellus*, Jura b. Pieterlen, Macugnaga.
 — *janthinus*, Siders s.
 — *marginatus*, Entremont s.
 — *flavescens*, Berneroberld. b. Wimmis s.
 — *v. frenatus*, Berneroberland, Seeland b. Aarberg hfg., Büren n. s.
 — *salicis*, Val Vedro s.
 — *bipunct. v. lineola*, Gadmen, Entremont s.
 — *bilineatus*, Jura b. Diesse s.
 — *minutus*, Entremont s.
 — *gracilis*, Seeland b. Kerzers s.
Stylosomus ? ilicicola, Ferret s. s.
Pachybr. hippophaës, auch bei Büren an gewönl. Weiden gem.
Timarcha metallica, Gadmen hfg., Chasseral n. s.
 — *globosa*, Gadmen s., Chasseral hfg.
Chrysomela Göttingensis, Sol. Jura s.
 — *haemoptera*, Siselen z. s., Berner- u. Sol. Jura bei 4800' hfg.
 — *marginalis*, Entremont n. s. s.
 — *carnifex*, Ferret s.
 — *limbata*, Simplon s.
 — *marginata*, Gadmen n. s.
 — *var. minor splendidior*, St. Bernhard n. s.
 — *menthastri*, Val Vedro, Misox n. s.
 — *cerealis* (Var.?), St. Bernhard, Ferret.
 — *fucata*, Seeland z. hfg.
 — *duplicata*, Büren s.
 — *geminata*, Gadmen n. s.
Orina luctuosa, Macugnaga z. s. (Die Angaben aus den übrigen Schweizeralpen beruhen auf Verwechslung mit *venusta*).
 — *v. smaragdina* W., Simplon in Mehrzahl.
 — *decora*, Simplon (durch Anderegg erh.), etwas dunkler blau als d. schlesischen Exempl.
 — *v. aenescens*, Gadmen a. Steingl., mattgrün mit schwacher Binde.
 — *bifrons*, Gadmen von 4000' an, Val Ferret, z. hfg. grün, blau bis schwach messingf.
 — *Var. b.*, Simplon i. Laquinthal; kupferf.
 — *superba*, Gadmen, Ferret, Simplon, Macugnaga n. s. Die Exempl. d. Berneralpen meist mit schwacher Messingbinde, nicht purpurstreifig.
 — *gloriosa*, Berneroberland u. Walliseralpen überall hfg.

- Orina v. venusta*, Gadmen, Simplon n. s.
 — *v. nigrina*, „ z. hfg., Simplon seltnr.
 — *vittigera*, Gadmen, Simplon, Ferret u. Macugnaga (grün, blau bis trüb kupferig) s. hfg.
 — *nivalis*, Gadmen v. Thal b. z. Steingletscher s.
 — *v. lugubris* W., Gadmen a. Steingletscher s. s.
 — *v. ignita*, Gadmen auf alnus viridis u. a. Steingl. n. s., Simplon, Ferret s.
 — *speciosissima*, Gadmen, Entremont, Ferret i. d. Waldzone hfg.
 — *v. troglodytes*, Gadmen a. Steingl., Hohenstollen, Grimsel, M. Moro z. hfg. Die Ex. d. Süds. a. M. Moro viel glänzender, stärker punktirt u. grösser als die d. Nords. u. d. Berneralpen. (Var.)
 — *virgulata*, Bündtneralpen i. Val Fain, Gadmen a. Steingl. n. selten. Mattblaue, tiefblau u. kupfr. var. s.
 — *tristis*, Gadmen, Entremont, Ferret mitunter s. hfg., (blau, mattgrün bis schwarz).
 — *elongata*, Simplon an Wasserleitungen gemein, St. Bernhard hfg., (dicht runzlig punktirt).
 — *frigida* Weise (*monticola*), Gadmen a. Steingl., Hohenstollen, Grimsel s. hfg., (grün bis tiefschwarz).
 — *Peirolerii*, Macugnaga i. Val Quarazza.
 — *melancholica*, Gadmen a. Steingl. u. i. d. Trift, St. Bernhard s.
Lina lapponica, Siselen s. s. (Obers. blau).
Gonioctena rufipes, Siselen n. hfg., Entremont hfg.
 — *v. confluens*, Halssch. grd. m. breitem, schwarzem Strich, Ränder d. Flgd. schwarz übergossen), Entremont, Ferret n. s.
 — *flavicornis*, Seeland (i. Lattrigenwald) u. Sol. Jura.
 — *v. nigra*, Seeland mit der Stammart, doch ohne Uebergänge.
 — *triandriae*, Seeland bes. b. Gerlafingen a. Bielersee auf Strandweiden s. hfg.
 — *v. elytr. impunctatis* } ebenda, o.
 — *v. „ nigris* } Ueberg.
 — *nivalis*, St. Bernhard, Ferret, Simplon, Grimsel, Susten n. s.
 — *5 punctata*, Macugnaga hfg.
- Gastrophysa alpina*, St. Bernhard z. s.
Phaedon carniolicus, Berner- u. Sol. Jura s.
 — *pyritosus*, Lausanne a. Seeufer hfg.
 — *sabulicola*, Büren n. s.
 — *salicinus*, St. Bernhard, Ferret gemein.
Phratora major, Entremont, Ferret, Bagne, Zermatt, Simplon, Gadmen, hfg.
 — *vulgatissima*, Siselen hfg.
Prasocuris Phellandrii, Siselen s.
 — *beccabungae*, Seeland v. Erlach b. Büren n. s.
Adimonia sanguinea, Entremont hfg.
Galleruca viburni, Gadmen, Entremont, Jura, Seeland hfg.
 — *crataegi*, Gadmen, Entremont s.
 — *nymphaeae*, Siselen n. s.
 — *tenella*, Siselen z. s.
Malacosoma lusitanicum, Simplon gemein, Entremont.
Agelastica halensis, Oberhasli, Bern hfg., Seeland, Jura, Entremont sltnr.
Luperus circumfusus, Entremont, Ferret hfg.
 — *nigripes*, Entremont, Ferret hfg.
 — *betulinus*, Gadmen, Ferret, Seeland n. s.
 — *viridipennis*, Gadmen wie Simplon Entremont u. Ferret gemein.
Crepidodera rhaetica, Gadmen a. Sustenpass n. s.
 — *femorata*, Ferret n. s.
 — *melanostoma*, Ferret s.
 — *cyanescens*, Simplon, Macugnaga s.
 — *fulvicornis*, Seeland gemein.
 — *versicolor*, „ Jura b. Pieterlen n. s.
 — *metallica*, Entremont z. hfg.
 — *chloris*, Seeland hfg.
Graptodera ampelophaga, Büren im Aaregrien hfg.
 — *eruae*, Bätterkinden (Steck) auf Eichen n. s.
 — *hippohaës*, Visp hfg.
 — *helianthemi*, Gadmen n. s., Siselen s. Ferret hfg.
 — *montana*, Berner- u. Sol. Jura b. 4500' s., V. Piora n. s.
Phyllobrotica armoraciae, Bernerob. d. s., Entremont n. s. s., Büren.
 — *sinuata*, Gadmen, Siselen i. Gärten n. s.
Teinodacyla anchusae, Büren hfg.
 — *nasturtii*, mit vorigem g.

- Phyllotreta antennata*, Büren a. reseda h.
Podagrica fuscipes, Siselen n. h.
Balanomorpha rustica, Jura s.
Apteropoda graminis, " s. s.
Hypnophila obesa, Siselen, Büren, Sol.
 Jura s. ?
Mniophila muscorum, Büren i. W. u.
 Moos gemein.
Plectroscelis semicoerulea, Büren i. Aare-
 grien hfg.
Dibolia cryptocephala, Siselen.
 — *occultans*, Siselen n. s. s.
Psylliodes chalcomera, Büren s.
 — *alpina*, Entremont hfg.
Cassida sanguinolenta, Gadmen, Bern,
 Seeland n. s.
 — *sanguinosa*, Gadmen, Bern, Seeland,
 sltnr.
 — *thoracica*, Gadmen, Siselen s.
 — *lucida*, Ferret n. s., Locle, Siselen s.
 — *oblonga*, Büren s. s.
Cassida nobilis, Gadmen, Bern, Siselen,
 Entremont.
 — *margaritacea*, Seeland bes. b. Kerzers
 auf jungem Eichengebüsch, Büren
 n. s.
 — *subreticulata*, Gadmen, Ferret s.
 — *ferruginea*, Siselen hfg., " s.
 — *obsoleta*, Büren n. hfg.
 — *hemisphaerica*, Seeland (Siselen u.
 Büren) u. Bern hfg.
Triplax russica, Gadmen noch b. 4500'.
Tritoma bipustulata, Gadmen u. Ahorn-
 rinde, Siselen u. Büren a. Baum-
 schwämmen gemein.
Engis humeralis, Gadmen bis 5500'.
Lycoperdina succincta, Gadmen u. Rindes.
Mycetina cruciata, " " " "
Endomychus coccineus, " " " "
 u. Ahornr. hfg.
Hippodamia 7 maculata, Berner oberld.
 Macugnaga s.
Adonia mutabilis, Gadmen, Chasseral,
 Siselen s.
Bulaea Lichatschovii, Visp s. s.
Adalia oblitterata, Gadmen, Sol. Jura hfg.
 — *v. nigra*, Jura s.
 — *bothnica*, Gadmen, Büren z. s.
 — *alpina*, Gadmen, Simplon, Ferret,
 Macugnaga.
Coccinella hieroglyphica, Siselen z. s.
 — *5 punctata*, Bielersee auf Strand-
 weiden hfg.
 — *labilis*, Gadmen i. Gärten, Büren s.
Sospita tigrina, Siselen u. Moos, Entre-
 mont n. s. s.
- Myrrha 18 guttata*, Büren s.
Calvia 14 guttata, Gadmen, Ferret, Entre-
 mont hfg., Büren.
Halycia 16 guttata, Gadmen, Ferret,
 Entremont, Seeland bes. Siselen hfg.
 — *12 guttata*, Entremont hfg.
Chiloporus renipustulatus, Gadmen n. s.,
 Ferret, Siselen.
Exochomus auritus, Seeland b. Kerzers
 s. s.
Anatis ocellata, Gadmen, Seeland n. s.
Mysia oblongoguttata, Simplon, Jura n.
 hfg.
Scymnus Redtenbacheri, Ferret, Büren
 u. Moos n. s. s.
 — *nigrinus*, Seeland (Siselen u. Büren)
 gemein.
 — *Apetzii*, Büren s. s.
 — *abietis*, Gadmen s., Ferret hfg.
 — *haemorrhoidalis*, Seeland (Siselen
 u. Büren) n. s.
 — *minus*, Siselen s. s.
Alexia pilifera, Büren u. Berner Jura z. s.
 — *pilosa*, Seeland (Siselen u. Büren)
 u. Moos n. s.
Hydnobius spinipes, Mattmark n. s. s.
Anisotoma cinnamomea, Sol. Jura bis
 1200'.
 — *picea* var.? Val Ferret, Mattmark s.
 — *dubia*, Val Piora, Val Ferret (var.)
 n. s.
 — *badia*, Gadmen, Siselen.
Cyrtusa minuta, Büren s.
 — *latipes*, " "
Liodes glabra, Entremont.
 — *orbicularis*, Siselen.
Amphicyllis globiformis, Pieterlen am
 Jura.
Agathidium nigripenne, Chasseral, Gad-
 men u. Ahornr. n. s.
 — *atrum*, Siselen, Büren.
 — *seminulum* var., Büren.
 — *laevigatum*, Büren b. form. r., Jura
 n. s.
 — *mandibulare*, Chasseral.
Cybocephalus exiguus, Büren s.
Clambus pubescens, Siselen n. s.
 — *minutus*, Büren s.
Comazus dubius, Siselen n. s.
Trichopteryx brevipennis, Büren in
 Nestern m. f. r.
Cryptophagus Baldensis, Val Ferret.
 — *distinguendus*, Siselen n. s.
 — *depressus*, Büren s.
 — *subfumatus*, Büren, Simplon.
 — *vini*, Büren, Entremont.

Cryptophagus dorsalis, Büren, Siselen s. s.	— nodifer, Büren s.
Atomaria umbrina, Büren n. s.	— elongatus, Siselen hfg. i. Kellern.
— elongatula, Büren n. s.	— liliputanus, „
— fuscicollis, Büren z. s.	— carbonarius, Büren s. s.
— peltata, Siselen s.	— transversus, Ferret, Jura, Büren gemein auf Weiden.
— gutta, Siselen z. s.	Corticaria pubescens, Ferret n. s.
— munda = nigripennis H., Siselen, Büren hfg.	— foveola, Ferret s.
— fuscata, Seeland, bes. Büren hfg.	— cylindrica, Entremont.
— apicalis, Büren n. hfg.	— fulva, Büren s. s.
Ephistemus globulus, Siselen, Büren z. s.	— similata, Ferret gemein.
Lathridius angusticollis, Siselen.	— fuscula, Siselen hfg., Büren.
— angulatus, Sol. Jura.	— transversalis, Büren.
— alternans, Siselen u. Moos.	— distinguenda, Pieterlen a. Jura.
— rugicollis, Siselen.	Cathartus advena, Büren s.
— constrictus, Büren s.	Monotoma conicicollis, Büren b. f. r.
	— picipes, Entremont.

Ueber Phyllobius croaticus.

Von Dr. Stierlin.

Im 7. Bande der Mittheilungen der schweiz. entomol. Gesellschaft Nr. 42 habe ich *Phyllobius croaticus* beschrieben; es standen mir damals nur wenige Exemplare dieser Art zur Verfügung, und so konnte ich deren Varirbarkeit und deren Abgränzung von verwandten Arten nicht genau angeben.

Durch die Güte des Hrn. Apfelbeck habe ich eine grössere Zahl von Exemplaren erhalten, was mir ermöglichte, diese Art genauer kennen zu lernen.

Ich habe a. a. O. *P. croaticus* mit *Ph. psittacinus* verglichen; er ist aber von diesem auf den ersten Blick zu unterscheiden. da bei *psittacinus* der ganze Bauch bis auf einen schmalen Streifen in der Mitte dicht beschuppt ist, das Halsschild stark gewölbt, bei *croaticus* der Bauch unbeschuppt, das Halsschild nicht gewölbt; viel näher als dem *psittacinus* steht er dem *Ph. argentatus*, auch in der Grösse und darin, dass der Rüssel undeutlich vom Kopf abgesetzt ist; die ♂ sind nun leicht von *argentatus* zu unterscheiden, da bei ihnen das Halsschild seitlich stark gerundet, fast kugelig ist, die ♀ dagegen sind dem *Ph. argentatus* ausserordentlich ähnlich; sie zeigen auch dieselbe Veränderlichkeit in der Färbung der Beine, welche bei beiden Arten bald ganz gelbroth, bald theilweise angedunkelt sind.

Die Unterschiede sind folgende:

Bei *Th. argentatus* ist das 1. Geisselglied der Fühler stets deutlich kürzer als das 2., das Halsschild auch beim ♂ fast so lang als breit, die Flügeldecken sind etwas länger und mehr absteigend behaart und die Schenkel sind etwas stärker gezähnt. Bei *Ph. croaticus* sind die beiden ersten Geisselglieder stets gleich lang, das Halsschild beim ♂ viel, beim ♀ ziemlich breiter als lang, die Behaarung der Flügeldecken ist mehr anliegend und kürzer und die Schenkel sind weniger stark gezähnt.

Bei *Ph. argentatus* ist das Halsschild in beiden Geschlechtern fast gleich geformt, bei *Ph. croaticus* ist dasselbe beim ♂ viel stärker gerundet als beim ♀.

