

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	10 (1897-1903)
Heft:	6
Artikel:	Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection : Macrolépidoptères de la zone paléarctique
Autor:	Agassiz, G.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-400599

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection.

Macrolépidoptères de la zone paléarctique.

Janvier 1900.

Ce catalogue a pour but de renseigner mes honorables collègues sur les variantes de couleur, de dessin et de grandeur que j'ai constatées dans ma collection, afin de provoquer leurs communications éventuelles à ce sujet.

Je me suis contenté d'une description très sommaire des variétés et aberrations qui ne portent pas de noms dans le Catalogue Staudinger. Il y a là évidemment, à côté de véritables aberrations, des cas de dimorphisme de localité ou de saison qui ne peuvent être précisés que par l'indication exacte du lieu et de l'époque de la capture et par la vue du sujet. Toutefois, cette description sommaire offrira, je crois, quelque intérêt, en amenant un échange de communications avec mes correspondants, auxquels je suis par avance reconnaissant des renseignements qu'ils voudront bien me transmettre après examen de ce catalogue. Je me mets à leur entière disposition pour compléter ces indications sommaires dans chaque cas particulier.

Lausanne, Janvier 1900.

G. Agassiz.

Obs. L'autorité n'est pas ajoutée aux noms, le catalogue Staudinger servant de base à ce travail.

Dans la colonne „Provenance“, le mot Aix signifie Aix-les-bains (Savoie) et ses environs montagneux; les mots Jura bernois indiquent particulièrement Tramelan.

I. Rhopalocera (Diurnes).

Papilio podalirius.

- ab. de 56 mm.
- ab. 9 raies noires aux ailes sup. (au lieu de 7).
- ab. double raie couleur ocre aux ailes inf. Suisse-Jura.
- var. Feisthamelii. Espagne.

P. machaon.

- Blanchâtres et jaunâtres.
- ab. de 46 mm. Corse.
- ab. bordure noire, large, aux ailes sup.
- ab. point noir sous l'angle apical.
- ab. asymétrique.

ab. tache rougeâtre à l'angle sup. des ailes infér. Suisse et Savoie.

ab. sphyrus. Syrie.

Thais rumina.

- var. castiliana, passage à medesicaste. Valence.
- ab. Canteneri. Grenade.
- var. medesicaste. Digne.
- ab. Honoratii. Digne.

Th. polyxena.

- ab. taches noires déformées aux ailes sup. Florence.
- var. ochracea. Hongrie.

<i>Th. Cerisyi.</i>		
var. <i>Deyrollei</i> .	Marmara.	var. <i>bellidice</i> . Espagne.
<i>Ismene helios.</i>		<i>P. callidice</i> .
var. <i>maxima</i> .	Turkestan.	var. <i>chrysidice</i> . Perse.
<i>Doritis apollinus.</i>		<i>Anthocharis belemia</i> .
var. <i>bellargus</i> .	Syrie.	var. <i>glauce</i> . Espagne.
<i>Parnassius apollo</i> .		<i>A. belia</i> .
Alpes, Jura, Pyrénées.		var. <i>ausonia</i> . Espagne.
var. <i>hesebolus</i> .	Sibérie.	var. <i>simplonia</i> (espèce?). Haut Valais.
ab. 6. taches noires aux ailes sup. (au lieu de 5).		<i>A. tagis</i> .
ab. 1, 2 et 3 taches rouges aux ailes sup.		var. <i>bellezina</i> . Espagne.
ab. taches et bande rouges à l'angle anal.		<i>A. euphenoides</i> .
ab. œil rouge double à l'aile infér.		var. <i>minor</i> de 24 mm. (un type de 44 mm). Nice.
ab. taches noires réunies en bande transversale aux ailes sup.		<i>Zegris eupheime</i> .
Suisse: Alpes, Jura.		var. <i>menestho</i> . Arménie.
ab. de 54 mm.	Savoie.	var. <i>meridionalis</i> . Grenade.
<i>P. delius</i> .		<i>Leucophasia sinapis</i> .
ab. 3 taches rouges aux ailes sup. Suisse: Haut Valais.		var. <i>lathyri</i> .
var. <i>intermedius</i> .	Sibérie.	var. <i>diniensis</i> .
<i>P. mnemosyne</i> .		ab. <i>erysimi</i> . Suisse.
ab. trans. ad. <i>melaina</i> .		<i>L. Duponchelii</i> .
ab. <i>melaina</i> .	Tyrol.	var. <i>aestiva</i> . Arménie.
<i>Pieris rapae</i> .		ab. tache noire grande, couvre tout le bord des ailes sup. Nice.
var. <i>minor</i> de 35 mm.		<i>Colias palaeno</i> .
ab. teinté de jaune.		var. <i>orientalis</i> . Amour.
ab. base des ailes tachée de noir.	Suisse.	var. <i>europomene</i> .
<i>P. napi</i> .		Suisse: Jura.
var. <i>napaeaee</i> .		ab. <i>Werdandi</i> ♀.
var. <i>minor</i> de 31 mm.	Suisse.	Suisse: Alpes.
ab. <i>bryoniae</i> , fond blanc et fond gris.	Suisse: Alpes.	<i>C. phicomone</i> .
ab. <i>flavescens</i> .	Jura.	ab. ♂ et ♀ très foncés.
<i>P. daplidice</i> .		ab. ♂ et ♀ très pâles.
var. plus foncé dessous.		ab. ♀ dessin effacé.
	Espagne.	Savoie, Haut Valais.
		<i>C. hyale</i> .
		ab. ♂ dessin effacé.
		ab. ♀ ailes infér. teinte foncée.
		ab. ♀ " " " et double bordure de points noirs.
		Suisse: Jura.

<i>C. chrysostheme.</i>	<i>P. dispar.</i>
♂ et ♀ douteux, edusa?	var. rutilus grands.
Florence.	ab. taches albines.
<i>C. edusa.</i>	Vénétie (Padoue).
var. minor de 32 mm.	<i>P. Hippothoë.</i>
ab. ♂ et ♀ large tache orange aux ailes infér.	var. eurybia. H ^t -Valais.
Florence et Espagne.	<i>P. alciphron.</i>
ab. helice. Suisse et Savoie.	var. gordius. H ^t -Valais.
ab. " minor de 36 mm.	<i>P. dorilis.</i>
Espagne.	var. subalpina. Grisons.
var. major ♂ de 52 mm.	<i>P. Phlaeas.</i>
ab. ♀ large bordure noire, taches jaunes disparaissent.	var. eleus. Espagne.
ab. ♀ larges taches jaunes dans la bordure noire.	<i>P. amphidamas.</i>
ab. une aile supér. atrophiée.	ab. obscura. Saxe.
Suisse et Savoie.	<i>Lycaena baetica.</i>
<i>Rhodocera rhamni.</i>	ab. très petits exempl. de 23 mm. Espagne.
ab. de 45 mm. Suisse.	<i>L. argus.</i>
var. farinosa. Arménie.	var. aegidion. Laponie.
<i>R. cleopatra.</i>	var. argulus. H ^t -Valais.
var. massiliensis. Marseille.	<i>L. aegon.</i>
<i>Thecla ilicis.</i>	var. alpina. H ^t -Valais.
ab. de 20 mm. Savoie (Aix).	var. bella. Amour.
var. caudatula. Syrie.	<i>L. argiades.</i>
ab. cerri.	ab. grande ♀ teintée de bleu.
var. esculi.	var. polysperchon. Savoie (Aix).
Sud France (Riviera).	ab. coretas. Hongrie.
<i>Th. Spini.</i>	<i>L. eros.</i>
var. lynceus. Aix (Provence).	var. eroides. Sarepta.
<i>Th. quercus.</i>	<i>L. sebrus.</i>
ab. ♀ les taches bleues se répandent dans les ailes supér.	ab. ♀ teintée de bleu.
ab. tache bleue remplacée par une raire blanche (fané?).	ab. ♂ bleu opale.
Savoie (Aix).	Suisse: Valais.
<i>Th. rubi.</i>	<i>L. baton.</i>
ab. de 19 mm. Savoie (Aix).	var. panoptes. Espagne.
ab. immaculata. Nassau.	<i>L. minima.</i>
<i>Polyommatus virgaureae.</i>	var. Lorquinii. Espagne.
var. virgaureola. Turquie.	<i>L. orion.</i>
var. zermattensis. H ^t -Valais.	var. nigra. Espagne.
	var. ornata. Amour.
	<i>L. semiargus.</i> Les ♂ d'Italie plus foncés.

var. montana.	Grisons.	<i>L. damon.</i>
var. bellis.	Arménie.	ab. large bordure noire. ab. ♀ teintée de bleu.
<i>L. pheretes.</i>		Suisse.
ab. maloyensis.	Grisons.	
<i>L. optilete.</i>		
var. cyparissus.	Laponie.	<i>L. cyllarus.</i>
<i>L. icarus.</i>		ab. ♀ très noire.
ab. ♀ dessous taches réunies en bande noire.		var. Andereggii. Valais.
ab. icarinus.		ab. Blachieri, passage à me-
ab. dessous grandes taches noires.	Suisse.	lanops.
ab. passage à caerulea.		ab. grand ♂ de 40 mm. large
ab. caerulea.	Savoie (Aix).	bordure noire. Nice.
var. glauca.	Kissingen.	<i>L. astrarche.</i>
var. celina.	Algérie.	var. montana. Andalousie.
<i>L. Escheri.</i>		var. aestiva. Espagne.
ab. points noirs aux ailes infér.	Savoie.	ab. allous. Suisse, Allem.
ab. dessous sans taches fauves, points noirs seulement au bord des ailes sup.		<i>L. zephyrus.</i>
	Hautes Alpes.	var. lycidas. Valais.
<i>L. hylas.</i>		<i>L. arion.</i>
ab. points noirs aux ailes infér.	Suisse: Jura.	var. alpina.
		Savoie, H ^t -Valais.
<i>L. bellargus.</i>		ab. taches noires très épaisse.
ab. points noirs au bord des ailes infér.		ab. 5 petits points noirs, ex.
ab. passage à ceronus.	Suisse, Savoie (Aix).	de 30 mm. Suisse, Savoie.
ab. ceronus.	Provence.	<i>Nemeobius lucina.</i>
var. punctifera.	Algérie.	ab. ailes infér. noires pres- que sans taches.
		Savoie (Aix).
<i>L. coridon.</i>		<i>Apatura iris.</i>
ab. large bordure noire.		ab. iole. Hongrie.
ab. Sohni.	Suisse.	<i>A. ilia.</i>
ab. syngrapha.		ab. astasioides (dilutior?).
	Suisse, Sud France.	Suisse: Jura.
var. corydonius.	Arménie.	var. metis.
var. albicans.	Andalousie.	var. bunea. Sarepta.
		ab. clytie. Suisse: Baden.
<i>L. dolus.</i>		<i>Limenitis populi.</i>
ab. vittata.	Marseille.	ab. tremulae. Saxe.
		<i>Vanessa levana.</i>
		ab. porima. Saxe.
		var. prorsa. Grisons.
		<i>V. egea.</i>
		var. autumnalis.
		ab. I album. Florence.

<i>V. urticeae.</i>	
var. <i>pygmaea</i> .	Leipzig.
var. <i>polaris</i> .	Tromsoe (Norvège).
ab. sans les 2 petits points noirs aux ailes sup., la bande de points bleus plus étroite (à décrire).	Florence.
var. <i>ichnusa</i> .	Corse.
ab. <i>nigrita</i> .	
ab. " (à décrire)	
ichnusoides (?).	Elevage Zurich.
<i>V. polychloros</i> .	
ab. <i>pyromelas</i> (?).	
var. <i>pygmaea</i> .	Elevage.
var. <i>erythromelas</i> .	Algérie.
ab. <i>testudo</i> .	
ab. " (à décrire).	Elevage Zurich.
<i>V. Jo.</i>	
ab. sans écailles (ioïdes).	
ab. ioïdes.	
ab. ioïdes à droite, Jo à gauche.	Elevage.
ab. <i>belisaria</i> .	
ab. " (à décrire).	Elevage Zurich.
<i>V. callirhoë</i> .	
var. <i>vulcanica</i> .	Ténériffe.
<i>V. atalanta</i> .	
ab. point blanc dans la raie transversale rouge.	Suisse.
<i>V. antiopa</i> .	
ab. les 2 taches jaunes des ailes sup. confondues.	
ab. bordure jaune étroite, taches jaunes déformées, taches bleues allongées transversalement.	
ab. <i>hygiaea</i> .	Elevage Zurich.
ab. bordure blanche (fané après l'hiver).	Suisse.

<i>Melitaea aurinia</i> .	(France et Italie.)
ab. tache jaune clair rectangul.	
à la base des ailes supér.	Italie.
var. <i>merope</i> .	Valais.
var. <i>provincialis</i> .	Nice.
var. <i>orientalis</i> .	Asie min.
var. <i>Desfontainii</i> .	Espagne.
<i>M. dictynna</i> .	
ab. ailes infér. noires presque sans taches.	
ab. ailes infér. noires tache noire partie médiane ailes supér.	Suisse et Savoie.
<i>M. parthenie</i> .	
var. <i>beata</i> .	Sud France.
var. <i>varia</i> .	Grisons.
<i>M. aurelia</i>	
var. <i>plotina</i> (espèce?).	Amour.
<i>M. didyma</i> .	
ab. ♂ dessous taches noires aux ailes infér.	Savoie (Aix).
ab. ♀ foncées, noirâtres.	Nice.
ab. ♀ claires, dessin effacé.	Savoie (Aix).
ab. couleur plus vive, moins de points noirs.	Florence.
var. <i>occidentalis</i> .	Nice.
var. <i>neera</i> .	Sarepta.
var. <i>meridionalis</i> .	Arménie.
var. <i>alpina</i> .	H ^t -Valais.
ab. ♂ base des ailes supér.	
très noire.	Savoie.
ab. teinte jaune-rouge.	
	France (Ardèche).
<i>M. phoebe</i> .	
ab. dessin effacé au sommet des ailes supér.	Florence.
var. <i>occitanica</i> .	Andalousie.
var. <i>aetherie</i> .	Algérie.
ab. <i>melanina</i> .	Florence.

ab. base très foncée. France (La Grave).	<i>A. amathusia.</i>
<i>M. dejone.</i>	ab. taches albines.
ab. dessin effacé aux extrémités des ailes sup. Sud France.	ab. dessins très noirs.
ab. petite, dessins de phoebe. France (Ardèche).	ab. aile déformée. Savoie (Aix).
<i>M. athalia.</i>	<i>A. lathonia.</i>
ab. ailes supér. minces, allongées.	ab. ailes infér. angulaires. Suisse.
ab. foncées et claires.	
ab. dessin effacé.	
ab. déformations d'ailes. Suisse et Savoie.	
ab. corythalia. Domo d'Ossola.	<i>A. aglaja.</i>
var. niphonica. Amour.	ab. de 43 mm. Savoie.
var. berisalensis (espèce?). Valais (Martigny).	var. fortuna. Amour.
<i>M. arduinna.</i>	<i>A. niobe.</i>
var. rhodopensis. Perse.	ab. passage à eris.
<i>Argynnis dia.</i>	ab. eris.
ab. tache albine.	ab. ♀ très noire, 55 mm. Savoie (Aix) et Suisse: Jura.
ab. base des ailes infér. noire. Suisse: Jura.	
<i>A. selene.</i>	<i>A. adippe.</i>
var. hela. Sibérie.	ab. grandes taches noires. Suisse.
<i>A. pales.</i>	ab. cleodoxa. Savoie (Aix).
ab. tache jaune clair rectangulaire à la base des ailes supér.	<i>A. paphia.</i>
var. isis.	ab. ♀ très foncée. Suisse.
ab. noirâtre.	var. anargyra. Castille.
ab. napaea. Ht-Valais et Grisons.	ab. valesina. Tessin.
var. arsilache. Grisons.	<i>Danais chrysippus.</i>
var. generator. Pamir.	ab. alcippus (espèce?). Grèce.
ab. remarquable: défigurée dessus et dessous (à décrire). France (La Grave).	<i>Melanargia galathea.</i>
<i>A. ino.</i>	ab. blanchâtre.
var. maxima. Amour.	ab. passage à procida.
	ab. de 34 mm. Suisse et Savoie.
	var. procida. Marseille.
	ab. galene.
	ab. leucomelas. France (Charente Inf.).
	<i>M. Japygia.</i>
	var. Suvarovius. Turkestan.
	<i>M. halimede.</i>
	var. lugens. Amour?
	<i>M. ines.</i>
	ab. asymétrique. S. Espagne.
	<i>Erebia gorge.</i>
	ab. erynis. Grisons.

<i>E. tyndarus.</i>	var. triopes.	Grisons.	<i>S. briseis</i>
	ab. coecodromus.	Grisons.	ab. <i>pirata</i> . N. Allem.
	var. dromus.	Pyrénées.	ab. ♂ et ♀ exactement pa- reils à <i>meridionalis</i> , larges bandes blanches. Savoie.
<i>E. melampus.</i>	ab. taches albines.	H ^t -Valais.	var. <i>meridionalis</i> . Arménie.
<i>E. epiphron.</i>	var. cassiope.		ab. ♂ de 45 mm.
	ab. <i>nelamus</i> .	Grisons.	ab. ♀ taches blanches étroites, comme au ♂. Suisse.
<i>E. manto.</i>	var. <i>caecilia</i> .	Pyrénées.	<i>S. anthelea</i> .
	var. <i>pyrrhula</i> .	Grisons.	var. <i>amalthea</i> . Grèce.
<i>E. goante.</i>	ab. tache albine.	H ^t -Valais.	<i>S. arethusa</i> .
<i>E. ceto.</i>	var. <i>obscura</i> .		ab. ♂ presque sans taches.
	var. <i>phorcys</i> .	H ^t -Valais.	ab. ♂ taches très larges.
<i>E. aethiops.</i>	ab. de 34 mm.		ab. ♀ " " " 3 points noirs ailes sup.
	var. <i>leucataenia</i> ?	H ^t -Valais.	Savoie (Aix).
<i>E. glacialis.</i>	ab. très larges taches fauves.		var. <i>erythia</i> . S. France.
	ab. <i>alecto</i> .	H ^t -Valais.	var. <i>boabdil</i> Espagne.
	var. <i>pluto</i> .	Tyrol.	<i>S. semele</i> .
<i>E. pronoë.</i>	var. <i>pitho</i> .	H ^t -Valais.	ab. les yeux sur fond jaune ocre. Suisse.
<i>E. melas.</i>	var. <i>Lefebvrei</i> .	Pyrénées.	<i>S. statilinus</i> .
<i>E. euryale.</i>	ab. <i>ocellaris</i> .	S. Autriche.	var. <i>allionia</i> . France (Var).
	var. <i>euryaloïdes</i> .	Tyrol.	<i>S. dryas</i> .
<i>E. ligea.</i>	ab. taches albines.		ab. ♀ à 3 yeux bleus.
	var. <i>adyte</i> .	Suisse et Savoie.	ab. de 44 mm. Savoie (Aix).
<i>E. medusa.</i>	var. <i>hippomedusa</i> .	Autriche.	var. <i>bipunctata</i> . Mongolie.
<i>Oeneis bore.</i>	var. <i>taygete</i> (espèce?).	Laponie.	<i>S. cordula</i> .
	Grands exemplaires (58 au lieu de 50 mm.)	Espagne.	ab. ♀ très foncée, œil infér. double. Valais.
<i>Satgrus alcyone.</i>			var. <i>nana</i> . Touran.
			var. <i>amasina</i> . Arménie.
			var. <i>bryce</i> . Sarepta.
			ab. brune, 3 grands yeux pupillés de blanc aux ailes sup. et 2 petits yeux pu- pillés de blanc aux ailes infér.
			Valais et France (La Grave).
			<i>Pararge achime</i> .
			var. <i>eximia</i> . Amour.
			<i>P. megaera</i> .
			var. <i>tigelius</i> . Sardaigne.

<i>P. lyssa.</i>	Dalmatic.	ab. avec un petit filet blanc dessous. Aix (Revard).
<i>P. maera.</i>		
ab. ♀ très foncées.		
ab. ♀ très pâles, dessin effacé.		
ab. ♀ " œil à 3 pupilles. Suisse et Savoie.		
var. adrasta. S. Allem.		
<i>P. aegeria.</i> (Meone.)		
var. intermedia et passage à var. aegerides. Italie.		
var. aegerides.	Suisse et Savoie.	
ab. ♂ presque sans taches.		
ab. ♂ taches blanchâtres.		
ab. ♀ grandes taches, aux extrémités des ailes seulement.	Florence.	
<i>Epinephele lycaon.</i>		
Petits exempl. ♀ de 30 mm.. moins colorés.	Valais.	
<i>E. hyperanthus.</i>		
ab. arete.	Allem.	
<i>E. jauira.</i>		
ab. de 30 mm.		
ab. une aile infér. albine.	Suisse.	
var. hispulla.	Bilbao.	
var. fortunata.	Canaries.	
<i>Coenonympha arcania.</i>		
ab. ♀ bordure moins noire, de 37 mm. Savoie (Aix).		
var. Darwiniana.	Valais.	
var. satyrion.		
ab. avec 2 gros points seulement dans la bande blanche dessous.	Aix (Revard).	
<i>C. pamphilus.</i>		
ab. minor de 23 mm.		
ab. major de 34 mm. Suisse.		
var. lyllus. Andalousie.		
var. marginata. Mésopotamie.		
ab. passage à lyllus.	S. France, Italie.	
<i>C. tiphon.</i>		
var. isis.	Laponie.	
var. philoxenus.	N. Allem.	
<i>Spilothyrid altheae.</i>		
var. baetica.	Andalousie.	
<i>Syrichthus malvae.</i>		
ab. de 15 mm.	Suisse.	
<i>S. alveus.</i>		
var. fritillum.	Suisse.	
<i>S. cacaliae.</i>		
ab. sans taches blanches.		
	Suisse.	
<i>S. serratulae.</i>		
var. caecus.		
	Autriche, H ^t -Valais.	
<i>Hesperia comma.</i>		
ab. catena.	Tyrol.	
<i>H. lineola.</i>		
var. ludoviciae (?).	H ^t -Valais.	
<i>Nisoniades tages.</i>		
ab. unicolor.	Arménie.	
<i>Carterocephalus palaemon.</i>		
ab. ailes infér. noires, presque sans taches.	Suisse.	

II. Heterocera. Sphinges.

<i>Acherontia atropos.</i>	<i>Sphinx convolvuli.</i>
ab. sans dessin sur le thorax, seulement une petite tache jaune. Savoie (Aix).	ab. dessins très marqués et dessins effacés. Suisse.

<i>S. ligustri.</i>		<i>Zygaena achilleae.</i>	
ab. ailes supér. blanchâtres.	Aix.	ab. <i>viciae</i> .	Hongrie.
		var. <i>tristis</i> .	Pyrénées.
<i>S. pinastri.</i>		<i>Z. pilosellae.</i>	
ab. dessins très marqués et dessins effacés.		ab. <i>polygalae</i> .	Valais.
ab. teintes variées du gris clair au gris-noir.	Aix.	var. <i>nubigena</i> .	Autriche.
<i>Deilephila vespertilio.</i>		<i>Z. exulans.</i>	
hibr. <i>epilobii</i> (<i>vespertilio</i> × <i>euphorbiae</i>).	Vienne.	var. <i>vanadis</i> .	Laponie.
<i>D. euphorbiae.</i>		<i>Z. meliloti.</i>	
ab. tache rosée dans la bande vert foncé.		var. <i>confusa</i> .	Touran.
ab. taches vertes des ailes sup. agrandies et étendues dans l'aile.		<i>Z. romeo.</i>	
ab. <i>paralias</i> .	Aix et Suisse.	var. <i>orion</i> .	H ^t -Valais.
var. <i>Grentzenbergi</i> .	Portugal.	var. <i>nevadensis</i> .	Andalousie.
<i>D. elpenor.</i>		<i>Z. favonia.</i>	
ab. le noir envahit les ailes infér.		var. <i>Staudingeri</i> .	Algérie.
ab. à dessin effacé.		<i>Z. trifolii.</i>	
	Aix et Suisse.	ab. bordure large ailes infér.	
<i>D. porcellus.</i>		var. <i>confluens</i> .	Valais.
ab. de 40 mm.	Aix.	ab. <i>orobi</i> .	S. Allem.
<i>Smerinthus ocellata.</i>		var. <i>dubia</i> .	Valais.
var. <i>rosea</i> .		<i>Z. transalpina.</i>	
hibr. <i>hybridus</i> (<i>ocellata</i> × <i>populi</i>).	Saxe.	var. <i>astragali</i> .	Nice.
<i>S. tiliæ.</i>		<i>Z. filipendulae.</i>	
ab. de 58 mm. taches des ailes sup. séparées, petites.		var. <i>Mannii</i> .	Autriche.
ab. teinte foncée, large bande noire aux ailes infér.		ab. <i>cytisi</i> .	
ab. brune et verdâtre; ailes infér. vert foncé et marron.		ab. les points rouges réunis par deux.	
ab. <i>ulmi</i> .	Aix.	ab. de 25 mm.	Valais.
ab. <i>brunnea</i> .	Berne.	<i>Z. ephialtes.</i>	
<i>Ino cognata.</i>		ab. <i>medusa</i> .	Valais.
var. <i>subsolana</i> .	Hongrie.	ab. <i>trigonellae</i> .	Valais.
<i>I. statices.</i>		ab. <i>coronillae</i> .	Hongrie.
var. <i>Mannii</i> .	Espagne.	var. <i>peucedani</i> .	Savoie.
		ab. <i>athamanthae</i> .	Valais.
		ab. <i>aeacus</i> .	Autriche.
		<i>Z. larandulae.</i>	
		ab. <i>consobrina</i> .	Marseille.
		<i>Z. stoechadis.</i>	
		ab. ailes inf. noires avec 3 taches rouges.	Suse (Italie).
		<i>Z. rhadamanthus.</i>	
		ab. <i>cingulata</i> .	Espagne.

<i>Z. occitanica.</i>		<i>Z. carniolica.</i>
ab. albicans.	Espagne.	var. berolinensis.
<i>Z. fraxini.</i>		ab. de 24 mm.
ab. Scovitzii.	Amour.	ab. hedysari.
<i>Z. fausta.</i>		ab. taches rouges envahissant les ailes sup.
var. nicaeae.	S. France.	ab. albine, le noir remplacé par du blanc sauf une petite bordure noire. Aix.
var. jucunda.	Alpes.	var. orana. Algérie.
Grands exempl. de 30 mm.		
Suisse: Jura.		

III. Bombyces.

<i>Nudaria murina.</i>		var. arideola. S. Allem.
var. cinerescens.	Arménie.	
<i>Sarrothripa undulana.</i>		<i>L. lutarella.</i>
var. degenerana.	Livonie.	var. pygmaeola. Angleterre.
ab. brunâtre, dessin effacé.		
	Suisse.	<i>Gnophria rubricollis.</i>
ab. dilutana.	Touran.	ab. taches grises à l'extrémité des ailes sup. Aix.
<i>Hylophila prasinana.</i>		<i>Deiopeia pulchella.</i>
ab. à 3 bandes blanches.		ab. taches rouges et noires plus grandes et plus serrées sur fond grisâtre des ailes sup. Berne ?
ab. verdâtre, ailes supér. encadrées de rouge.	Aix.	
<i>Setina roscida.</i>		<i>Emydia striata.</i>
ab. de 18 mm.		ab. melanoptera. Paris.
var. melanomos.	Valais.	<i>E. cibrum.</i>
<i>S. irrorella.</i>		var. candida. Aix.
var. Freyeri.	Valais.	var. punctigera. Tyrol.
var. flavicans.	S. France.	<i>Nemeophila plantaginis.</i>
var. Andereggi.		ab. ♀ ailes sup. jaunes sans le dessin noir de la partie médiane et 3 points noirs à l'extrémité.
var. riffelensis.	Valais.	* ab. matronalis, dout 2 ♀.
<i>S. Kuhlweini.</i>		ab. hospita ♂.
var. alpestris.	Valais.	ab. " base des ailes infér. noire.
<i>S. aurita.</i>		ab. hospita ailes inf. blanches sauf quelques points noirs.
var. sagittata.		ab. ♀ passage du type à ♀ matronalis.
ab. ailes infér. sans taches.		Aix (Revard) et Suisse: Jura.
ab. transiens.		
var. ramosa.		
ab. alpina.		
ab. nervures noires très légères.	Valais.	
<i>Lithosia unita.</i>		
var. palleola.	Hongrie.	

<i>N. russula.</i>		ab. ailes sup. jaunes, bordure noire. Alsace.
ab. ♂ base et large bordure noires aux ailes infér. Aix.		
<i>Callimorpha hera.</i>		hybr. lubric \times zatima. Angleterre.
ab. lutescens. Bretagne.		
var. magna. Algérie.		
ab. de 45 mm. Savoie.		
<i>C. dominula.</i>		
ab. asymétrique. Aix.		
var. minor de 38 mm. Saxe.		
var. persona. Italie.		
var. Romanovi. Elevage Zurich (?).		
ab. toutes les taches blanches aux ailes sup. Aix.		
<i>Arctia caja.</i>		
ab. de 45 mm.		
ab. asym.		
ab. ail. sup. minces, allongées.		
ab. sans taches à la partie médiane des ailes sup.		
ab. taches bleues reliées, aux ailes infér.		
ab. bandes blanches teintées de rose.		
ab. bandes blanches très larges.		
ab. ailes infér. rouge carmin.		
ab. confluens. Aix.		
ab. al. post. flav. Portugal.		
<i>A. villica.</i>		
ab. Brunhilda. Sicile.		
<i>A. purpurata.</i>		
ab. ailes sup. presque sans taches.		
var. atromaculata. Suisse.		
<i>A. maculosa.</i>		
var. simplonica. Alpes.		
<i>Pleretes matronula.</i>	?	
ab. asymétrique.	?	
<i>Spilosoma lubricipedata.</i>	Saxe.	
ab. zatima.		
ab. thor. nigro.	?	
		ab. ailes sup. déformées.
		ab. ailes infér. presque entièrement noires. Aix.
<i>S. fuliginosa.</i>		
ab. ailes infér. bordées de noir.		
		ab. ailes sup. déformées.
		ab. ailes infér. presque entièrement noires. Aix.
<i>S. mendica.</i>		
ab. rustica.		Hongrie.
<i>S. menthastris.</i>		
ab. à très petits points aux ailes sup.		
ab. à très petits points, un seul grand aux ailes infér.		
ab. à 3—4 points seulement.		
ab. ailes sup. teintées de jaune.		Aix.
<i>Cossus cossus.</i>		
ab. foncée.		
ab. dessins très marqués sur fond clair.		
ab. de 63 mm.		Aix.
<i>Endagria ulula.</i>		
ab. marmorata.		Asie min.
<i>Psyche febretta.</i>		
var. lutea.		Asie min.
<i>Orgyia dubia.</i>		
var. splendida.		Espagne.
<i>Dasychira pudibunda.</i>		
ab. concolor.		Stettin.
<i>D. fascelina.</i>		
ab. ♂ und ♀ de haute montagne, teinte gris perle, dessins très marqués en noir. France (La Grave).		
<i>Psilura monacha.</i>		
ab. trans. ad eremita.		Allem.
ab. eremita.		Aix.
ab. asymétrique.		Allem.

<i>Ocneria dispar.</i>		<i>L. pruni.</i>	
ab. très claire.		ab. de 35 mm.	Aix.
ab. ♂ de 32 mm.			
ab. ♀ de 40 mm.	Aix.		
var. orientalis.	Arménie.		
ab. demi-hermaphrodites.	Coblenz.		
<i>Bombyx crataegi.</i>		<i>L. quercifolia.</i>	
ab. brune, dessins effacés (var. ariae?).	Alpes.	ab. brun foncé.	Aix.
<i>B. castrensis.</i>	ab. ♂ de 23 mm.	var. meridionalis.	Dalmatie.
<i>B. neustria</i> (jaune).	Grisons.	ab. alnifolia.	Hambourg.
ab. ♂ de 22 mm.			
ab. passage à l'ab. brune.			
ab. brun foncé.	Aix.		
ab. unicolor.	N. Allem.		
<i>B. alpicola.</i>	ab. brun très foncé.		
	H ^t -Valais.		
<i>B. quercus.</i>		<i>S. pavonia.</i>	
ab. ailes infér. angulaires.		ab. ♂ de 45 mm.	
ab. raies jaunes très larges.		ab. ♀ de 50 mm.	Suisse.
var. subalpina (?).	Suisse: Jura.		
var. alpina.	Valais.	<i>Aglia tau.</i>	
var. Guillemotii.	?	ab. ♀ de 60 mm.	Suisse: Jura.
var. roboris.	Nice.		
ab. spartii.	Pyrénées.	ab. lugens.	?
ab. callunae.	Allem.	ab. ferenigra.	Thuringe.
<i>B. trifolii.</i>		<i>Drepana binaria.</i>	
ab. de 36 mm.		ab. de 22 mm.	Aix.
var. medicaginis.	Aix.		
var. cocles.	Espagne.	<i>Harpyia vinula.</i>	
<i>Lasiocampa pini.</i>	ab. brunnea.	ab. ♀ ailes supér. foncées.	Aix.
	Suisse: Jura.		
var. montana.		var. Delevoici.	Algérie.
ab. ♀ brun-rougeâtre, dessin		<i>Hybocampa Milhauseri.</i>	
seulement au bord des		ab. ailes supér. dessins effacés.	Aix.
ailes sup.			
ab. ♀ tachetée brun et blanc,		<i>Notodonta trimacula.</i>	
dessin effacé.	Berne.	var. dodonaea.	Aix.
		<i>Lophopteryx camelina.</i>	
		ab. plus foncée.	Berne.
		ab. giraffina.	?

IV. Noctuae.

<i>Acronycta leporina.</i>	<i>B. raptricula.</i>
var. <i>bradyoporina</i> . Autriche.	ab. <i>deceptricula</i> . Allem.
<i>A. menyanthidis.</i>	<i>B. muralis.</i>
ab. large bande noire au bord des ailes sup. Jura bernois.	ab. dessins fondus dans le fond verdâtre. Aix.
<i>A. rumicis.</i>	var. par. France.
ab. brun foncé, dessins effacés. Jura bernois.	<i>Agrotis multangula.</i>
<i>A. euphorbiae.</i>	ab. bord des ailes sup. très noir (subrectangula?). Jura bernois.
var. <i>montivaga</i> .	
ab. dessins noirs partie mé- diane ailes sup. Jura bernois.	<i>A. festiva.</i>
<i>A. euphrasiae.</i>	ab. base des ailes sup. dessin effacé jusqu'à la tache réni- forme.
ab. <i>esulae</i> . France.	ab. brun rougeâtre, dessins fondus (ab. <i>congener</i> ?). Jura bernois.
<i>A. megacephala.</i>	<i>A. triangulum.</i>
ab. teinte noirâtre, tache or- biculaire en rond blanc très apparent.	ab. teinte rougeâtre. Jura bernois.
ab. teinte brunâtre, espace subterminal faisant large tache grisâtre. Jura bernois.	<i>A. fimbria.</i>
<i>A. aceris.</i>	ab. ailes sup. brunes, dessin brun foncé. Jura bernois.
ab. noirâtre, dessins élargis et noirs.	ab. ailes sup. verdâtres, dessin vert foncé (ab. <i>solani</i> ?). ?
ab. gris foncé, dessins élargis et foncés. Jura bernois.	<i>A. linogrisea.</i>
<i>Bryophila perla.</i>	ab. ailes sup. grises, dessins brun clair. Valais.
ab. petites taches noires sur fond blanc. Jura bernois.	<i>A. comes.</i>
ab. taches noires et larges sur fond gris.	ab. ailes sup. brun rougeâtre, dessins effacés (ab. <i>pro- sequa</i> ?). Valais.
ab. dessin très net de tous les points, traits et taches. Aix.	<i>A. janthina.</i>
<i>B. ravula.</i>	ab. ailes sup. brun-rouge- âtre, dessins effacés. Aix.
var. <i>ereptricula</i> . Aix.	<i>A. pronuba.</i>
<i>B. algae.</i>	ab. <i>innuba</i> .
ab. <i>mendacula</i> . Arménie.	ab. ailes sup. brun foncé, dessins effacés. Aix.
	<i>A. puta.</i>
	ab. <i>lignosa</i> . S. France.

<i>M. brassicae.</i>	<i>Episema glaucina.</i>
ab. noire, dessins effacés. Jura bernois.	ab. tersina. ab. dentimacula. Hongrie.
<i>M. pisi.</i>	<i>Luperina matura.</i>
ab. de 32 mm.	ab. ailes inf. brunes, bordure fondu. Aix.
ab. fond très clair, dessins très marqués en brun, tache blanche très grande.	
ab. ailes sup. brun rouge, dessins effacés. Jura bernois.	
<i>M. persicariae.</i>	<i>Dryobota protea.</i>
ab. de 33 mm. Aix.	ab. de 23 mm. Aix.
ab. unicolor. Allem.	
<i>M. marmorosa.</i>	<i>Apamea Dumerilii.</i>
var. microdon. Aix.	var. diversa. Arménie.
ab. dessins fondus. Suisse.	
<i>M. dentina.</i>	<i>Miselia oxyacanthalae.</i>
ab. latenai. Alpes.	ab. de 35 mm. Jura bernois.
<i>M. reticulata.</i>	<i>Hadena rurea.</i>
ab. très noire. Jura.	ab. teinte brun foncé, dessins accentués.
var. unicolor. Touran.	ab. forma intermedia.
	ab. alopecurus.
	ab. " brun-noir. Jura bernois.
<i>M. serena.</i>	<i>H. hepatica.</i>
var. obscura. Suisse.	ab. de 30 mm. Suisse.
ab. teinte grise. Aix.	
<i>Dianthoecia carpophaga.</i>	<i>H. zeta.</i>
ab. teinte gris-brun et jaun- âtre.	var. pernix. H ^t -Valais.
ab. teinte brun foncé.	
ab. dessins très marqués.	<i>H. monoglypha.</i>
ab. " " effacés. Aix.	var. obscura. Jura bernois.
	var. nigricans. Carlsbad.
<i>D. filigrana.</i>	<i>H. bicoloria.</i>
var. xanthocyanea. Valais.	ab. furuncula. Allem.
<i>Polia rufocincta.</i>	<i>H. strigilis.</i>
ab. dessins très noirs. Jura bernois.	ab. aethiops. ab. latruncula. Aix.
<i>P. xanthomista.</i>	<i>H. didyma.</i>
var. nigrocincta. Suisse.	ab. teinte foncée.
<i>Aporophyla lutulenta.</i>	ab. nictitans. Jura bernois.
var. luneburgensis. N. Allem.	ab. leucostigma.
ab. ailes sup. noires, sans dessins. S. France.	var. moderata. Bilbao.
	<i>H. unanimis.</i>
	ab. teinte foncée. Jura bernois.
	<i>H. basilinea.</i>
	ab. teinte grisâtre de 34 mm. Jura bernois.

<i>Euplexia lucipara.</i>		ab. teinte foncée.	
ab. de 27 mm.	Aix.	Jura bernois.	
<i>Mania maura.</i>		<i>O. circellaris.</i>	
ab. espace terminal, ligne coulée et bordure des ailes infér. blanc sale.	Suisse.	ab. brun rougeâtre.	Berne.
<i>Naenia typica.</i>		<i>O. litura.</i>	
ab. fond des ailes sup. plus clair, nervures très blanches.	Jura bernois.	ab. teinte foncée.	
<i>Hydroecia nictitans.</i>	ab. erythrostigma.	<i>O. pistacina.</i>	
	Allem.	var. grisea.	Berne.
<i>Nonagria geminipuncta.</i>	var. pallida.	ab. serina.	Autriche.
<i>N. arundinis.</i>	ab. fraterna.	<i>O. ruticilla.</i>	
	N. Allem.	ab. brun rougeâtre.	S. France.
<i>Grammesia trigrammica.</i>	ab. brune.	<i>O. nitida.</i>	
	Jura bernois.	ab. brun foncé.	Berne.
<i>Leucania lythargyrea.</i>	var. argyritis.	<i>O. helvola.</i>	
	ab. de 34 mm.	ab. gris-brun.	
<i>Caradrina exigua.</i>	var. pygmaea.	ab. brun foncé.	Valais.
<i>Amphipyra pyramidaea.</i>	var. magna.	<i>Hoporina croceago.</i>	
	Amour.	ab. jaune-brun, dessins effacés.	Jura bernois.
<i>Taeniocampa incerta.</i>	ab. fuscata.	<i>Xanthia fulvago.</i>	
	Grisons.	ab. flavescens.	?
<i>T. stabilis.</i>	ab. jaunâtre.	<i>X. aurago.</i>	
	ab. brun foncé, de 32 mm.	ab. fucata.	?
	Jura bernois.	<i>Scopelosoma satellitia.</i>	
<i>Calymnia trapezina.</i>	var. grisea.	ab. brun foncé, tache blanche à peine visible.	Berne.
	Aix.	<i>Orrhodia ligula.</i>	
		ab. polita.	Saxe.
<i>C. pyralina.</i>	ab. brun-noir, dessins effacés.	<i>O. vaccinii.</i>	
	Suisse.	ab. mixta.	Aix.
<i>Anchocelis lunosa.</i>	ab. gris foncé, dessins noirs.	ab. spadicea.	Saxe.
	S. France.	<i>O. rubiginea.</i>	
<i>Orthosia lota.</i>	ab. grisâtre de 34 mm.	ab. unicolor.	Alsace.
		<i>O. erythrocephala.</i>	
		ab. glabra.	Valais.
<i>Xylina lambda.</i>	var. somniculosa.	<i>X. lambda.</i>	
		ab. brun foncé.	Berlin.
<i>X. furcifera.</i>		<i>X. furcifera.</i>	
		ab. brun foncé.	Jura bernois.

<i>Calophasia lunula.</i>			
ab. de 22 mm.	Aix.		
<i>C. casta.</i>			
ab. barre noire de la ligne coulée interrompue.	Valais.		
<i>Plusia jota.</i>			
ab. un seul point doré.			
ab. brun foncé, ailes infér. foncées.			
ab. precontationis, tache en Y.	Jura bernois.		
<i>P. pulchrina.</i>			
ab. tache en Y.	Jura bernois.		
<i>P. gamma.</i>			
ab. très noire, bordure ailes infér. très noire.	Jura bernois.		
<i>Heliothis ononis.</i>			
ab. teinte grise.	Valais.		
<i>Anarta melanopa.</i>			
var. rupestralis.	Alpes.		
<i>Acontia lucida.</i>			
ab. très noire, trois taches blanches aux ailes infér. (lugens?).	Vénétic.		
var. albicollis.	S. Russie.		
<i>Thalpochares candidana.</i>			
var. ? taches brunes au lieu de la ligne subterminale.	Bilbao.		
<i>Euclidia glyphica.</i>			
ab. fond plus gris.	Aix.		
<i>ab. foncée, le noir envahit presque toute l'aile infér.</i>			
<i>ab. de 22 mm.</i>	Aix.		
<i>var. dentata.</i>	Amour.		
<i>E. mi.</i>			
ab. dessins effacés.			
ab. fond des ailes sup. blanc sale, une seule tache mé-diane gris noir.	Jura bernois.		
<i>var. litterata.</i>	Allem.		
<i>Catocala nupta.</i>			
ab. ailes supér. foncées, tache noire agrandie.	Aix.		
<i>C. sponsa.</i>			
ab. taches très blanches et agrandies aux ailes sup.	Jura bernois.		
<i>C. hymenaea.</i>			
ab. de 32 mm.	Autriche.		
<i>C. conversa.</i>			
var. agamos.	Bavière.		
<i>Toxocampa pastinum.</i>			
ab. de 27 mm.	Aix.		
<i>T. viciae.</i>			
ab. de 27 mm.	Jura bernois.		
<i>Spintherops spectrum.</i>			
ab. dessins beaucoup plus marqués.	Tyrol?		
var. phantasma.	Arménie.		
<i>Brephos nothum.</i>			
ab. brun foncé, dessins effacés.	Jura bernois.		

V. Geometrae.

<i>Acidalia versata.</i>			
ab. jaunâtre.			
ab. spoliata.	Aix.		
<i>A. inornata.</i>			
var. deversaria.	Altenbourg.		
<i>A. virgularia.</i>			
var. canteneraria.	Nice.		
<i>A. rusticata.</i>			
var. mustelata.			
ab. grande (méridionalis?).	Pyrénées.		
<i>A. degeneraria.</i>			
var. meridiaria?			
ab. rubraria?	Bilbao.		

<i>A. politata.</i>	<i>Selenia bilunaria.</i>
var. abmarginata. Bilbao.	ab. teinte grise. Aix.
ab. bande marginale grise effacée. Aix.	var. juliaria. Genève.
<i>Zonosoma punctaria.</i>	<i>S. tetralunaria.</i>
var. subpunctaria. S. France.	var. aestiva. Allem.
ab. ruficiliaria. Suisse.	<i>S. lunaria.</i>
var. delunaria. Autriche.	
<i>Z. porata.</i>	<i>Crocallis elinguaria.</i>
ab. dessins plus foncés. Aix.	ab. trapezaria. ?
<i>Pellonia vibicaria.</i>	<i>Angerona prunaria.</i>
ab. rouge répandu sur tout le bord des ailes. Aix.	ab. de 33 mm.
<i>P. calabraria.</i>	ab. ♂ rouge brique, rayures et dessins très noirs.
ab. bandes rouges très vives. Aix.	ab. ♂ jaune paille id. Aix.
var. tabidaria. Asie min.	ab. ailes infér. blanches. ?
<i>Stegania trimaculata.</i>	ab. sordiata ♂ et ♀. Aix.
ab. cognataria. Hongrie.	<i>Rumina luteolata.</i>
<i>Elloplia prosapiaria.</i>	ab. de 26 mm. Aix.
ab. prasinaria. Bohême.	<i>Macaria alternaria.</i>
<i>Abraxas marginata.</i>	ab. fond brun violacé. Aix.
ab. pollutaria. Aix.	<i>M. liturata.</i>
ab. lignes médiane composée de gros points noirs sur les 2 ailes (nigrofasciata?). Aix.	ab. fond brun violacé, ligne auté-marginale brun foncé, très marquée. Aix.
var. bicinctata. France (La Grave).	<i>Hybernia leucophaearia.</i>
<i>Metrocampa margaritaria.</i>	ab. marmorinaria. ?
ab. ♀ de 28 mm.	<i>H. defoliaria.</i>
ab. ♀ de 46 mm.	ab. obscura. Berne.
ab. ligne et espace médians teintés de brun. Aix.	<i>Amphidasis betularius.</i>
<i>Eugonia fuscantaria.</i>	ab. ♂ de 36 mm. (♀ 55 mm.). Aix.
ab. dessin effacé. Aix.	var. insularis (forma mixta). Dusseldorf.
ab. partie médiane très claire, partie marginale très foncée. Angleterre.	ab. Doubledayaria.
<i>E. quercinaria.</i>	ab. taches albines, une aile infér. albine, déformée. Angleterre.
ab. equestraria. Rhin.	<i>Nychiodes lividaria.</i>
<i>E. autumnaria.</i>	var. amasina. Amasie.
ab. points et bordure brun foncé. Aix.	<i>Synopsia sociaria.</i>
	ab. fond gris clair. Hongrie.

<i>S. serrularia.</i>	
var. <i>phaeoleucaria</i> .	Sarepta.
<i>Boarmia secundaria.</i>	
ab. de 30 mm.	Aix.
<i>B. crepuscularia.</i>	
var. <i>defessaria</i> .	Saxe.
<i>B. cinctaria.</i>	
ab. ♀ fond blanchâtre, dessins très noirs.	Aix.
ab. <i>consimilaria</i> .	S. France.
<i>B. gemmaria.</i>	
ab. ♀ dessins effacés.	
ab. ♂ dessins très noirs sur fond gris-noir.	Aix.
var. <i>perfumaria</i> .	Ecosse.
<i>B. consortaria.</i>	
var. toute noire, petit filet terminal blanc.	?
<i>B. repandata.</i>	
ab. <i>destrigaria</i> .	
ab. <i>conversaria</i> .	
ab. passage du type à ces 2. ab.	Aix.
<i>Gnophos glauccinaria.</i>	
var. <i>falconaria</i> .	
var. <i>plumbearia</i> .	Autriche.
<i>G. dilucidaria.</i>	
ab. (var.?) gris foncé.	Suisse.
<i>G. obscuraria.</i>	
var. <i>argillacearia</i> .	S. France.
<i>G. sordaria.</i>	
var. <i>mendicaria</i> .	Valais.
<i>G. asperaria.</i>	
var. <i>pityata</i> .	France.
<i>G. caelibaria.</i>	
var. <i>spurcaria</i> .	Neuchâtel.
<i>G. obfuscaria.</i>	
var. <i>canaria</i> .	Tyrol.
<i>Dasydia tenebraria.</i>	
var. <i>Wockearia</i> .	Tyrol.
<i>Eurranthis plumistaria.</i>	
ab. ♀ dessin effacé.	S. France.

<i>Ematurga atomaria.</i>	
ab. ♂ large bordure brun foncé.	
ab. ♀ dessin effacé.	
ab. ♀ dessin noir.	Aix.
ab. ♀ dessin noir, barre noire longitudin, au milieu de l'aile sup.	Italie.
<i>Selidosema ericotaria.</i>	
ab. brun foncé.	Angleterre.
<i>Phasiane clathrata.</i>	
ab. dessins noirs très larges.	Aix.
<i>P. glarearia.</i>	
ab. simple pointillé noir sur fond blanchâtre.	Vénétie.
<i>Ortholitha bipunctaria.</i>	
ab. teinte brune.	Berne.
ab. <i>gachtaria</i> .	
ab. dessins brun noir.	
var. <i>nigra</i> . (?)	Bilbao.
var. <i>maritima</i> .	Alpes mar.
ab. large bande médiane toute brune.	?
<i>Siona decussata.</i>	
ab. <i>fortificata</i> .	Hongrie.
<i>S. nubilaria.</i>	
var. <i>exalbata</i> .	Sarepta.
<i>Anaitis praeformata.</i>	
ab. dessins effacés.	Aix.
<i>A. paludata.</i>	
var. <i>imbutata</i> .	Poméranie.
<i>Eucosmia certata.</i>	
ab. brun rougeâtre.	Hesse.
var. <i>simplonica</i> .	Simplon.
<i>Lygris testata.</i>	
ab. de 23 mm.	Saxe.
<i>Cidaria bilineata.</i>	
ab. dessins effacés.	
ab. " très noirs.	Jura bernois.
<i>C. albula</i> .	
var. <i>griseata</i> . (?)	Aix,

<i>C. ferrugata.</i>	<i>C. salicata.</i>
ab. <i>spadicearia</i> . Jura bernois.	var. gris foncé. Aix.
<i>C. siterata.</i>	<i>C. hastata.</i>
ab. brune, dessins fondus. Jura bernois.	var. <i>subhastata</i> . Valais.
<i>C. sordidata.</i>	<i>C. flaviginetata.</i>
ab. <i>fusco-undata</i> .	var. brune. Jura bernois.
ab. brun verdâtre, dessins très marqués. Jura bernois.	<i>C. silaceata.</i>
<i>C. variata.</i>	ab. bande médiane noire (sans nervures blanches).
ab. dessins noirs.	Jura bernois.
ab. fond blanchâtre, de 33 mm.	<i>C. corylata.</i>
ab. <i>stragulata</i> . Jura bernois.	ab. dessins brun noir, très marqués, de 32 mm.
var. <i>obeliscata</i> . Saxe.	Jura bernois.
ab. dessins fondus. Jura bernois.	<i>C. dilutata.</i>
<i>C. trifasciata.</i>	ab. dessins très marqués en brun noir.
var. <i>literata</i> . Grisons.	ab. <i>obscurata</i> .
ab. dessins brun-noir sur fond blanchâtre.	var. <i>autumnata</i> . Jura bernois.
ab. dessins fondus. Jura bernois.	<i>C. caesiata.</i>
<i>C. nebulata.</i>	ab. <i>annosata</i> ? Jura bernois.
var. <i>achromaria</i> . (?) Aix.	<i>C. montanata.</i>
<i>C. truncata.</i>	ab. fond gris. Aix.
ab. brune, dessins fondus. ?	<i>C. unifasciata.</i>
ab. <i>perfuscata</i> . Angleterre.	ab. <i>aquilaria</i> . Autriche.
<i>C. immanata.</i>	<i>V. simulata.</i>
ab. foncée, petite. Angleterre.	var. <i>geneata</i> . France (Lautaret).
var. <i>scotica</i> . Ecosse.	<i>C. nigrofasciaria.</i>
<i>C. miata.</i>	ab. de 23 mm. Jura bernois.
ab. grise, dessins fondus.	<i>Eupithecia subvulvata.</i>
ab. vert foncé, dessins noirs. Jura bernois.	ab. <i>oxydata</i> . Wiesbaden.
	<i>E. pumilata.</i>
	var. <i>pauxillaria</i> . Bilbao.

