

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 11 (1903-1909)

**Heft:** 1

**Artikel:** Une observation biologique

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-400628>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

- Torymus speciosus* Boh., aus *Hormomya fagi*.  
 — *regius* Nees — *longicaudii* Rtzb., aus *Cynips folii* und *baccarum*.  
 — *azureus* Boh., Parasit von *Grapholita strobilella*.  
 — *macropterus* Walk., aus *bedeguar* und *lasioptera rubi*.  
 — *hieraci* Mayr.  
 — *abdominalis* Boh. (*medius* Först.), aus *Cynips divisa*.  
 — *congener* Först.  
 — *nobilis* Boh.?  
 — *viridis* Först.  
 — *hibernans* Mayr.  
 — *auratus* Fonse. (*muscarum* Ness.), aus *terminalis* und *seminationis*.  
 — *flavipes* Walk., aus *curvator*.  
 — *apionis* Mayr (*Holaspis apionis* Mayr).

- Torymus militaris* Boh. (*Holaspis*).  
*Megastigmus bipunctatus* Boh., auf *Andricus fecondatrix*.  
 — *dorsalis* Rtzb., auf *C. folii* und *terminalis*.  
*Criptopristus caliginosus* Walk.  
*Monodontomerus aereus* Walk., aus *Chalicodoma muraria*.  
 — *obscurus* Westw.  
*Dimorus Kollari* Först., seltene *yo* Art.  
*Oligostenus stigma* F. (*Oligostenus ater*), aus Rosen-gallen.  
*Perilampus aeroviridis* Steph.  
 — *violaceus* Ltr.  
 — *auriceps* Steph.  
 — *laevifrons* Dalm.  
*Halticella armata* Pz. *yo*  
*Chalcis flavipes* Pz.  
 — *minuta* L.

### Evaniden.

- Evania minuta* F., kommt in sumpfigen Gegenden vor.  
 — *flavipes* Curt.

*Foenus foveolatus* Schlechterer.

- Foenus Thomsoni* Schlechterer.  
 — *granulithorax* Fournier.  
 — *asectator* F. *T.*

### C. Bloesch.

### Une observation biologique.

Lors d'une excursion que je fis le 13 septembre de l'année dernière, dans le but de récolter des Cécidies de Cynipides, je rapportai une feuille de chêne sur laquelle était fixé la peau d'une chenille de Noctuelle dont je ne pus reconnaître l'espèce. — Cette peau était entourée de laryes d'un blanc jaunâtre qui venaient de sortir de cette chenille) et étaient disposées autour d'elle à des distances parfaitement égales entre elles, formant sur la feuille, un cercle régulier autour de leur victime.

Je déposai le tout sous un verre afin de pouvoir observer la suite plus facilement.

Le jour suivant chacun de ces petits vers avait déposé sur la feuille, en dehors de la place où ils étaient posés, un

1) pas exact : parasite externe.  
*Ch. T.*

petit tas de grains verts, les excréments que ces vers avaient amassés dans la chenille pendant tout le temps de leur existence dans cette dernière.

Ces vers restèrent dans la position indiquée, et trois jours après ils étaient en chrysalides, à l'exception d'un seul qui se transforma le jour suivant.

Ces chrysalides, au nombre de 25, d'un noir brillant, sans cocon, et présentant une tête et des formes anguleuses restèrent ainsi sur la feuille déséchée jusqu'au mois d'avril de l'année suivante où elles éclosent toutes en même temps.

L'insecte parfait est un Chalcidite du groupe des Eulophides, le Cratotechus larvarum L.

Une observation analogue que je fis sur une espèce du même groupe: l'Eulopus dominicensis Först. dont les larves vertes, au nombre de 30, sortirent en septembre d'une chenille de Mamestra persicariae, pratiquent sur cette chenille, pour en sortir, des trous de tous côtés, se fixent dans l'ordre et se chrysalident comme les précédentes.

La vie de ces parasites, et des parasites en général, me suggère une remarque assez intéressante que je n'ai encore trouvée dans les auteurs traitant de ces parasites.

Elle concerne les fonctions de ces espèces.

C'est leurs évacuation fécale qui ne s'effectue que lors de leur sortie du corps de leur victime, comme j'ai pu l'observer chez ces Eulophides.

Je me demande si ce genre de parasites, notamment les grandes espèces, absorbent les sucs nécessaires à leur auroissement, sans déjection aucune, durant le temps qu'ils passent dans le corps d'un autre insecte, ou si ces espèces conservent ces déjections jusqu'au moment où elles arrivent à l'extérieur pour se chrysalider? — Je crois que des observations en ce sens seraient des plus intéressantes.