**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

**Entomological Society** 

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 11 (1903-1909)

Heft: 1

Artikel: Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer

Autor: Stierlin

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-400629

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer. Von Dr. Stierlin.

# Ceutorhynchus Poncyi Stl.

Ovatus, convexus, niger, supra nigro-subvirescens, nigro hirsutulus, subtus parce albido squamosus, rostro tenui, basi rugoso-punctato, apicem versus obsolete tricarinato, antennarum scapo apice abrupte dilatato, prothorace crebre punctato, canaliculato, constricto, bituberculato, elytris nigro-virescentibus, tenuiter subpunctato-striatis, interstitiis latis, planis, dense punctulatis, apice asperis, pedibus nigris, tarsis testaceis, femoribus denticulo minuto armatis. Long.  $2^{1}/_{2}$ —3 mm. Rumänien.

Dem C. timidus Weise am nächsten, durch die dunkel schwarzgrünliche Farbe, die schmal gestreiften Flügeldecken mit breiten, ebenen, sehr dicht punktierten Zwischenräumen, die

schlanken Beine, die gelben Tarsen verschieden.

Eiförmig, convex, schwarz, die Flügeldecken mit schwach erzfärbigem Schimmer und mit feiner, abstehender schwärzlicher Behaarung, Unterseite dünn weisslich beschuppt. Rüssel gebogen, mit drei feinen erhabenen Streifen, die an der Basis undeutlich werden durch dichte, kräftige Punktierung; von der Mitte an tritt ein mittlerer Streif etwas deutlicher hervor, so dass der Rüssel undeutlich gekielt erscheint, an der Spitze ist er glatt.

Halsschild dicht und stark punktiert, mit starker Mittelfurche und kleinen Seitenhöckern, vor der Spitze tief einge-

schnürt.

Flügeldecken schwarz, mit dunkel-erzfärbigem Schimmer, die Behaarung schwärzlich, halb aufgerichtet, die Streifen schmal, etwas undeutlich punktiert, die Zwischenräume breit, eben, dicht und fein unregelmässig punktiert, vor der Spitze stark runzlig gehöckert, Unterseite dicht punktiert und mit schmalen, schuppenähnlichen, anliegenden weissen Börstchen nicht dicht bekleidet, Beine ziemlich kräftig, alle Schenkel mit schwachem Zähnchen vor der Spitze, die Tarsen gelb.

## Otiorh. viridisetosus Stl.

Oblongus, niger, nitidus, setulis viridibus maculatim vestitus, rostro tenuiter carinato, antennarum funiculi articulo secundo primo duplo longiore, thorace longitudine paulo latiore, confertim granulato, elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, interstitiis planis, confertim granulatis, setulisque depressis viridibus maculatim adspersus, femoribus muticis. Long. 8 mm.

Länglich eiförmig, schwarz, mit anliegenden grünen Borsten gefleckt, die an den Seiten des Halsschildes etwas dichter stehen und auf den Flügeldecken Flecken bilden. Rüssel etwas länger als breit, oben eben mit feinem Längskiel, Fühler lang und kräftig, alle Geisselglieder länger als breit, das zweite doppelt so lang als das erste, Halsschild wenig breiter als lang, seitlich gerundet, etwas hinter der Mitte am breitesten, nicht dicht an die Flügeldecken anschliessend, dicht und ziemlich kräftig gekörnt, Flügeldecken oval, um die Hälfte länger als breit, kräftig punktiert-gestreift, die Zwischenräume eben, runzlig gekörnt; Beine kräftig, Schenkel verdickt, aber nicht gezähnt. Schienen gerade, nur an der äussersten Spitze etwas einwärts gekrümmt. Kaukasus, von Hrn. König eingesendet.

Dem Ot. caucasicus in Grösse und Gestalt sehr ähnlich, durch etwas längern Rüssel, das viel längere zweite Geisselglied der Fühler, die grüne Färbung der Borsten und die ganz

schwarzen Beine verschieden.

### Otiorh. antarcticus Stl.

Oblongo-ovatus, nigrobrunneus, antennis pedibusque brunneis, rostro tenui, sulcato, oculis planiusculis, antennarum funiculi articulo primo duobus sequentibus longitudine aequali, ultimo crasso, ovato, articulis intermediis minutis rotundatis; thorace latitudine paulo longiore, rotundato punctato, antice posticeque truncato, elytris ovatis, profunde puuctato-striatis, interstitiis elevatis, obsolete setulosis, femoribus omnibus crassis, aequalibus, muticis, unguiculis simplicibus, separatis. Long. 2 mm.

Länglich eiförmig, dunkelbraun, der Vorderrand des Halsschildes, Fühler und Beine heller braun; Rüssel dünn, mit gut entwickelten Pterygien und Mittelrinne, Augen ziemlich flach, das erste Geisselglied der Fühler so lang als die zwei folgenden zusammen, dick, das letzte sehr gross, eiförmig, die mittleren klein, kugelig, Halsschild wenig länger als breit, seitlich gerundet, in der Mitte am breitesten, vorn und hinten gleich breit und gerade abgestutzt, oben ziemlich kräftig, etwas ungleich punktiert, Flügeldecken oval, 1½ mal so lang als breit, tief punktiert-gestreift, die Zwischenräume gewölbt, mit sehr kleinen, anliegenden Börstchen spärlich bekleidet, alle Schenkel gleich stark, dick, ungezähnt, Schienen gerade, an der Spitze nicht erweitert und ohne Zähne, Klauen einfach, getrennt. — Länge 2 mm. Südlichste Spitze vom Patagonier-Land. Von der belgischen Südpolar-Expedition aufgefunden.

Durch die stark entwickelten, ungezähnten Vorderschenkel

in die 2. Rotte der Untergattung Tournieria gehörend.