

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss  
Entomological Society

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 17 (1937-1939)

**Heft:** 1-2

  

**Artikel:** Captures intéressantes d'Hémiptères du Valais

**Autor:** Cerutti, Nestor

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-400860>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Captures intéressantes d'Hémiptères du Valais.

Par

Le Chanoine Nestor CERUTTI, Martigny.

Si la faune des Coléoptères et des Lépidoptères du Valais a été abondamment étudiée, grâce surtout aux chasses et aux travaux du Chanoine Emile Favre, celle des Hémiptères, Cicadines et Psyllides, ne l'a été qu'imparfaitement. Nous pouvons le dire, malgré les intéressantes publications faites par Emile Frey-Gessner, dans les années 1863—1871 du présent Bulletin. Depuis cette date, silence presque complet sur les Hémiptères du Valais.

Nous chassons cette classe d'insectes depuis plus de 25 ans. Malheureusement (au point de vue entomologique), le temps que nous avons pu y consacrer a été très limité jusqu'ici. Nous profitons actuellement du loisir et des facilités qui sont enfin venues, pour continuer nos chasses et étudier à fond et de façon suivie le matériel récolté. Nous sommes enchanté des choses intéressantes que nous y trouvons. Nous réservons ici à notre Bulletin, la primeur de quelques unes de nos trouvailles.

*Stagonomus pusillus* H. S. Versant sud du Grand Saint Bernard (3 juillet et 6 septembre) à terre, sous les feuilles de *Verbascum Thapsus*.

*Picromerus conformis* H. S. Déjà signalé à Inden par Frey-Gessner — à Sierre par Puton. — J'en ai capturé un exemplaire à Finges le 6 mai 1931, jusqu'à 1600 m.

*Arenocoris spinipes* Fall. Signalé dans les Grisons, par Frey-Gessner. — Martigny (fin mai) — Briey sur Chippis (26 mai 1917) — Vermala, 1500 m. (fin avril et 20 mai 1935).

*Ceraleptus obtusus* Brullé. Indiqué par Oshanin de la S.R.Mt. — Martigny (fin mai 1913 et 22 juillet 1917).

*Ceraleptus gracilicornis* H. S. Trouvé à Sion par Frey-Gessner, et récolté assez couramment par moi dans la région de Martigny en juin et juillet.

*Loxocnemis dentator* F. Signalé à Viège par Frey-Gessner. — Il se trouve en abondance par places à Fully, Sierre, Saillon et dans toute la Vallée d'Entremont jusqu'à 1000 m., en mai, juin, et ensuite en août avec sa larve sous les feuilles d'*Ononis natrix*.

*Bothrostethus annulipes* Costa. Nouveauté pour la Suisse. Trouvé dans la Contrée de Sierre, à 1000 m. le 22 mai 1935.

*Pyrrhocoris marginatus* Klti. Pas encore signalé en Suisse. Trouvé d'abord deux exemplaires à Finges le 16 juin 1929 et le 6 mai 1930. — Retrouvé ensuite les années 1931 à 1935, de fin mai à fin octobre dans toute la région de Montana jusqu'à 1600 m., sous des pierres ou courant dans les chemins. — Les premiers

individus trouvés à fin mai sous des pierres, étaient in copula. — Une colonie de larves établies à 1600 m., ont donné l'insecte parfait au commencement d'août. — Observation qui pourra être intéressante: un individu trouvé sous une pierre le 20 octobre, avait son rostre planté dans une oothèque de blatte. S'en nourrirait-il?

*Arocatus Roeseli* Schill. Martigny et Sembrancher.

*Ischnorhynchus resedae* Pnz. A propos de cette espèce, je veux tout simplement signaler que le Rhododendron ferrugineum, peut être aussi sa plante nourricière. — A Bourg-St-Pierre, 1600 m., le 23 octobre 1929, toute une colonie comprenant insectes parfaits et larves à tous les degrés, couvrait la face inférieure des feuilles de plusieurs arbrisseaux de cette espèce. Qu'on se représente la couleur de l'insecte, et la couleur rouille des feuilles de Rhododendron, et on y trouvera la réalisation d'un mimétisme chromatique parfait. — De nombreux spécimens de cet insecte, recueillis il y a de nombreuses années par le Chanoine Camille Rosset (mort en 1884), dans le Vallon de Menouve de la Vallée d'Aoste, l'ont été également sur des Rhododendrons.

*Pterotmetus staphylinoïdes* Burm. Signalé de Locarno par Puton. — Capturé un peu partout: Martigny, Salvan, Trient, Ravoire, St-Luc, Fully, jusqu'à 1700 m.

*Trapezonotus anorus* Flor. Nouveauté pour la Suisse! Martigny, mi-août 1910 et 21 juin 1936.

*Aphanus vulgaris* Schill. Frey-Gessner écrivait au sujet de cette espèce: « nur drei Exemplare von der Schweiz bekannt. » — Depuis lors, le Dr B. Hofmänner capturait deux autres exemplaires au Parc National des Grisons. — J'ai pris un exemplaire à Martigny le 27 avril 1931, et un autre exemplaire à Randogne sur Sierre le 28 mai 1933.

*Drymus pilicornis* Mls. Déjà signalé de Suisse. — En Valais, capturé à Sembrancher sous une touffe de germandrée (*Teucrium Chamaedrys*), le 12 septembre 1921.

*Eremocoris fenestratus* H. S. Martigny, sous des pierres, mi-avril 1936.

*Metatropis rufescens* H. S. Nouveau pour le Valais. Martigny, fin juillet 1936.

*Tingis auriculata* Costa. Déjà signalée de Sierre. — Se trouve fréquemment à Martigny, dès le mois d'avril, sur *Chaerophyllum Cicutaria*.

*Tingis crispata* H. S. Pas encore signalée en Suisse. — Chippis, Martigny, sur *Artemisia absinthium* et *vulgaris*, en mai, juin, août et septembre.

*Tropidochila pilosa* Humm. Martigny et Chippis, sur *Galeopsis Tetrahit*.

*Catoplatus Fabricii* Stal. Déjà signalé à Viège. — Pris à Issert, dans le Val Ferret, le 20 août.

*Oncochila simplex* H. S. Val Ferret, Vollèges, Loèche les Bains, en août et septembre.

*Galeatus spinifrons* Fall. Martigny, sur *Artemisia campestris*.

*Ploiariola vagabunda* L. Sembrancher, sur sapin, in copula.

*Ploiariola Baerensprungi* Dhr. Nouveauté pour la Suisse. — Sembrancher, sur du vieux bois, insectes parfaits et larves, mi-septembre 1920.

*Pygolampis bidentata* Goeze. Ecône, 23 mai.

*Deracocoris trifasciatus* L. Contrée de Sierre, 900 m.

*Plagiorrhama suturalis* H. S. Nouveau pour la Suisse. Martigny, fin août 1920 et Coteau de Ravoire, 800 m.

*Allodapus rufescens* Burm. Sembrancher, mi-juillet 1917.

*Omphalonotus quadriguttatus* Kbm. Nouveau pour la Suisse. Randogne, fin septembre 1934.

*Globiceps dispar* Boh. Signalé à Bérissal par Puton. — Retrouvé Vermala, 1600 m., le 15 septembre 1934.

*Reuteria irrorata* Say. Nouveau pour la Suisse. — Dans la région de Sierre-Montana, vers 1200 m. — Au début du mois d'août, la larve donne l'insecte parfait, qu'on trouve depuis lors jusque à fin septembre, sur les chênes.

*Paralimnus rotundiceps* Leth. Ecône, mi-septembre.

*Paralimnus (Scaphoideus) formosus* Boh. Lens, 6 sept. 1933.

*Erythria Manderstjernai* Kbm. Espèce déjà signalée de Sierre. Espèce excessivement commune en Valais, de la plaine à la montagne, mais surtout dans les clairières des forêts de la région alpine. — Elle est encore abondante à 2000 m., et on la trouve même au Grand Saint Bernard, (2472 m.) où, des cicadelles, elle est la première à se réveiller de sa torpeur hivernale.

*Bactericera Perrisi* Put. Nouvelle pour la Suisse. Sembrancher (13 octobre), Randogne (comm. octobre 1934), Martigny (comm. novembre 1935): sur *Artemisia campestris*.

*Aphalara pilosa* Osh. Nouvelle pour la Suisse. — Martigny (fin juillet 1921), Montana, 1200 m., (28 août 1935), sur *Artemisia campestris*.