Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 25 (1952)

Heft: 3

Artikel: Infestation du Trèfle violet en Suisse romande par Bruchidius varius Ol.

(Col. Bruchid.)

Autor: Murbach, R.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-401162

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Infestation du Trèfle violet en Suisse romande par Bruchidius varius Ol. (Col. Bruchid.)

par

R. Murbach

Stations fédérales d'essais agricoles, Lausanne

Les capitules du Trèfle violet sont attaqués par plusieurs insectes, dont les larves vivent aux dépens des graines en formation, occasionnant ainsi des pertes sensibles à la production de semences. Ces dégâts sont attribués, dans notre pays, à deux espèces du genre Apion exclusivement: A. apricans HRBST. et A. aestivum GERM.

Cependant, une enquête entreprise en automne 1948 pour préciser le degré d'infestation des champs destinés à la production grainière en Suisse romande nous a permis de constater que les Apions ne sont pas seuls responsables des pertes de récolte. En fait, l'examen des premiers échantillons prélevés dans des cultures du canton de Genève révéla la présence inattendue, dans les capitules de Trèfle, d'un autre Coléoptère, de la famille des Bruchides (fig. 1).




Fig. 1. — Bruchidius varius Ol. — Mâle grossi env. 25 fois

Nous renvoyons, pour sa description détaillée, à l'ouvrage de HOFFMANN (1945)¹, qui le classe dans le sous-genre *Bruchidius* SCHILSKY, espèce *varius* OL. ²

¹ HOFMANN, A. Coléoptères Bruchides et Anthribides. Faune de France, 44. Paris, 1945.

² Nous tenons à remercier ici MM. A. HOFMANN, chef du Laboratoire de faunistique agricole du C. N. R. A., à Versailles, Ch. Ferrière, du Musée d'histoire naturelle à Genève, et A. LINDER, instituteur à Ortschwaben, qui ont bien voulu vérifier et confirmer notre détermination.




Fig. 2. — Larve à l'intérieur d'un capitule de *Trifolium pratense*.

L'examen des échantillons de capitules de Trèfle prélevés dans de nombreux champs de diverses régions romandes en 1948, 1950 et 1951 nous autorise aujourd'hui à donner quelques indications sur la répartition géographique de B. varius OL. et sur le degré d'infestation relatif des cultures.

Vraisemblablement, cette Bruche est répandue principalement dans le Bassin lémanique; nous l'avons effectivement trouvée dans la totalité des champs prospectés du canton de Genève et de La Côte. En outre, nous l'avons rencontrée dans presque toutes les localités du pied du Jura, entre Borex et Vuitebœuf, de même que dans la région de Cossonay et plus rarement, dans

le Gros-de-Vaud. Par contre, B. varius Ol. n'a pas été décelé jusqu'ici dans le reste de la Suisse romande.

Le degré d'infestation des champs de Trèfle varie beaucoup d'une région à l'autre. D'après nos observations, il est relativement élevé dans le canton de Genève et diminue progressivement en direction du NE. Il devient pratiquement nul lorsqu'on s'éloigne du Bassin lémanique. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1948 la proportion de capi-

tules attaqués par *B. varius* OL. dépassait 50% dans le canton de Genève, pour tomber à 30% dans le district de Nyon, puis à 5% dans les districts d'Aubonne et de Morges et, enfin, à 2-3% dans la région de Cossonay-Yverdon.

Les dégâts de *B. varius* OL. sont de même nature que ceux des Apions, c'est-à-dire que les larves se nourrissent des jeunes fruits de *Trifolium*. Chaque larve en consomme plusieurs jusqu'à son complet développement et l'on trouve généralement plusieurs larves dans chaque capitule. Par exemple, dans un échantillon de 200 capitules récolté en août 1951,



Fig. 3. — Nymphe.

nous avons dénombré un total de 440 insectes. On peut en déduire que B. varius Ol. est sans doute capable de provoquer des dégâts économiquement significatifs.