Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 27 (1954)

Heft: 1

Artikel: Un Lépidoptère nouveau pour la Suisse : Chytolita cribrumalis Hb. (Phalaenidae-Hypeninae)

Autor: Bros, Emmanuel de

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-401205

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE
Band XXVII Heft 1 15. März 1954

Un Lépidoptère nouveau pour la Suisse : Chytolita cribrumalis HB. (Phalaenidae-Hypeninae)

par

EMMANUEL DE BROS
Binningen et Versoix

Cette Noctuelle blanchâtre, qui se distingue immédiatement des autres Hypeninae par son faciès très caractéristique (CULOT, Noctuelles, vol. II, pl. 79, fig. 17), n'est mentionnée dans VORBRODT qu'en note (Die Schmetterlinge der Schweiz, vol. I, p. 442 : ? *Herminia cribrumalis* HB. Nach dem alten Staudinger-Katalog, von Zürich und von Bevers (Z.-R.) ; bedarf sehr der Bestätigung) et ne figure dans aucun des six suppléments parus par la suite dans le Bulletin de la S.E.S.

Or, lors d'une chasse à la lampe à vapeur de mercure avec mon ami PAUL MARTIN, à Pont-Céard près de Versoix (canton de Genève), le 20 juillet 1953, nous avons pris vers 22 h. 30, posée sur l'écran trempé de rosée, une « Hypenide » qui nous a immédiatement frappés tous les deux par son aspect insolite. Lors de la détermination de mes captures cet automne, j'ai constaté sans peine qu'il s'agissait d'un mâle défraîchi de cette espèce.

Le lieu de capture est un pré sec et maigre, en bordure de la voie ferrée, pas trop éloigné de biotopes humides (ruisseau et canal).

Dans toute la littérature que j'ai compulsée, je n'ai trouvé aucune mention de capture de *C. cribrumalis* HB. en Suisse. SEITZ (Paléarctiques, vol. III, p. 421) écrit pourtant « Überall in Europa ». SPULER (vol. I, p. 327, *H. cribralis* HB.) était toutefois plus réservé : « Strichweise durch Mitteleuropa, in Sumpfgegenden ». C'est LHOMME (Cat. des Lép. de France et Belgique, p. 332, n° 901, dont j'adopte la nomenclature) qui donne le plus de détails. « France, presque partout, juin ; rare » (d'après la cote). Cet auteur mentionne treize départements (plus trois aux Addenda, p. 737), dont les plus proches de notre pays sont le Rhône (Marais de Saint-André, près de Limonest ; ROMAN) et le Haut-Rhin (DE PEYERIMHOFF).

En Alsace, l'espèce est certainement très rare : DE PEYERIMHOFF (3e édition, p. 143) ne l'a capturée qu'une fois (Forêt de Wendenheim) et FISCHER de Mulhouse jamais. MACKER ajoute : « La Chapelle, rare ». Pour la Bavière, OSTHELDER (Die Schmetterlinge Südbayerns, p. 368) ne mentionne, en note seulement, qu'une capture, douteuse. *C. cribrumalis* HB. n'est pas citée dans la liste de HELLWEGER pour le Tyrol du Nord. Pour le Tyrol du Sud, KITSCHELT (p. 243) signale une seule capture (Etschtal, 30 juillet 1914).

La chenille vit dans les tiges de joncs et de roseaux, sur *Salix*, *Carex silvatica*, *Luzula* (LHOMME).

Aucun des collègues de Genève, Bâle et Berne que j'ai interrogés n'a jamais pris cette espèce. Elle semble donc nouvelle pour la Suisse — « semble » puisque la littérature consultée est assez ancienne et que je n'ai, bien entendu, pas vérifié toutes les collections suisses, privées ou publiques.

D'après ce que nous savons de *C. cribrumalis* HB., sa présence en Suisse serait toutefois parfaitement normale, et il ne resterait qu'à trouver une explication pour sa rareté : ignorance de sa biologie exacte, insuffisance des chasses à la lampe dans les régions marécageuses, ou progrès de l'assèchement des marais ? Sa capture à Versoix prouve toutefois que même une région dont la faune lépidoptérologique est aussi bien inventoriée que la plaine genevoise, recèle encore des espèces peu connues, et que les chasses banales de simples collectionneurs-amateurs peuvent toujours contribuer à compléter nos connaissances !