Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 41 (1968)

Heft: 1-4

Artikel: Sul genere Myzinella Giuglia (1959): descrizione della femmina

(Hymenoptera : Tiphiidae)

Autor: Guiglia, Delfa

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-401555

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Sul genere Myzinella GUIGLIA (1959)

Descrizione della femmina (Hymenoptera: Tiphiidae)

Delfa Guiglia

Museo Civico di Storia Naturale, Genova

Il genere Myzinella Guiglia fu originariamente descritto di Cufra (el Tallab, Cirenaica) in base al solo maschio (Guiglia, 1959); in seguito fu ritrovato dal Dr. K. V. Krombein (« United States National Museum », Washington) in Egitto (Kom Oshim, Dakhla Oasis), ciò che ha permesso un ulteriore studio del genere stesso (Guiglia, 1966).

Nell'Aprile del 1967 K. V. Krombein, durante un viaggio di ricerche nel Sudan, catturò un'altra serie di esemplari della specie genotipica fra i quali ho potuto individuare la femmina, fino ad ora sconosciuta, che descrivo nella presente nota.

Desidero rinnovare i miei ringraziamenti al Dr. K. V. KROMBEIN per il suo prezioso contributo alla conoscenza dell'interessante genere in questione.

Myzinella patrizii Guiglia

Figg. 1, 2, 3, 4

Myzinella patrizii Guiglia, 1959, pp. 2-5; Tav. I e figg. 1, 3, ♂. — Guiglia, 1966, pp. 90-91; figg. 1, 2, 3.

« Sudan : Gebel Oweinat Wadi el Brins, April 9–12, 1967 » : 16 33

 $1 \supseteq (Allotypus) \text{ leg. K. V. Krombein.}$

Nei maschi sopra citati la macchia gialla mediana sul mesonoto può essere più o meno estesa fino a scomparire completamente (4 esemplari), per il resto le variazioni cromatiche sono lievi. La statura oscilla da un massimo di 8 mm ad un minimo di 6 mm circa.

♀ (Allotypus) (fig. 1). — Nera, ferruginea e ferruginea rossastra. Sono ferruginee le seguenti parti : le mandibole (l'apice è bruno), lo scapo delle antenne (il funicolo è rosso bruno, più chiaro sulla faccia inferiore), il pronoto, le tegule (queste sono più debolmente colorate). Sono nere le seguenti parti : gli occhi, gli ocelli, il torace (eccettuato il pronoto). L'addome è bruno con zone a mo' di fascie a sfumature ferruginee.

Pubescenza particolarmente abbondante dietro il capo, robusti peli neri si osservano pure sulla fronte e sullo scapo delle antenne; egualmente robusti ed irti sono i peli del pronoto; sulle zampe questi sono più chiari e sull'addome visibilmente più fini e più radi.




Fig. 1 e 2. Myzinella patrizii Guiglia. — 1. ♀ (allotypus). — 2. ♀, capo.

Capo (fig. 2) subquadrangolare ad angoli arrotondati e superficie lucida, la sua larghezza supera quella del torace. Gli ocelli posteriori distano dalle orbite di uno spazio maggiore di un terzo circa della distanza fra essi e l'ocello anteriore. Occhi glabri e, visti di profilo, due volte circa più lunghi che larghi. Antenne ad articoli mediani del funicolo subquadrati.

Torace: lucido, pronoto a lati leggermente convergenti in alto. Mesonoto a solchi bene marcati. Scutello a punti finissimi ed assai rari. Epinoto con la porzione dorsale a microscopico reticolo su cui, sul primo terzo anteriore, si sovrappongono pochi punti; le parti laterali presentano una striatura nell'insieme fitta, regolare e fina.

Ali trasparenti a riflessi madreperlacei. Stigma due volte circa più lungo che largo e fornito di setole marginali. Venulazione come nelle figg. 3, 4.

Zampe con robusti peli neri frammisti a peli giallastri. Tibie posteriori gradatamente dilatate verso l'apice con il più grande dei speroni più breve di un terzo circa del primo articolo tarsale.

Addome una volta e mezzo circa più lungo del torace, fusiforme e ad apice acuto; superficie lucida con microscopico reticolo fondamentale al quale si sovrappongono pochissimi e finissimi punti sparsi.

Lungh.: 5 mm.

L. MASI (1933) attribuisce al Genere Hemimeria (SAUSSURE 1892) un esemplare femmina di Cufra (El Talab) che descrive come specie nuova (Hemimeria lybica) mettendo in evidenza la notevole differenza che separa questa specie da quelle menzionate dal SAUSSURE (« Meria semirufa » GERSTAECKER e « Myzine Savignyi » Guérin) ed aggiungendo come essa abbia « spiccata apparenza di Bethylidae, specialmente nel dorso del torace, assai più marcata che nelle altre specie del gruppo finora descritte ».




Fig. 3 e 4. Myzinella patrizii Guiglia. — 3. ♀, ala anteriore. — 4. ♀, ala posteriore (il lobo anale è mancante).

Dall'esame dell'esemplare tipico (Coll. Museo di Genova) appare evidente come questa femmina non possa venire riferita al Gen. Hemimeria Saussure ma corrisponda invece alla femmina del Gen. Myzinella in questa nota descritta.

Riguardo ai rapporti fra le due specie : lybica e patrizii è difficile pronunziarsi poichè trattandosi di esemplari unici non è possibile

stabilire i limiti di variabilità delle specie stesse.

L'errata interpretazione di L. MASI è facilmente spiegabile quando si pensa che nel lontano 1933 esisteva in seno alla sottofamiglia *Myzininae* non poca confusione e le nostre conoscenze sulle diverse specie erano scarse e frammentaria. E' solo difatti grazie agli studi di questo

ultimo decennio (Guiglia, 1965, p. 118) che la sistematica del gruppo è stata, almeno in parte, chiarita.

LAVORI CITATI

- Guiglia, D., 1959. Contributo alla conoscenza delle Myzininae del Nord Africa (Hymenoptera: Tiphiidae). Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, LXXI, pp. 1-26; 13 figg., 6 tavole.
- 1965. Osservazioni sulla posizione sistematica di alcune Meria e tabella per la determinazione delle specie.
 Mitt. Schweiz. Ent. Ges., XXXVIII, N. 1 e 2, pp. 106-119 · 6 figg
- 1966. Un nuovo reperto di Myzinella patrizii Guiglia ed osservazioni sulla posizione sistematica del Gen. Myzinella Guiglia. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, LXXVI, pp. 90-92; 3 figg.
- MASI, L., 1933. Spedizione scientifica all'Oasi di Cufra. Descrizione di una nuova specie di Hemimeria (Hymen, Scoliidae). Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, LVI, pp. 341-346.
- SAUSSURE (H. DE), 1892. Histoire Naturelle de Madagascar. In Grandidier, XX, 1, Hymen., p. 249.