Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 45 (1972)

Heft: 4

Artikel: Note sur les Pachygnatha (Araneae : Tetragnathidae) de la péninsule

ibérique

Autor: Senglet, Antoine

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-401693

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Band 45 (1972) Heft 4

NOTE SUR LES PACHYGNATHA (ARANEAE: TETRAGNATHIDAE) DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

ANTOINE SENGLET

c/o Muséum d'histoire naturelle, Route de Malagnou, CH-1211 Genève 6

Dans les 160 récoltes faites par moi-même en 1969 et 1971, j'ai trouvé un certain nombre de *Pachygnatha* dont quatre espèces nouvelles. Celles-ci diffèrent sensiblement des trois espèces européennes connues, par l'armature des chélicères chez le \circlearrowleft , et pour la \circlearrowleft par la vulve dont le réceptacle médian est très développé, alors qu'il est réduit (*P. degeeri* Sund.) ou absent (*P. listeri* Sund. et *P. clercki* Sund.) selon Wiehle (1963: 65, 75, fig. 106, 114, 123 et 124). La vulve dont seuls les réceptacles latéraux sont chitinisés est malaisée à observer en milieu très réfringent sans éclairage particulier (contraste de phase, Wiehle, 1963: 65, 75). Par contre dans l'alcool, les parties membraneuses sont relativement opaques et particulièrement faciles à examiner sous la loupe binoculaire à partir d'un grossissement de 20-30 fois. Il est impossible de différencier les \circlearrowleft de ces quatre espèces sans un examen des vulves.

Pachygnatha degeeri SUNDEVALL

Très commune; capturée dans la majorité des récoltes en toutes régions.

Pachygnatha clercki SUNDEVALL

Espagne. Prov. Sevilla: Alcala del Rio, 22. 6. 1969, $1 \circlearrowleft$, $1 \circlearrowleft$, $1 \circlearrowleft$. Prov. Valencia: La Albufera, 16. 6. 1971, $1 \circlearrowleft$. Prov. Salamanca: Salamanca, 22. 8. 1971, $11 \circlearrowleft$, 8 \circlearrowleft . Prov. Zamora: Zamora, 25. 8. 1971, $3 \circlearrowleft$. Prov. Leon: La Bañeza, 26. 8. 1971, $16 \circlearrowleft$, $2 \circlearrowleft$. Prov. Segovia: La Granja, 29. 8. 1971, $1 \circlearrowleft$, $1 \circlearrowleft$. Portugal. Prov. Vila Real: Vilarandelo—Lourenço, 29. 8. 1969, $1 \circlearrowleft$. Prov. Aveiro: Torreira/Murtosa, 3.9. 1969, $3 \circlearrowleft$. Prov. Leiria: San Martinho/Nazaré, 6.9. 1969, $1 \circlearrowleft$, $1 \circlearrowleft$.

Citée de Catalogne et de Galice (Galiano, 1910: 356 et Perez, 1947: 452), cette espèce qui semble être courante au nord de la cordillère centrale (présente dans quatre récoltes sur six), paraît rare dans le reste de la péninsule, où je ne l'ai capturée que sur les côtes (Valence et Portugal) et dans la basse vallée du Guadalquivir.

Pachygnatha simoni n. sp. (fig. 1 à 5, 15 et 16)

Espagne. Prov. Salamanca: Puente Alagon/Sequeros, 13.8.1971, 1 \circlearrowleft holotype, 1 \circlearrowleft allotype, 5 \circlearrowleft et 6 \circlearrowleft paratypes. Prov. Avila: Becedas/El Barco, 14.8.1971, 4 \circlearrowleft et 4 \circlearrowleft paratypes; Hoyo del Espino/Gredos, 15.8.1971, 1 \circlearrowleft . Prov. Càceres: Jerte, 24.8.1969, 2 \circlearrowleft et 2 \circlearrowleft paratypes; Jarandilla, 23.8.1969, 1 \circlearrowleft paratype. Prov. Segovia: La Granja, 29.8.1971, 6 \circlearrowleft et 13 \circlearrowleft paratypes. Prov. Teruel: Albarracin, 3.9.1971, 4 \circlearrowleft et 10 \circlearrowleft paratypes.

302 A. SENGLET

Espèce vivant sous la végétation près de l'eau, dans les mêmes conditions que *P. clercki* Sund. et parfois mêlée à cette dernière (La Granja). Elle ne s'en distingue pas à première vue, si ce n'est par sa taille légèrement plus grande. Sa zone de répartition semble liée à la cordillère centrale, prolongée à l'est jusque dans les montagnes de la province de Teruel. Holotype, allotype et paratypes dans ma collection.

- of et Q: céphalothorax fauve, marqué au centre d'une bande longitudinale foncée; côtés de la partie thoracique bordés de brun; sillons postcéphaliques et fovéa noirs; une courte ligne longitudinale derrière les yeux latéraux. L'intensité de ces marques est assez variable. Sternum brun. Abdomen gris-fauve orné d'un folium à marges noires bordé de part et d'autre d'une ligne blanche sinueuse; face ventrale marquée d'une bande longitudinale plus ou moins foncée. Pattes fauve-clair; fémurs faiblement rembrunis au tiers apical; fémurs et tibias munis d'un très bref anneau apical; patellas rembrunies avec une tache apicale antérieure.
- O. Chélicères (fig. 1) brunes à tiges portant sur la partie apicale antérieure une petite apophyse légèrement arquée vers le bas. Marge antérieure de la rainure armée de trois dents: la principale (p) solitaire, très forte, conique, renflée à la base antérieure, légèrement arquée contre le crochet; les deux autres géminées, beaucoup plus petites, un peu plus près de la base du crochet que de la principale; l'apicale droite, un peu en avant, la seconde faiblement arquée vers la base et contre le crochet. Marge postérieure armée de quatre dents. Palpe maxillaire (fig. 2) caractérisé par le tibia et la patella à peine plus longs que larges, ces caractères ainsi que l'armature des chélicères sont communs aux quatre espèces décrites ici. Le paracymbium dépasse largement le bulbe (fig. 3) et son extrémité est arquée en faucille, terminée par une petite pointe noire. Extrémité du conducteur (fig. 4 et 5) hélicoïdale. Pointe de l'embolus en crochet muni d'une membrane en crête (fig. 5).
- Q. Chélicères armées de trois dents sur la marge antérieure de la rainure, l'apicale plus petite, et de quatre sur la marge postérieure. La fente épigynale récurvée, est très éloignée des stigmates pulmonaires, environ à mi-distance de ceux-ci et des filières. Vulve (fig. 15 et 16): atrium en vue dorsale aussi long que large, non bordé de plis membraneux entre les réceptacles latéraux, à angles supères arrondis. Réceptacle médian très grand, large, fortement plissé; côtés et face dorsale convexes.

Dimensions en millimètres de l'holotype (3): Abdomen, long ., 2,8. Céphalothorax: long., 2,3; larg., 2,0. Pattes, long. totale; Ire 10,3; IIe, 9,0; IIIe, 5,6: IVe, 8,0.

Pachygnatha bonneti n. sp. (fig. 6, 7, 8, 17 et 18)

Espagne. Prov. Cordoba: Villaviciosa, 29.6. 1969, 1 \circlearrowleft holotype, 1 \circlearrowleft allotype, 4 \circlearrowleft et 7 \circlearrowleft paratypes. Prov. Ciudad Real: Fuencaliente, 3.8. 1969, 3 \circlearrowleft et 2 \circlearrowleft paratypes. Prov. Huelva: Aracena, 5.7. 1969, 2 \circlearrowleft paratypes; Alajar/Aracena, 7.7. 1969, 1 \circlearrowleft paratype.

Les quatre localités sont réparties sur la plus grande partie de la Sierra Morena. Holotype, allotype et paratypes dans ma collection.

Ne diffère de *P. simoni* que par les génitalia, une taille légèrement plus petite, l'absence de bande ventrale bien marquée et des dessins un peu moins accusés.




Fig. 1-5, Pachygnatha simoni n. sp., \circlearrowleft : I, chélicères. - 2, palpe maxillaire gauche, vue externe. - 3, id., bulbe et paracymbium, vue interne. - 4, extrémité du conducteur gauche, vue externe. - 5, id., vu de dessous. - Fig. 6-8, P. bonneti n. sp., \circlearrowleft : 6, bulbe et paracymbium gauche, vue interne. - 7, extrémité du conducteur gauche, vue externe. - 8, id., vu de dessous. - Fig. 9-11, P. sundevalli n. sp., \circlearrowleft : 9, paracymbium gauche vue interne. - 10, extrémité du conducteur gauche, vue externe. - 11, id., vu de dessous. - Fig. 12-14, P.: tullgreni n. sp., \circlearrowleft : 12, paracymbium gauche, vue interne. - 13, extrémité du conducteur gauche, vue externe. - 14, id., vu de dessous. - Témoins d'échelle=0,5 mm.

304 A. SENGLET

of. Extrémité du paracymbium (fig. 6) tronquée, un peu plus longue que la largeur au niveau de l'angle supère qui est arrondi. Extrémité du conducteur (fig. 7 et 8) en gouttière, à marge arrondie-dentée. Pointe de l'embolus (fig. 8) droite, munie d'une membrane arrondie.

Q. Fente épigynale récurvée, plus près des stigmates que des filières. La vulve (fig. 17 et 18) possède un atrium large, dont la parois dorsale (garnie d'une courte pilosité) est triangulaire en avant, surmontée d'un fort lobe dorsal (1d) très plissé. Le réceptacle médian à côtés peu convexes, s'élargit régulièrement vers la base; il est incurvé contre le haut, et très plissé.

Dimensions en millimètres de l'holotype (3): Abdomen, long., 2,68. Céphalothorax: long., 2,07; larg., 1,86. Pattes, long. totale: Ire 9,5; IIe, 8,5; IIIe, 5,3; IVe, 7,0.

Pachygnatha sundevalli n. sp. (fig. 9, 10, 11, 19, et 20)

Portugal. Prov. Villa Real: Cortico/Montalegre, 30.8. 1969, 1 ♂ holotype, 1 ♂ allotype, 3 ♂ et 3 ♀ paratypes. Prov. Aveiro: Pedorido/Sobrado de Paiva, 2.9. 1969, 1 ♀ paratype. Prov. Guarda: Maceira/Fornos de Algodres, 10.8. 1971, 2 ♂ paratypes.

Nord du Portugal. Holotype, allotype et paratypes dans ma collection. Ne diffère de *P. simoni* que par les génitalia.




Fig. 15 à 22, vulves. – Fig. 15-16, *Pachygnatha simoni* n. sp.: 15, profil gauche. – 16, vue dorsale. – Fig. 17-18, *P. bonneti* n. sp.: 17, profil gauche. – 18, vue dorsale. – Fig. 19-20, *P. sundevalli* n. sp.: 19, profil gauche. – 20, vue dorsale. – Fig. 21-22, *P. tullgreni* n. sp.: 21, profil gauche. – 22, vue dorsale. – Témoins d'échelle = 0,5 mm.

- O. Extrémité du paracymbium (fig. 9) étroite, droite, longue d'environ deux fois la largeur au niveau de l'angle supère; il porte une petite dent subapicale noire. Le conducteur (fig. 10 et 11) assez court, ne dépasse pas l'embolus; son extrémité est tronquée, arrondie en gouttière et munie à angle droit d'une sorte de large bec en dents de scie (a). Embolus à pointe droite avec une membrane arrondie.
- Q. Fente épigynale récurvée, plus près des stigmates que des filières. Vulve (fig. 19 et 20): bord supérieur de la parois dorsale de l'atrium large, sinueux, non triangulaire, surmonté d'un court lobe dorsal (1d) plissé. Réceptacle médian plissé, s'élargissant latéralement vers la base, incurvé contre le haut.

Dimensions en millimètres de l'holotype (3): Abdomen, long., 2,72 Cephalothorax: long., 2,28; larg., 1,8. Pattes, long. totale: Ire 10,0; IIe, 9,0; IIIe, 6,0; IVe, 7,8.

Pachygnatha tullgreni n. sp. (fig. 12, 13, 14, 21 et 22)

Portugal. Prov. Setùbal: Cercal/Santiago do Cacem, 9.9.1969, 1 ♂ holotype, 1 ♀ allotype, 1 ♀ paratype. Prov. Faro: Bordeira/Aljezur, 11.9.1969, 1 ♂ et 2 ♀ paratypes. Prov. Beja: Monte do Cavaleiro/Almodôvar, 15.9.1969, 1 ♀ paratype. Espagne. Prov. Càceres: Guadalupe, 18.8.1969, 3 ♂ paratypes.

Côte sud-ouest du Portugal et une partie du bassin peu prospecté du

Guadiana. Holotype, allotype et paratypes dans ma collection.

Ne diffère de P. simoni que par les génitalia.

- o'. Extrémité du paracymbium (fig. 12) à peine plus longue que la largeur au niveau de l'angle supère, qui est presque en angle droit; elle porte une petite dent subapicale noire. Extrémité du conducteur (fig. 13 et 14) dont la marge ressemble à *P. bonneti* (fig. 8), mais très spiralée. Pointe de l'embolus droite, munie d'une membrane sagittée assymétrique (fig. 14).

Dimensions en millimètres de l'holotype (3): Abdomen, long., 2,62. Céphalothorax: long., 2,28; larg., 1,8. Pattes, long. totale: Ire, 10,0; IIe, 9,0; IIIe, 6,0; IVe, 8,0.

TRAVAUX CITÉS

Galiano, E.F., 1910. Datos para el conocimiento de la distribución geográfica de los Arácnidos en España. *Mem. Soc. esp. Hist. nat Madrid, 6* (5): 343–424.

Perez de san Roman, F., 1947. Catálogo de las especies del orden Araneae citadas de España después de 1910. Bol. Soc. esp. Hist. nat., 45 (7–8): 417–491.

WIEHLE, H., 1963. Spinnentiere, XII. Tetragnathidae. Die Tierwelt Deutschlands, 49: 1-76.

