**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

**Entomological Society** 

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 46 (1973)

**Heft:** 3-4

**Artikel:** Descriptions de nouvelles espèces de Lamiinae de la collection

Chassot (Coleoptera, Cerambycidae)

Autor: Breuning, Stefan

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-401719

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Band 46 (1973) Hefte 3-4

## DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ESPECES DE LAMIINAE DE LA COLLECTION CHASSOT

(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)

STEFAN BREUNING

Rue Durantin, 7, F-75 Paris 18e.

Thestus chassoti, nov. sp.

Proche d'oncideroides PASC., mais les articles antennaires 3 à 7 frangés de poils plus courts, les lobes inférieurs des yeux deux fois et demie aussi longs que les joues, le pronotum à tubercule latéral extrêmement court, l'angle apical sutural de l'élytre légèrement proéminent et pointu, la pubescence brun rougeâtre non entremêlée de blanc, mais seulement d'un peu de jaune foncé, l'écusson à pubescence ochracée, les élytres pourvus de petites taches ochracées, rangées sauf dans la partie basilaire et apicale en forme de plusieurs bandes transversales, descendant toutes obliquement en direction du bord latéral: une prémédiane, une médiane, une postmédiane et une préapicale; les antennes à pubescence brun foncé.

Longueur: 29 mm; largeur: 9 mm. Type de Malaisie: Cameron Highland.

Mutatocoptops malaisiana, nov. sp.

Proche de diversa PASC., mais la partie médiane du disque du pronotum densément ridée de travers, les élytres plus grossièrement granulés sur la partie basilaire et ensuite très densément et finement ponctués; la pubescence est brun rougeâtre; les tempes à pubescence blanche; de chaque côté du disque du pronotum une assez large bande longitudinale blanche; sur chaque élytre une assez grande tache basilaire discale blanche, une étroite tache postscutellaire blanche à la suture, une très petite tache discale médiane blanche et plusieurs taches allongées blanches au quart apical, réunies en partie ensemble, de nombreuses très petites taches noires dispersées par toute leur étendue et trois taches noires plus grandes: une discale située obliquement après la bosse postbasilaire et deux médianes, une sublatérale et une plus grande rapprochée de la suture; les parties latérales des sterna et le scape densément parsemés de petites taches noires; les fémurs noirs avant l'apex surtout en dessous, les tibias à pubescence noire sur la face dorsale avant le milieu et sur le tiers apical, le troisième article des tarses et la moitié apicale du quatrième article noirs, le restant des tarses à pubescence blanchâtre; les antennes à partir du deuxième article à pubescence brun foncé, la base du troisième article et le tiers basilaire des articles 4 à 11 à pubescence blanche.

Longueur: 20 mm: largeur: 7 mm.

Type un ♂ de Malaisie: Cameron Highland.

Phelipara (s.s.) clarior, nov. sp.

Proche de *laosensis* Breun., mais les antennes à peine deux fois aussi longues que le corps, les 6 premiers articles frangés de poils courts, le 3ème article un peu plus long que le quatrième ou que le scape; les lobes inférieurs des yeux à

S. Breuning

peine deux fois aussi longs que les joues; le pronotum faiblement transverse, très éparsément ponctué; les élytres extrêmement finement ponctués; la pubescence foncière d'un brun jaunâtre, entremêlée d'un peu de blanchâtre sur le front et sur le disque du pronotum; sur chaque élytre deux bandes transversales blanchâtres: une large prémédiane, une médiane moins large, descendant obliquement en direction du bord latéral et quelques taches blanchâtres au quart apical; les articles antennaires 4 à 11 noirâtres vers l'apex.

Longueur: 16 mm; largeur  $5\frac{1}{2}$  mm. Type de Malaisie: Cameron Highland.

Pterolophia (Hylobrotus) parobscuroides, nov. sp.

Proche d'obscuroides BREUN., mais les élytres arrondis à l'apex, sans fascicule de poils postbasilaires et sans petites taches brun foncé, la bande prémédiane blanche atteint la suture, en plus sur chaque élytre deux taches suturales blanches: une postmédiane et une préapicale, mais pas de lignes transversales jaunes; les antennes à pubescence presque unicolore brun rougeâtre clair.

Longueur: 13 mm; largeur  $4\frac{1}{2}$  mm.

Type du Sud de l'Inde, Madras: Anaimalai Hills.

Dystasia chassoti, nov. sp.

En ovale allongé. Antennes un peu plus longues que le corps, frangées de

poils assez longs, le scape modérément long, très grossi vers l'apex.

Tubercules antennifères modérément saillants. Lobes inférieurs des yeux transverses, un peu moins longs que les joues. Tête assez éparsément et finement ponctuée. Pronotum assez densément et finement ponctué Elytres tronqués à l'apex (l'angle marginal bien accusé), finement granulés à la base, ensuite assez densément et grossièrement ponctués jusqu'au milieu, éparsément et finement ponctués dans la moitié postérieure; sur chaque élytre un petit tubercule dentiforme discal basilaire et une bosse allongée discale postbasilaire, surmontée d'un grand fascicule de poils noirs.

Noir, couvert de pubescence gris blanchâtre, entremêlée d'un peu de brun clair. Tous les points du pronotum entourés d'un très petit cercle brun. Sur chaque élytre deux bandes transversales brun rougeâtre clair: une postbasilaire s'étendant de l'épaule à la bosse postbasilaire, bordée en arrière de plusieurs taches noires et une postmédiane, une assez large bande transversale médiane blanche, remontant un peu en direction du bord latéral et bordée en arrière par de petites taches allongées noires et de nombreuses taches allongées brunes dans la moitiée postérieure. La partie médiane des sterna et l'abdomen couverts en majeure partie de pubescence brun jaunâtre. Fémurs et scape parsemés de petites taches brun foncé. Partie dorsale des tibias intermédiaires et postérieurs, sauf avant le milieu, couverts de pubescence brun foncé. Moitié apicale du quatrième article des tarses noire. Articles antennaires à partir du deuxième article à pubescence jaune pâle, la partie apicale des articles à partir du troisième en augmentant à pubescence noirâtre.

Longueur: 18 mm; largeur 7 mm.

Type de Malaisie: Cameron Highland.

Les types des Lamiinae décrits dans ce travail, ainsi que ceux que j'ai décrits précédemment de la collection du Dr. René Chassot, seront conservés d'ici quelques années au Muséum d'histoire naturelle de Genève.