Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 57 (1984)

Heft: 2-3

Artikel: Première contribution à l'étude de Formica bruni Kutter (Hymenoptera,

Formicidae)

Autor: Feller, Cécile / Cherix, Daniel

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-402118

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


Première contribution à l'étude de Formica bruni Kutter (Hymenoptera, Formicidae)

CÉCILE FELLER et DANIEL CHERIX

Musée zoologique, Palais de Rumine, Place de la Ripone 6, CH-1005 Lausanne

Formica bruni décrite en 1966 par Kutter appartient au sous-genre Coptoformica Müll. Bien que connue d'Auguste Forel (Forel, 1874 et 1920), ce dernier la considérait comme F. pressilabris «un peu exsecta». En effet, Forel ne reconnaissait qu'une seule espèce F. exsecta comprenant 2 races et 3 variétés (voir tableau 1). Actuellement, on distingue en Suisse 7 espèces appartenant au sous-genre Coptoformica: F. exsecta Nyl.; F. pressilabris Nyl.; F. foreli Em.; F. forsslundi Lohm.; F. naefi Kutter; F. goesswaldi Kutter et F. bruni Kutter (Kutter, 1966, 1977).

Tableau 1: Classification selon Forel (1915, 1920)



Les stations recensées de *F bruni* sont les suivantes: Monnaz/Morges (VD) (1873), Zermatt (VS) (1919 et 1961), Binn (VS) (1946), Kippel (VS) (1947), Les Randen (SH) (1948) et Dürnstein (Autriche) (1965) (voir Kutter 1966). Signalons que ce sont actuellement les seules stations connues mais la grande majorité, si ce n'est toutes, ont disparu. En 1978 cependant, une nouvelle station a été découverte au Bois de Chênes près de Nyon (VD) (CHERIX et HIGASHI, 1979). La carte montre l'emplacement de cette colonie, située sur une petite colline entourée de champs cultivés. En 1978, cette colonie comptait 61 nids dont 6 seulement étaient inactifs (S. Higashi, comm. pers.). En 1983, il ne restait que 18 nids occupés parfois très peu de temps et vraisemblablement par 6 ou 7 sociétés. Chaque société n'occupe qu'un nid à la fois et certaines sociétés ont déménagé à plusieurs reprises au cours de l'été. A la fin 1983, il ne restait en tout et pour tout que 6 sociétés. F. bruni est une espèce polygyne et vraisemblablement polycalique car aucune agressivité entre les individus des différents nids n'a été constatée et les territoires exploités sont communs à plusieurs sociétés. L'étude approfondie que nous avons entreprise depuis 1983 nous permettra de connaître plus en détail la biologie de cette espèce ainsi que les raisons de la régression de cette colonie dont la station du Bois de Chêne est peut être l'unique survivante.




Fig. 1: carte de la région du Bois de Chênes

--- : réserve naturelle du Bois de Chênes

— · — · = : réserve intégrale et scientifique

le triangle noir indique l'emplacement de la colonie de F. bruni

BIBLIOGRAPHIE

Cherix, D. et Higashi, S., 1979. Distribution verticale des fourmis dans le Jura vaudois et recensement préliminaire des bourdons (Hymenoptera, Formicidae et Apidae). Bull. soc. vaud. sc. nat. 74. 315-324.

Forel, A. 1874. Les fourmis de la Suisse. Zürich, 452 pp.

Forel, A. 1915. Die Ameisen der Schweiz in Fauna insectorum helvetiae, Hymenoptera, Formicidae. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 12: 1-77 (Beilage zu Heft 7/8).

Forel, A. 1920. Les fourmis de la Suisse. 2e éd., La Chaux-de-Fonds, 333 pp.

Kutter, H. 1966. Einige Ergebnisse weiterer Coptoformicastudien. Ins. Soc. 13: 227-240.

KUTTER, H. 1977. Hymenoptera-Formicidae. Insecta helvetica 6. Schweiz. Ent. Ges., Zürich, 298 pp.

(reçu le 4 avril 1984)