

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	57 (1984)
Heft:	2-3
Artikel:	Deux nouvelles espèces de Golofa Hope et une nouvelle espèce de Heterogomphus Burmeister (Col., Scarabaeoidea, Dynastinae)
Autor:	Voirin, J.P.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-402124

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Deux nouvelles espèces de *Golofa* Hope et une nouvelle espèce de *Heterogomphus* Burmeister (Col., Scarabaeoidea, Dynastinae)

J. P. VOIRIN

R. N. 7 - F-83340 Le Luc, France

Two new species of Golofa HOPE *and a new species of Heterogomphus* BURMEISTER (Col., Scarabaeoidea, Dynastinae) – The three new species from South America are: *Golofa horizontalis*, *G. aequatorius* and *Heterogomphus onorei*.

Golofa horizontalis n. sp. (Fig. 1 et 2)

Mâle: Jaune marron clair, luisant, coloration très constante.

Tête: Noire, clypeus large, trapézoïdal, en 2 lobes plats peu marqués. Mandibules non recoupées. Corne céphalique pointue, courte et fine. La base et les côtés jaune-rouge, les faces antérieures et postérieures, ainsi que l'extrémité noires. Front chagriné.

Pronotum: Longueur 11,5 mm – largeur 18 mm. Faiblement rebordé sur les côtés et à l'arrière. Corne thoracique courte, horizontale et largement aplati. L'intérieur de la dépression sur la face avant, tapissée d'une courte pilosité jaune clair. La marge antérieure est noire, épaisse. Ponctuation fine, éparses et constantes.

Ecusson: triangulaire, les côtés noirs, séparés par un sillon peu profond.

Elytres: longueur 24,5 mm – largeur 22 mm. Parsemés de quelques taches sombres, irrégulièrement réparties. Ovaies, ponctuation fine, comme sur le pronotum. Stries suturales formées d'une ligne nette, rectiligne.

Dessous: coloration comme sur le dessus, peu poilu. Mentum ovalaire, très large, plat, fortement ponctué partout. Quelques longues soies sur les côtés. Saillie prosternale triangulaire, mince, pointue à l'apex, glabre.

Pygidium: ponctuation fine et intense sur toute la surface.

Tibias antérieurs 3 dents. L'apex des tibias postérieurs avec 4 pointes aigues.

Femelle: Coloration et principaux caractères identiques au mâle. Clypeus plus étroit, la tête est fortement chagrinée. Le pronotum est marqué d'un léger renflement noir, juste derrière la tête. Ecusson entièrement noir. Les tibias antérieurs possèdent une 4^e dent peu développée.

Holotype: 1 mâle de 42 mm – Paraguay

Allotype: 1 femelle – 38 mm – même label. In coll. K. et J. P. VOIRIN.

Golofa aequatorius n. sp. (Fig. 3 et 4)

Mâle: marron brillant, coloration constante.

Tête: Noire, clypeus peu recoupé, les lobes à peine relevés. Mandibules non recoupées. Corne céphalique longue et mince, légèrement recourbée vers l'arrière. La face postérieure aplatie sur les 3 premiers quarts, quelques faibles dentelures chez les mâles majeurs. La corne se réduit à une dent aigüe chez les mâles

mineurs. Front rugueux avec 2 pointes fortement marquées derrière la corne céphalique.

Pronotum: longueur 13,5 mm - largeur 26 mm. Nettement rebordé partout. Corne thoracique chez les mâles majeurs moyenne, dressée verticalement ou légèrement penchée en arrière, élargie à l'apex, terminée plus ou moins en triangle. Chez les mâles mineurs, elle devient un renflement peu marqué et globuleux. La face antérieure forme une légère dépression tapissée d'une pilosité




Fig. 1 à 6: Paramères face et profil

Fig. 1 et 2: *G. horizontalis n. sp.*, fig. 3 et 4: *G. aequatorius n. sp.*, fig. 5 et 6: *H. onorei n. sp.*

courte mais dense. La marge antérieure et la bande longitudinale à peine marquées. La ponctuation est dense, les points irréguliers sont partout répartis, sauf derrière la corne. Les 2 dépressions latérales sont peu marquées.

Ecusson: triangulaire, faiblement ponctué. Les côtés larges et lisses, le sillon nettement dessiné.

Elytres: longueur 28 mm, largeur 23 mm. Ovaux, nettement chagrinés sur le disque, moyennement ponctués vers les marges. Stries suturales non visibles.

Dessous: Noir, longue pilosité jaune. Mentum étroit, parallèle, plat. Longue pilosité sur les côtés. Saillie prosternale trapézoïdale, chagrinée. Pygidium fortement ponctué sur les côtés, pourvu d'une pilosité longue et abondante.

Tibias antérieurs 3 dents, trace d'une 4^e chez les mâles majeurs. Les pointes apicales des tibias postérieurs courtes.

Femelle: la tête est chagrinée, le clypeus tronqué. Front avec une légère protubérance. Thorax noir densément ponctué en avant. Les élytres sont ponctués de lignes régulières. Les stries suturales marquées de petits points serrés. Pygidium comme chez les mâles, mais glabre. Tibias avant 4 dents plus ou moins émoussées.

Holotype: 1 mâle de 45 mm - Latacunga, Ecuador, IX. 1981.

Allotype: 1 femelle de 42 mm - même label.

Paratypes: 8 mâles de 36 à 44 mm - 5 femelles de 39 à 41 mm - même label. Tous les exemplaires in coll. K. et J. P. VOIRIN.

Heterogomphus onorei n. sp. (Fig. 5 et 6)

Male: brun rouge assez homogène, peu brillant. Dessous un peu plus clair.

Tête: clypeus large, tronqué. Mandibules longues, fortement recoupées. Corne céphalique courte et pointue, ponctuée sur les côtés. Front chagriné.

Pronotum: longueur 13 mm, largeur 19 mm. Fortement rebordé sur les côtés, plus faiblement à l'arrière. Protubérance thoracique peu importante, laissant une faible dépression lisse vers l'avant. Areola apposita, ainsi que les marges latérales éparsement ponctuées.

Elytres: longueur 26 mm, largeur 24 mm. Larges, ovalaires, lisses. Quelques stries longitudinales peu visibles. Les marges très nettement rebordées sauf à l'apex. Strie suturale formée d'un sillon irrégulier.

Pygidium: finement ponctué.

Dessous: pilosité faible et épars. Mentum très large, oval, plat. Quelques soies réparties sur les marges. Ponctuation nulle. Saillie prosternale cylindrique, longue, très fortement ponctuée à dense pilosité très longue.

Dimension: 43 mm.

Femelle inconnue.

Holotype: 1 mâle - Santo Domingo - Ecuador - Leg. G. Onore. X.1981 - In coll. K. et J. P. VOIRIN.

(reçu le 18 juin, 1984)

