Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 69 (1996)

Heft: 2

Artikel: Première capture d'Agrilus guerini Lac. (Col. Buprestidae) en Suisse

Autor: Barbalat, Sylvie / Wermelinger, Beat DOI: https://doi.org/10.5169/seals-402630

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE

69, 201 - 202, 1996

Première capture d'Agrilus guerini LAC. (Col. Buprestidae) en Suisse

SYLVIE BARBALAT¹ & BEAT WERMELINGER²

¹ Institut de zoologie, Emile Argand 11, CH-2007 Neuchâtel

First record of Agrilus guerini LAC., (Col. Buprestidae) in Switzerland. – The species has been reared from a willow (Salix viminalis) branch found in Birmensdorf (ZH).

Keywords: Coleoptera, Buprestidae, Switzerland, Willow

INTRODUCTION

En avril 1995, dans le périmètre de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) près de Birmensdorf (ZH), nous avons coupé quelques branches d'osier blanc (Salix viminalis). Ces branches, encore vertes et d'un diamètre de 6 à 8 cm provenaient d'un saule âgé de 25 à 30 ans. Elles ont été gardées en laboratoire durant 3 à 4 semaines au terme desquelles plusieurs insectes ont éclos: quelques Leiopus nebulosus (L.) (Col. Cerambycidae) ainsi qu'un Bupreste. Ce dernier a pu être identifié comme Agrilus guerini LAC. grâce à l'apex divergent de ses élytres, formant une pointe caractéristique. L'exemplaire a été déposé dans la collection entomologique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

DISCUSSION

Agrilus guerini n'est pas mentionné dans le Catalogue des Buprestidae de Suisse (Pochon, 1964), ni dans les principales revues suisses d'entomologie postérieures à cette date. C'est à notre connaissance, la première capture de cette espèce en Suisse. La présence de ce Bupreste dans notre pays n'est toutefois pas surprennante, étant donné qu'il est signalé dans plusieurs pays européens: l'ex-URSS, l'Allemagne, l'ex-Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'ex-Yougoslavie, l'Italie, la France (Curletti, 1994), ainsi que la Suède méridionale, la Pologne et la Hongrie (Vogt, 1987).

Dans les pays voisins, l'espèce a été signalée récemment en Alsace (CALLOT & SCHOTT, 1991), en Franche-Comté (ROBERT, com. pers.), ainsi qu'à de nombreuses reprises dans le sud de la Rhénanie-Palatinat (VOGT, 1987) et dans le Bade-Wurttemberg (BRECHTEL, com. pers.). En Italie, elle est signalée par CURLETTI (1994) en Vénétie Julienne.

Toutes les sources consultées font état de la grande rareté de cette espèce. Toutefois, d'après BILY (com. pers.), l'espèce a été trouvée relativement fréquemment ces dernières années en République tchèque. Il signale cependant la difficulté de capturer les adultes car ils se tiennent volontiers dans la couronne des arbres. Kostenbader (com. pers.) met également le manque de données en relation avec la dif-

² Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), CH-8903 Birmensdorf

ficulté de capturer les adultes. Il indique par contre que les larves sont relativement faciles à repérer grâce à leurs galeries caractéristiques. La recherche spécifique de ces dernières dans le Bade-Wurttemberg ainsi qu'en Rhénanie-Palatinat a permis de mettre en évidence une distribution nettement plus large que celle supposée. Selon Niehuis (1988), le recul des milieux favorables porte préjudice à cette espèce dans de nombreuses localités, sans pour autant menacer son existence de façon aiguë. Sa conservation doit être assurée par une préservation des milieux où croît sa plante-hôte (*Salix* spp.).

Biologie

Selon Vogt (1987) la larve se développe dans différentes espèces de saules (*Salix caprea*, *Salix aurita* et *Salix fragilis*). Elle colonise des branches et des troncs vivants, de 1,5 à 20 cm de diamètre, et y creuse des galeries en zig-zag sous la surface de l'aubier, qui peuvent s'étendre sur plus de 1,2 m de longueur. Après la nymphose, qui dure environ 3 semaines entre fin mai et fin juin, l'adulte reste encore 5 jours dans la loge nymphale. L'adulte apparaît de juillet à septembre (BILY, com. pers.). Le cycle complet dure 2 ans (BILY, 1989).

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les Drs S. BILY et F. BRECHTEL, MM. H. U. KOSTENBADER et J.-Y. ROBERT pour leurs intéressantes informations, ainsi que M. B. FECKER (FNP) pour les soins apportés à l'élevage des insectes.

RÉSUMÉ

Agrilus guerini LAC. (Col. Buprestidae) a été trouvé pour la première fois en Suisse. L'espèce a éclos d'une branche d'osier blanc (Salix viminalis) provenant de Birmensdorf (ZH).

ZUSAMMENFASSUNG

Erstfund von Agrilus guerini LAC. (Col. Buprestidae) in der Schweiz. Der Käfer wurde in Birmensdorf (ZH) gefunden und schlüpfte aus einem Korbweidenast (Salix viminalis).

BIBLIOGRAPHIE

BILY, S. 1989. Kraskoviti Buprestidae. Zoologické Klíce, Academia Praha, 111 pp.

CALLOT, H. J. & SCHOTT, C. 1991. *Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace*. Tome 3 Sternoxia. Société alsacienne d'entomologie. Musée zoologique de la ville de Strasbourg, 100 pp.

CURLETTI, G. 1994. I Buprestidi d'Italia: Catalogo tassonomico, sinonimico, biologico, geonemico. Natura Bresciana Monografie n° 19. Museo civico di scenze naturali di Brescia, 318 pp.

NIEHUIS, M. 1988. Die Prachtkäfer (Coleoptera, Buprestidae) in Rheinland-Pfalz. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv Beiheft 9. Naturhistorisches Museum Mainz, 196 pp.

POCHON, H. 1964. Coleoptera Buprestidae. Insecta Helvetica 2. Lausanne, 88 pp.

Vogt, W. 1987. Das Vorkommen von Guérins Salweiden-Prachtkäfer *Agrilus guerini* LAC. in Rheinland-Pfalz (Coleoptera, Buprestidae). *Pfälzer Heimat 38 (1):* 28-32.

(reçu le 25 janvier 1996; accepté le 22 février 1996)