Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 86 (2013)

Heft: 1-2

Artikel: Faunistische Angaben zu einigen Arten der Langbeinfliegen (Diptera,

Dolichopodidae), mit einer neuen Gattung und drei neuen Arten für die Schweiz = Faunistic data on some species of long-legged flies (Diptera,

Dolichopodidae), with one genus and three s...

Autor: Naglis, Stefan

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-403061

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE

86: 43-48, 2013

Faunistische Angaben zu einigen Arten der Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae), mit einer neuen Gattung und drei neuen Arten für die Schweiz

Faunistic data on some species of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae), with one genus and three species new for Switzerland

STEFAN NAGLIS

Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften, Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich, Schweiz; s.naglis@bluewin.ch

First faunistic data on the distribution of 27 species of Dolichopodidae (Diptera) in Switzerland are given and commented. *Coracocephalus stroblii* Mik, 1892, *Hercostomus praeceps* Loew, 1869 and *Micromorphus claripennis* (Strobl 1899) are recorded the first time for Switzerland.

Keywords: Diptera, Dolichopodidae, distribution, new record, Switzerland

EINLEITUNG

Im Rahmen der Vorbereitung zu einer geplanten umfassenden Arbeit über die Verbreitung der Langbeinfliegen in der Schweiz ist der Verfasser auf einige Arten gestossen, welche zwar in der Diptera Checklist (Pollini & Pollet 1998) enthalten sind, für welche jedoch bisher Fundortangaben gefehlt haben. Dabei handelt es sich um zwei Kategorien. Einerseits um Arten, die von den Autoren gesehen wurden (mit Vermerk Ausrufezeichen «!»), aber ohne weitere Angaben. Zum anderen um Arten, welche aus dem paläarktischen Katalog (Negrobov 1991) mit Vorkommen Schweiz übernommen wurden (mit Vermerk «CPD»). Für jene Arten, welche zu einer dieser beiden Kategorien gehören und für die seither keine Fundmeldung publiziert worden ist, fehlen konkrete Angaben über die geografische Verbreitung in der Schweiz. Mit diesem Beitrag sollen diese Lücken so weit als möglich mit Fundortangaben geschlossen werden. Coracocephalus stroblii Mik, 1892, Hercostomus praeceps Loew, 1869 und Micromorphus claripennis (Strobl, 1899) werden zum ersten Mal für die Schweiz gemeldet. Somit erhöht sich die Anzahl der bisher in der Schweiz nachgewiesenen Arten auf 241 (Naglis, unpubl.).

MATERIAL UND METHODEN

Die verwendete Systematik und Nomenklatur richtet sich nach Naglis (2009a). Das untersuchte Material befindet sich in der Sammlung von Gerhard Bächli (CGB) und

in jener des Autors (CSN). Für jede Art werden die Funddaten (Kanton und Ortschaft) sowie die Sammlung angegeben. Von jeder aufgeführten Art (mit Ausnahme von *Coracocephalus stroblii*) wurde mindestens ein Männchen untersucht. Die Reihenfolge der Unterfamilien, Gattungen und Arten ist alphabetisch.

RESULTATE

Diaphorinae

Argyra leucocephala (Meigen, 1824)

Fundangaben: AG (Brunegg, Möriken), BE (Interlaken), LU (Baldegg, Willisau), SH (Rüdlingen), SZ (Rothenturm), ZG (Rüssspitz), ZH (Maschwanden) (CSN). LU (Menzberg), SG (Rheineck), SO (Mariastein), UR (Seelisberg), ZH (Dietikon, Hönggerberg) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Dolichopodinae

Dolichopus atratus Meigen, 1824

Fundangaben: ZH (Maschwanden) (CSN).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Dolichopus linearis Meigen, 1824

Fundangaben: LU (Willisau), TI (Magadino) (CSN). TI (Magadino) (CGB). Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Ethiromyia chalybea (Wiedemann, 1817)

Fundangaben: LU (Willisau), VS (Sierre) (CSN).

Bemerkung: Hercostomus conformis (Loew, 1857) wird in Negrobov (1991) irrtümlich als Synonym von Hercostomus chalybeus aufgeführt. Pollini & Pollet (1998) sind dieser Synonymisierung gefolgt. Keiser (1947) führt Hercostomus conformis auf, welche von Pollini & Pollet (1998) irrtümlicherweise als Hercostomus chalybeus interpretiert wurde. Die von Keiser (1947) als Hercostomus conformis aufgeführte Art ist ein Synonym von Hercostomus chaerophylli Meigen, 1824 (siehe Pollet 2004). Hercostomus chalybeus wurde von Brooks (2005) in eine neue Gattung Ethiromyia gestellt. Somit wird Ethiromyia chalybea hier eigentlich zum ersten Mal für die Schweiz gemeldet.

Gymnopternus blankaartensis Pollet, 1990

Fundangaben: BE (Interlaken), SH (Rüdlingen), VS (Sierre) (CSN). ZH (Katzensee) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Gymnopternus cupreus (Fallén, 1823)

Fundangaben: AG (Schinznach), NE (Les Ponts de Martel) (CSN). AG (Würenlos), ZH (Buchs) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Gymnopternus metallicus (Stannius, 1831)

Fundangaben: BE (Interlaken), VS (Sierre), ZH (Regensdorf) (CSN). VS (Grône Poutafontana) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Gymnopternus silvestris Pollet, 1990

Fundangaben: LU (Baldegg), SH (Rüdlingen) (CSN). VS (Grône Poutafontana) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Hercostomus plagiatus (Loew, 1857)

Fundangaben: AG (Siggenthal) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Hercostomus praeceps Loew, 1869

Fundangaben: VS (Leuk-Platten) (CGB).

Bemerkung: Erstnachweis für die Schweiz! Die Art ist in Nord- Mittel- und Osteuropa bis nach Russland verbreitet und wurde auch in den Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Österreich nachgewiesen.

Poecilobothrus chrysozygos (Wiedemann, 1817)

Fundangaben: LU (Willisau) (CSN).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998: 197) fälschlicherweise mit Hinweis L12 aufgeführt, was auf eine Publikation in Vaucher-von Ballmoos (1997) hinweist, wo sie jedoch fehlt.

Hydrophorinae

Coracocephalus stroblii Mik, 1892

Fundangaben: TI (Piotta, Angone/Anzonico) (CGB) je ein einzelnes Weibchen.

Bemerkung: Erstnachweis der Gattung Coracocephalus für die Schweiz! Die Gattung enthält zwei alpine Arten, welche bisher nur von den Österreichischen Alpen bekannt waren.

Medeterinae

Dolichophorus kerteszi Lichtwardt, 1902

Fundangaben: TI (Biasca), VD (Senarclens), ZH (Dietikon, Rafz) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Negrobov (1991) mit Vorkommen Schweiz ohne weitere Angaben aufgeführt.

Systenus leucurus Loew, 1859

Fundangaben: BL (Bubendorf) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Systenus pallipes (von Roser, 1840)

Fundangaben: BL (Bubendorf) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Neurigoninae

Neurigona cilipes (Oldenberg, 1904)

Fundangaben: GR (Scuol), VS (Jeizinen) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Neurigona erichsoni (Zetterstedt, 1843)

Fundangaben: AG (Brunegg) (CSN). NE (Rochefort), TI (Gordola), VD (Lausanne), ZH (Boppelsen, Dietikon, Hönggerberg, Oetwil/L, Marthalen, Zürichberg) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Peloropeodinae

Acropsilus niger (Loew, 1869)

Fundangaben: TI (Gordola) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Chrysotimus flaviventris (von Roser, 1840)

Fundangaben: AG (Würenlingen), TI (Corzoneso, Piotta), ZH (Oetwil/L), (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Micromorphus claripennis (Strobl, 1899)

Fundangaben: GR (Ftan-Clünas), SZ (Pragelpass) (CGB).

Bemerkung: Erstnachweis für die Schweiz! Die Art wurde lange als Synonym von Micromorphus albipes (Zetterstedt, 1843) betrachtet und erst von Negrobov (2000) als eigene Art akzeptiert. Sie wurde aus Spanien beschrieben und bisher aus Deutschland und Russland gemeldet. Die als M. albipes gemeldeten Exemplare aus GR und SZ (Naglis 2009b) gehören zu dieser Art. Die bisherigen als M. albipes bestimmten Exemplare in den Sammlungen sollten überprüft werden. Die beiden westeuropäischen Arten können leicht unterschieden werden:

- 1. Beine schwarz; Vorderfemur beim Männchen auf der Ventralseite mit langen weissen Haaren claripennis Strobl
- Beine gelb; Vorderfemur beim Männchen auf der Ventralseite nackt albipes Zetterstedt

Rhaphiinae

Nematoproctus distendens (Meigen, 1824)

Fundangaben: BE (Interlaken), TI (Agno), ZH (Maschwanden) (CSN). AG (Aristau), ZH (Dietikon, Hönggerberg, Maschwanden) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Rhaphium auctum Loew, 1857

Fundangaben: ZH (Embrach, Maschwanden) (CSN).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Rhaphium quadrispinosum (Strobl, 1898)

Fundangaben: AG (Aristau) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Negrobov (1991) mit Vorkommen Schweiz ohne weiter Angaben aufgeführt.

Sciapodinae

Sciapus longulus (Fallén, 1823)

Fundangaben: SH (Rüdlingen) (CSN).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt. Im Gegensatz zur Beschreibung im Schlüssel in Meuffels & Grootaert (1990: 175) ist bei dieser Art das sog. Organ X vorhanden, wenn auch mit dem Cercus verwachsen.

Sciapus wiedemanni (Fallén, 1823)

Fundangaben: VS (Pfynwald, Visp) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Sympycninae

Campsicnemus alpinus (Haliday, 1833)

Fundangaben: NE (Ponts-de-Martel), SG (Schwändital) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

Campsicnemus loripes (Haliday, 1832)

Fundangaben: VS (Pfynwald) (CGB).

Bemerkung: Die Art ist in Pollini & Pollet (1998) mit «!» ohne weitere Angaben aufgeführt.

DANKSAGUNG

Ich danke Gerhard Bächli (Dietikon) für die Ausleihe der Dolichopodidae aus seiner Sammlung.

ZUSAMMENFASSUNG

Für 27 Arten der Dolichopodidae (Diptera) werden zum ersten Mal faunistische, kommentierte Angaben zur Verbreitung in der Schweiz gegeben. *Coracocephalus stroblii* Mik, 1892, *Hercostomus praeceps* Loew, 1869 und *Micromorphus claripennis* (Strobl, 1899) werden neu für die Schweiz gemeldet.

LITERATUR

- Brooks, S.E. 2005. Systematics and phylogeny of Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae). Zootaxa 857: 158 p.
- Keiser, F. 1947. Die Fliegen des Schweizerischen Nationalparks und seiner Umgebung. Pars I: Brachycera Orthorhapha. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des schweizerischen Nationalparks, Band II (Neue Folge), 18, 198 pp.
- Meuffels, H. & Grootaert, P. 1990. The identity of *Sciapus contristans* (Wiedemann, 1817) (Dolichopodidae, Diptera), and a revision of the species group of its relatives. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie 60: 161–178.
- Naglis, S. 2009a. Checkliste der Langbeinfliegen der Schweiz (Diptera, Dolichopodidae). Entomo Helvetica 2: 17–22.
- Naglis, S. 2009b. Neufunde von Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae) für die Schweizer Fauna.

 Entomo Helvetica, 2: 11–15.
- Negrobov, O.P. 1991. Family Dolichopodidae. *In*: Soos, A. & Papp, L. (eds), Catalogue of Palaearctic Diptera. 7: 11–139. Budapest.
- Negrobov, O.P. 2000. Revision of the Palaearctic species of the genus *Micromorphus* Mik (Diptera: Dolichopodidae). An International Journal of Dipterological Research 11(1): 19–26.
- Pollet, M. 2004. Fauna Europaea: Dolichopodidae. *In*: Pape, T. (ed.). Fauna Europaea: Diptera Brachycera. Fauna Europaea version 2.5, http://www.faunaeur.org (last access March 2013).
- Pollini, L. & Pollet, M. 1998. Dolichopodidae. *In*: Merz, B., Bächli, G., Haenni, J.-P. & Gonseth, Y. (eds), Diptera-Checklist. Fauna Helvetica, vol. 1, pp. 195–200.
- Vaucher-von Ballmoos, C. 1997. Étude de six zones de transition entre tourbières acides et zones agricoles dans le Haut-Jura suisse Faune des Empidoidea (Insecta, Diptera) et autres Diptères à larves édaphiques. Dissertation, Université de Neuchâtel, 368 pp. + Annexes.

(erhalten am 19. März 2012; angenommen am 13. Mai 2013; publiziert am 30. Juni 2013)