**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

**Entomological Society** 

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 88 (2015)

**Heft:** 3-4

Artikel: Drei Schweizer Arten der Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae) für

die Schweizer Fauna = Three new species of long-legged flies (Diptera,

Dolichopodidae) for the Swiss fauna

Autor: Naglis, Stefan

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-583856

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE SUISSE

88: 341–345, 2015 doi:10.5281/zenodo.33998

Drei neue Arten der Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae) für die Schweizer Fauna

Three new species of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) for the Swiss fauna

### Stefan Naglis

Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften, Universität Zürich, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich, Switzerland; s.naglis@bluewin.ch

Chrysotus collini Parent, 1923, Dolichopus arbustorum Stannius, 1831 and Dolichopus cilifemoratus Macquart, 1827 are recorded for the first time for Switzerland. Dolichopus occultus Becker, 1917 is proposed as new synonym of Dolichopus arbustorum. The male genitalia of Chrysotus collini, Chrysotus gramineus (Fallén, 1823) and Chrysotus angulicornis Kowarz, 1874 are figured.

Keywords: Dolichopodidae, Switzerland, faunistics, taxonomy, new records, new synonymy

#### **EINLEITUNG**

In der Schweiz sind bisher 282 Arten aus der Familie der Langbeinfliegen (Dolichopodidae) nachgewiesen worden (Naglis 2015). Im Rahmen einer Revision und Neuordnung der Dolichopodidae der Privatsammlung Gerhard Bächli (Dietikon) wurden innerhalb der Unterfamilien Diaphorinae und Dolichopodinae drei neue Arten für die Schweiz festgestellt. Die genauen Fundangaben der Belege sowie Anmerkungen zu den Arten werden nachfolgend gegeben. Durch die hier beschriebenen Neumeldungen erhöht sich die Zahl der in der Schweiz bekannten Dolichopodidae auf 285 Arten.

# MATERIAL UND METHODEN

Grundlage für die vorliegende Arbeit ist das umfangreiche Dolichopodiden Material der Privatsammlung von Gerhard Bächli (Dietikon), welcher auch das Präparieren und Etikettieren der Exemplare übernommen hat. Ein Teil des Materials wurde im Rahmen eines Projekts bei Bubendorf BL mittels Fensterfallen gefangen, Einzelheiten dazu finden sich in Walter *et al.* (2003). Die Verbreitungsangaben basieren hauptsächlich auf Pollet (2004) und Yang *et al.* (2006), zusätzliche Quellen sind jeweils erwähnt.




Abb. 1. Chrysotus collini Parent, 1923, Männchen, Postabdomen.




Abb. 2. Chrysotus gramineus (Fallén, 1823), Männchen, Postabdomen.




Abb. 3. Chrysotus angulicornis Kowarz, 1874, Männchen, Postabdomen.

**RESULTATE** 

# Chrysotus collini Parent, 1923

(Abb. 1)

Funddaten: 3 ♂ ♂: Changins VD, 2000 und 2001, leg. P. Duelli.

Verbreitung: England, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und neuerdings auch aus dem Kaukasus (Maslova & Negrobov 2011).

Bemerkungen: Erstnachweis für die Schweiz! Die Art ist den beiden Arten Chrysotus gramineus (Fallén, 1823) und Chrysotus angulicornis Kowarz, 1874 sehr ähnlich. Die drei Arten lassen sich am besten durch die Form und Länge des Aedeagus sicher unterscheiden (vergl. Abb. 1, 2 und 3). Die Genitalien des Männchens von Chrysotus collini werden hier zum ersten Mal abgebildet.

# Dolichopus arbustorum Stannius, 1831

(Abb. 4)

= Dolichopus cilifemoratus Staeger, 1842

= *Dolichopus occultus* Becker, 1917, replacement name for *D. cilifemoratus* Staeger, 1842, nec Macquart, 1827 **syn. nov**.

Funddaten: 3 & &: Bubendorf BL, 6.-13.VII., 13.-20.VII. und 10.-17.VIII.2000, leg. M. Wolf. 1 &: Dardagny GE, Essertines, 400 m., 11.VIII.2000, leg. Merz & Bächli.

Verbreitung: Ganz Europa, mit Ausnahme der südlichsten Länder.

Bemerkungen: Erstnachweis für die Schweiz! Unter den untersuchten Exemplaren von Bubendorf BL befindet sich eines mit einer kurzen Ader M<sub>2</sub>, der sog. stub-vein (Abb. 4), was bedeutet, dass dieses Merkmal einer innerartlichen Variabilität unterliegt. Das Vorhandensein dieser stub-vein wiederum führt zur Art Dolichopus occultus Becker, 1917, welche bisher nur von Dänemark und Tschechien bekannt ist. Bereits Becker (1917: 130) weist darauf hin, dass D. occultus den beiden Arten D. arbustorum und D. salictorum Loew, 1871 sehr nahe steht und nur




Abb. 4. Dolichopus arbustorum Stannius, 1831, Männchen, Flügel.

durch das Vorhandensein einer «gebrochenen vierten Längsader» unterschieden werden kann und kommt zum Schluss: «... aber eine Identität kann man mit Überzeugung nicht aussprechen.» Auch im Schlüssel (Becker, 1917: 172) wird *D. occultus* nur durch das Vorhandensein einer stub-vein («vierte Längsader rechtwinklig gebrochen») von den beiden anderen Arten unterschieden. Auch Stackelberg (1933: 77) schreibt zu dieser Art: «Mir unbekannt und etwas zweifelhaft geblieben.» *D. arbustorum* und *D. salictorum* hingegen unterscheiden sich deutlich durch die Färbung des dritten Fühlergliedes, welches bei ersterer zum Teil gelb ist, während dieses bei letzterer ganz schwarz ist. Eine Untersuchung von *D. occultus* ist nicht möglich, da die Staegerschen Typen anscheinend nicht mehr vorhanden sind (Becker 1917: 130). Aufgrund des Nachweises der innerartlichen Variabilität des Vorhandenseins einer stub-vein der Ader M schlage ich hiermit vor, *Dolichopus occultus* mit *Dolichopus arbustorum* zu synonymisieren.



Abb. 5. Dolichopus cilifemoratus Macquart, 1827, Männchen, Vordertarsen.



Abb. 6 Dolichopus festivus Haliday, 1832, Männchen, Vordertarsen.




Abb. 7. Dolichopus trivialis Haliday, 1832, Männchen, Vordertarsen.

# Dolichopus cilifemoratus Macquart, 1827

(Abb. 5)

= Dolichopus pseudocilifemoratus Stackelberg, 1933

Funddaten: 2 ♂ ♂: Bubendorf BL, 6.-13.VII.2000, leg. M. Wolf.

Verbreitung: Ganz Europa, mit Ausnahme der südlichsten Länder sowie Russland, Kaukasus und Kasachstan.

Bemerkungen: Erstnachweis für die Schweiz! Die Art ist Dolichopus trivialis Haliday, 1832 und D. festivus Haliday, 1832 sehr ähnlich, erstere wurde in der älteren Literatur (z.B. Parent 1938) irrtümlicherweise als Synonym von D. cilifemoratus aufgeführt. Alle drei Arten sind durch die besondere Beborstung der Vordertarsen der Männchen gut zu unterscheiden: D. cilifemoratus besitzt drei starke Borsten, während D. festivus zwei und D. trivialis nur eine solche Borste aufweisen (vergl. Abb. 5, 6 und 7).

#### **DANKSAGUNG**

Gerhard Bächli (Dietikon) danke ich für die Ausleihe der Dolichopodidae seiner Sammlung. Den Reviewern danke ich für ihre Anmerkungen zum Manuskript.

#### **ZUSAMMENFASSUNG**

Chrysotus collini Parent, 1923, Dolichopus arbustorum Stannius, 1831 und Dolichopus cilifemoratus Macquart, 1827 werden zum ersten Mal für die Fauna der Schweiz gemeldet. Dolichopus occultus Becker, 1917 wird als neues Synonym von Dolichopus arbustorum vorgeschlagen. Die männlichen Genitalien von Chrysotus collini, Chrysotus gramineus (Fallén, 1823) und Chrysotus angulicornis Kowarz, 1874 werden abgebildet.

#### LITERATUR

- Becker, T. 1917. Dipterologische Studien. Dolichopodidae. A. Paläarktische Region. Erster Teil. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino Carolinae 102(2): 113–361.
- Maslova, O.O. & Negrobov, O.P. 2011. New Records of *Chrysotus collini* (Dolichopodidae, Diptera). Vestnik Zoologii 45(5): 478.
- Naglis, S. 2015. Die Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae) der Schweiz mit Verbreitungsangaben nach Kantonen. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 88(1–2): 85–104.
- Parent, O. 1938. Diptères Dolichopodidae. Faune de France 35: 1–720.
- Pollet, M. 2004. Fauna Europaea: Dolichopodidae. *In*: Pape, T. (Ed.). Fauna Europaea: Diptera Brachycera. Fauna Europaea version 2.6.2, <a href="http://www.faunaeur.org">http://www.faunaeur.org</a> (letzter Zugriff Juli 2015).
- Stackelberg, A.A. 1933. 29. Dolichopodidae. *In*: Lindner, E. (ed.): Die Fliegen der Palaearktischen Region, 4(5), Lief. 71: 65–128.
- Walter, T., Wolf, M. & Plattner, M. 2003. Holzbewohnende Käfer im Naturschutzgebiet Wildenstein.

   Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel 7: 263–285.
- Yang, D., Zhu, Y., Wang, M. & Zhang, L. 2006. World Catalog of Dolichopodidae (Insecta: Diptera).
  China Agricultural University Press, pp. 1–704.

(erhalten am 9. Juli 2015; angenommen am 18. Oktober 2015; publiziert am 31, Dezember 2015)