

Leistus montanus Steph. (fulvibarbis Hffsg. Heer.)

Autor(en): **Frey-Gessner, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **3 (1869-1872)**

Heft 4

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400266>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Leistus montanus Steph. (fulvibarbis Hffsg. Heer.)

Von E. Frey-Gessner.

La localité du Jura des environs d'Aarau, où se trouvent les *Leistus montanus*, me fut indiquée par mon ami le pasteur Achille Zschokke.

Les entomologistes connaissent assez bien ce joli coléoptère bleu, à bouche rouge, aux pattes et aux antennes de la même couleur. On sait aussi par la faune des coleoptères de M. Heer, page 33, que cet insecte a été trouvé au mont Salève et à Vallorbe, de plus il se rencontre dans le canton d'Argovie, pourquoi donc n'existerait-il pas tout le long du Jura?

Pour chasser cet insecte, il faut attendre la fin du mois de septembre ou le commencement d'Octobre, soit l'époque de la maturité des raisins. On choisit alors l'un de ces éboulis tels qu'il s'en trouve par exemple sous les anciennes carrières ou au pied des rochers escarpés et où ne vécut aucune plante. Là on creuse un petit fossé au travers la masse des pierres, et en avançant on met à nu peu à peu la couche compacte du terrain. C'est là qu'on découvre les carabes qui s'enfuient aussitôt à toute vitesse. Il faut alors être prompt à saisir ces jolis insectes, qui cherchent aussitôt à se dérober sous les pierres anguleuses que l'on ne peut remuer sans se blesser plus ou moins les doigts.

En même temps que le *Leistus montanus* on aura le plaisir de trouver un tout petit *Bryaxis* d'un noir luisant, des *Bembidium*, des *Harpalus*, des araignes, des *Julus*, divers Hyménoptères, enfin une quantité d'insectes et autres articulés dont on ne soupçonne pas l'existence dans ce terrain stérile, et dont les uns dévorent les autres.

Le *Leistus montanus* doit être bien rare dans d'autres contrées, car on en demande toujours, et ceux de mes collègues, qui auront le bonheur de trouver dans leur voisinage une bonne localité pour la chasse, posséderont en elle une source féconde d'échanges.

J'ai aussi trouvé des *Leistus* dans la terre même, en brisant la surface durcie du sol.

Les deux localités des environs d'Aarau où l'on peut se procurer des *Leistus*, s'appellent: Königstein et Akerberg en montant le Stafelegg.