

Matériaux complémentaires pour la Faune des Lépidoptères de la Suisse

Autor(en): **Peierimhoff, H. de**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **3 (1869-1872)**

Heft 10

PDF erstellt am: **24.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400297>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

kann. Der Schmetterling steht jedem entomologischen Kollegen zur Besichtigung bei mir zur Verfügung.

Der Entdecker, Herr Gruet in Renan, schrieb mir über seinen interessanten Fund :

« Au mois de Juillet 1870 j'ai trouvé quelques chenilles sur la grande Epilobe des fossées au bord de la Suze; elles étaient de grandeur différente, avec des teintes plus ou moins foncées; alors je supposais, qu'elles étaient de la même espèce; mais en printemps de 1871 à l'éclosion du sujet en question, mon père était d'accord avec vous; il m'avait fait observer les mêmes renseignements. Le Porcellus se trouve aussi ici, cependant je n'ai pas encore pu découvrir la chenille. » —

Dem Schmetterlinge einen neuen Namen zu geben, bin ich nicht berechtigt. Ich würde diess erst dann thun, wenn nachgewiesen wäre, dass die Zwischenform sich fortpflanzt und einen eigenen neuen Typus darstellt. Wenn der Entdecker, Herr Gruet, die nöthige Sorgfalt darauf verwendet, so könnte diess vielleicht gelingen.

Die Diagnose der neuen Form müsste schliesslich etwa folgendermassen lauten :

Deilephila Porcellus + *Elpenor*. *Deilephila corpore viridi, lateribus roseis, fascia media longitudinali nulla, thorace viridi, fasciis longitudinalibus roseis quatuor, antennis albis. Alis anterioribus olivaceis, margine exteriori fascia rubra, intus denticulata, in medio duabus fasciis obscurioribus et puncto albo instructis, ciliis rubris uni coloribus. Alis posticis in margine ad angulum interiorem incisura magna instructis, denticulatis, ciliis maculatis, in costis roseis, radice usque ad medium fere nigris, dein olivaceis, fascia terminali obscuriore.*

Matériaux complémentaires pour la Faune des Lépidoptères de la Suisse.

Ayant dû faire deux séjours aux établissements de Gais et de Weissbad, j'en ai profité pour étudier, autant que je le pouvais, les

productions lépidoptériques de l'Appenzell. J'étais malheureusement, dans ces circonstances, hors d'état de me livrer aux courses fatigantes, et c'est à peine si j'ai pu, de temps en temps, franchir le seuil des régions alpestres. J'ai pensé toutefois que la liste des espèces que j'ai rencontrées pourrait ne pas manquer d'intérêt, précisément à raison du nombre considérable de personnes que leur santé amène dans le pays. Au point de vue scientifique, cette liste renferme trois espèces de *Tineina*, non signalées dans l'excellent catalogue des Microlépidoptères suisses, publiées dans les « Mittheilungen » par M. le professeur Frey, et découvertes depuis son impression.

J'ai séjourné à Weissbad du 15 Juin au 15 Juillet, et à Gais du 15 Juillet au 15 Août.

Parn. Apollo L.	très com.	Seealpthal et disséminé jusqu'à Gais.
Ap. Cratægi L.	id.	partout.
Pier. Napi L. ab. Bryoniae O.	ass. com.	Seealpthal.
Col. Phicomone Esp.	ass. rare	Ebenalp et pentes élevées du Seealpthal.
Polyom. Hippothœ L. (=Eurydice=Chryseis)	com.	Weissbad et Gais.
Lyc. Orbitulus Esp.	très com.	Ebenalp.
— Icarus Rott.	rare	Weissbad et Gais.
— Corydon Sc.	très com.	Seealpthal.
— Hylas Esp. (Dorylas)	rare	Gais.
— Minima Fuesl. (Alsus)	très com.	Seealpthal.
— Semiargus Rott.	com.	Weissbad et Gais.
— Alcon S-V.	ass. com.	Weissbad.
— Arion L.	ass. rare	Weissbad et Gais.
Van. Polychloros L.	rare	Gais.
Arg. Pales S-V.	très com.	Ebenalp.
— Amathusia Esp.	ass. com.	Gais et Seealpthal.
— Thore Hb.	rare	Seealpthal.
— Ino Esp.	id.	Gais.
— Niobe L.	id.	id. et Weissbad.
— ab. Eris Meig.	com.	id. id.
Ereb. Epiphron, ab. Nelandus B.	très com.	Ebenalp.
— Oeme Esp.	ass. rare	Seealpthal.

Ereb. Stygne O.	très com.	Seealpthal. (type petit et presque tout noir).
— Gorge Esp.	ass. com.	Ebenalp.
— Manto S-V.	1 exempl. passé	Ebenalp.
— Aethiops Esp. (Medea)	com.	Weissbad et Gais.
— Ligea L.	id.	id. id.
Pararg. Maera L.	id.	id. id.
— Hiera Hb.	rare	Seealpthal.
Epin. Hyperanthus L.	très com.	partout.
Coen. Pamphilus L.	id.	id.
— Tiphon Rott. (Davus)	id.	id. (prairies tourbeuses).
Syr. Serratulae Rbr.	ass. rare	Seealpthal.
Deil. Galii S-V.	ass. com.	Gais. Chen. sur Epilobium.
Pterog. Oenotheræ S-V.	ass. rare	id., avec le précédent.
Ses. Ichneumoniformis F.	ass. rare	bords rocaillieux du torrent, à Schwendi.
Var. Megilliformis Hb.		
Thyr. Fenestrella Sc.	rare	Weissbad.
Ino Statices L.	très com.	prairies.
Zyg. Filipendulæ L.	ass. com.	Weissbad et Gais.
— Hippocrepidis Hb.	id.	id.
Nud. Mundana L.	id.	Seealpthal.
Set. Irrorella L.	id.	id.
— Aurita, var. Ramosa F.	id.	id.
Lith. Lurideola Zk.	com.	id.
Gnophr. Rubricollis L.	ass. rare	Weissbad.
Nem. Plantaginis L.	id.	Seealpthal.
Epial. Humuli L.	ass. com.	Gais, prairies.
— Ganna Hb.	1 exempl.	Ebenalp.
— Hectus L.	id.	Seealpthal.
Dasych. Fascelina L.	ass. com.	id.
Harp. Vinula L.	id.	Weissbad.
Acron. Leporina L.	1 exempl.	id.
— Euphorbiæ S-V.	ass. com.	id., à Gais, comme chenille.
Agr. Cuprea S-V.	1 exempl.	Gais.
Mam. Pisi L.	com.	id., comme chenille.
— Dentina S-V.	id.	Seealpthal, Weissbad.
Dianth. Proxima Hb.	1 exempl.	id.
Had. Strigilis L.	id.	id. (Var. rougeâtre).
Plus. Bractea S-V.	id.	Gais.
— Jota L.	ass. com.	Seealpthal.
— Pulchrina Hw. (V. aureum)	1 exempl.	Gais.

Phot. Captiuncula Tr.	ass. com.	Seealpthal.
Cat. Nupta L.	1 exempl.	Gais.
Acid. aversata L.		
(Lividata)	rare	id.
— Mutata Tr.	très com.	Seealpthal, Gais.
— Punctata Tr.	ass. com.	Weissbad.
Cab. Pusaria L.	id.	id.
Ell. var. Prasinaria Hb.	com.	id. et Gais.
Mac. Signaria Hb.	ass. com.	Weissbad.
Boarm. Abietaria S-V.	rare	Gais.
— Secundaria S-V.	ass. rare	id.
Gnoph. Glaucinaria Hb.	ass. com.	id. et Weissbad.
— Dilucidaria S-V.	com.	id. id.
Psod. Trepidaria Hb.	ass. com.	Ebenalp.
— var. Chaonaria Fr.	id.	id.
— Quadrifaria Sulz.		
(Alpinata)	id.	id.
Orthol. Limitata Sc.	com.	Gais et Weissbad.
Min. Murinata Sc.	très com.	Seealpthal.
Od. Atrata L. (Chærophyl.)	id.	Gais et Weissbad.
An. Præformata Hb.	rare	Weissbad.
Lig. Populata S-V.	ass. com.	Gais.
— Prunata L.	id.	id.
Cid. Variata S-V.	com.	id. et Weissbad.
— Bicolorata Hfn.	ass. com.	Weissbad.
— Truncata Hfn.	rare	Gais.
— Aptata Hb.	très com.	Weissbad.
— Turbata Hb.	1 exempl.	Ebenalp.
— Salicaria Hb.	rare	Weissalp (passé).
— Didymata L.	très com.	Gais.
— Cæsiata S-V.	com.	Weissbad.
— Infidaria Lah.	ass. com.	id. (et ab. minor, sine luteo).
— Tophaceata S-V.	ass. rare	id.
— Scripturaria S-V.	ass. com.	Seealpthal.
— Verberata Sc.		
(Rupestrata)	très com.	Gais et Weissbad.
— Cambrica Curt.	1 exempl.	id.
— Testaceata Don.		
(Sylvata)	id.	Weissbad.
— Galiata S-V.	rare	Seealpthal (type grand et dé- pourvu de rongeâtre).
— Minorata Tr.	ass. com.	Wildkirchli.
— Adæquata Bkh.		
(Blandiata)	ass. rare	Gais.

Cid. Tersata S-V.	1 exempl.	Weissbad.
Eup. Scriptaria H.-S.	ass. rare	Seealpthal.
— ? Expallidata Gn.	1 exempl.	Gais.
— Strobilata Hb.	com.	Weissbad.
— Subfulvata Hw.	1 exempl.	id.
— Veratraria H.-S.	ass. rare	Gais.
Scop. Pallida Stph.	rare	id. (tourbières).
— ? Ancipitella Lah.	ass. com.	id. (lisière des bois, troncs).
— Zelleri Wk.	rare	id. et Weissbad.
— Sudetica Z.	très com.	Seealpthal.
Herc. Schrankiana Hch.	ass. com.	Ebenalp et Seealpthal.
Bot. Nigralis F.	com.	Seealpthal.
— Cingulata L.	ass. rare	id. (type très grand).
— Punicealis S-V.	id.	id.
— Purpuralis L.	id.	id.
— Atralis Hb.	ass. rare	id.
— Uliginosalis Stph.		
(Montanalis H.-S.)	très com.	Ebenalp et Seealpthal.
— Lutealis Hb.	ass. rare	Seealpthal.
— Nebulalis Hb.	com.	id.
— Hyalinalis Hb.	ass. com.	Gais et Weissbad.
— Crocealis Hb.	ass. rare	Weissbad.
— Olivalis S-V.	1 exempl.	id.
Orob. Sophialis F.	très com.	Seealpthal.
Cramb. Dumetellus Hb.	com.	Gais et Weissbad.
— Uliginosellus Z.	très com.	id. id.
— Pascuellus L.	com.	id. id.
— Sylvellus Hb.	ass. rare	Gais.
— Falsellus S-V.	id.	id.
— Conchellus S-V.	très com.	Seealpthal, près de Schwendi.
— Pyramidellus Tr.	ass. rare	id.
— Margaritellus F.	très com.	Gais et Weissbad.
— Combinellus S-V.	id.	Seealpthal.
Dioryc. Abietella S-V.	1 exempl.	Weissbad.
Pemp. Adornatella Tr.	ass. rare	Seealpthal.
— Ornatella S-V.	com.	id.
Homæo. Binævella Hb.	1 exempl.	Weissbad.
Ephest. Elutella Hb.	très com.	Gais et Weissbad.
Tort. Semialbana Gn.	ass. rare	Weissbad.
— Cinnamomeana Tr.	id.	Gais et Weissbad.
— Histrionana Fr.	rare	Gais.
— Forstersana F.	rare	Ebenalp.
— Viburnana F.	très com.	Seealpthal.
— Palleana, Var.		

Tort. Icterana Frœl.	très com.	Seealpthal.
— Steineriana Hbn.	ass. rare	id.
Sciaph. Osseana Sc.	com.	tourbières.
— Argentana Cl. (Gouana)	com.	Seealpthal et Ebenalp.
— Penziana Hb.	ass. rare	id.
— Wahlbomiana L.	ass. com.	Weissbad.
— Var. Virgaureana Tr.	com.	id.
— Var. Minorana Hb.	id.	id.
Conch. Decimana S-V.	rare	id.
-- Badiana Hb.	ass. com.	Gais et Weissbad.
— Ciliella Hb.	ass. rare	id.
— Phaleratana H.-S.	rare	Weissbad.
— Rupicola Curt.	id.	id.
— Notulana Z.	id.	id.
Penth. Sauciana Hb.	id.	Gais.
— Oblongana Hw.	id.	Weissbad.
— Rufana Sc.	très com.	bords du torrent, près de Schwendi
— Metalliferana H.-S.	ass. com.	id. id. et Seealpthal.
— Siderana Tr.	rare	Seealpthal.
— Striana S-V.	com.	Gais et Weissbad.
— Palustrana Z.	ass. rare	id. id. (myrtilles, dans les bois).
— Rivulana Sc.	ass. com.	id. id.
— Cespitana Hb.	com.	Seealpthal (très beau type)
Aph. Lanceolana Hb.	com.	Tourbières.
Asp. Udmanniana L.	ass. rare	Weissbad.
Graph. Grandævana Z.	ass. com.	id. au Lœwenfall, tussilago.
— Hochenwarthiana Tr.	com.	id. et Gais.
— Tedella Cl. (Comitana)	com.	Gais.
— Penckleriana S-V.	ass. com.	id. et Weissbad.
— Cirsiana Z.	ass. rare	tussilago.
— Brunnichiana S-V.	très com.	id. Gais et Weissbad.
Stegan. Ratzeburgiana Rtz.	ass. com.	Gais.
Dichr. Subsequana Hw.	ass. rare	Weissbad, au Lœwenfall.
— Plumbana Sc.	rare	id.
— Cacaleana H.-S.	1 exempl.	au Lœwenfall.
Tinea Arcella F.	rare	Weissbad.
Lamp. Prælatella S-V.	ass. rare	id.
Nem. Pilulella Hb.	id.	Gais.
Adel. Associatella Z.	id.	id.
— Cuprella S-V.	1 exempl.	Seealpthal. (Nouvelle pour la faune suisse.)

Nem. Metallicus Sc.			
(Scabiosellus).	ass. com.	Gais et Weissbad.	
— Violellus S.-V.	com.	id. id.	
Prays Curtisellus Don.	rare	id. frênes des ravins.	
Cerost. Alpella Schiff.	ass. rare	id. ravins.	
Depress. Petasitis Stdf.	ass. com.	Lœwenfall, près Weissbad.	
Brachyc. Tripunctella S-V.	com.	Gais et Weissbad.	
Bryot. ? Alpicolella Hn.	1 exempl.	Weissbad (al. ant. pallidiss. cinereæ, immaculatae, post. subdilucidæ).	
Lita Artemisiella Tr.	très com.	bords du torrent à Schwendi.	
— Tussilaginis Frey	1 exempl.	au Lœwenfall.	
Teleia Sequax ? Hw.	rare	Seealpthal. (Exemplaires deux fois plus grands que ceux de plaine. M. Reutti, qui j'ai eu le plaisir de rencontrer à Weissbad, la croit distincte.)	
Anac. Anthyllidella ? Hb.	rare	Seealpthal. (Même observations que pour la précédente.)	
Yps. Juniperellus L.	ass. com.	Gais.	
Soph. Humerella S-V.	très com.	id. Seealpthal.	
Hyperc. Citrinalis Sc.	id.	Weissbad, derrière l'établissement.	
But. Productella Z.	rare	Seealpthal.	
— Acanthella God.	1 exempl.	sur un monticule aride et rocheux, près Schwendi. (Nouvelle pour la faune suisse.)	
Aechm. Thrasonella Sc.	com.	Gais et Weissbad.	
Chor. Bjerkandrella Thn.	id.	Seealpthal.	
Tin. Perdicellum Z.	rare	Gais.	
Ary. Conjugella Z.	ass. com.	sorbiers.	
— Mendica Hw.	com.	Weissbad, prunelliers.	
— Abdominalis Z.	rare	Gais, genevriers.	
— Sorbiella Tr.	ass. rare	id. et Weissbad.	
— Pygmæella Hb.	id.	id. id.	
— Aurulentella Stt.	ass. com.	id.	
Orn. Pfaffenzelleri Frey	rare	Ebenalp.	
Chaul. Pontificellus Hb.	id.	Seealpthal.	
Chrys. Linneella Cl.	1 exempl.	id. (Nouvelle pour la faune suisse.)	
Laver. Schranckella Hb.	rare	Weissbad.	
Micr. Auratella Sc.	ass. rare	Ebenalp.	
Platypt. Gonodactylus S-V.	com.	tussilago.	
Pter. Serotinus Z.	com.	Gais et Weissbad.	
— Coprodactylus Stt.	ass. com.	id.	

Pter. Scarodactylus Hb. 1 exempl. Weissbad.
 — Osteodactylus Z. id. id.

A cette liste, peut être trop longue, bien que j'aie sans doute omis de noter bien des espèces communes partout, je devrais pouvoir ajouter une très belle Conchylis Tr., qui s'est échappée de mon filet, une Butalis Z., et quelque Elachista Z.; mais la crainte des erreurs m'oblige à les passer sous silence.

H. DE PEIERIMHOFF.

XII^e RECUEIL.

Descriptions d'un genre nouveau et de plusieurs espèces de coléoptères propres à la Russie méridionale et remarques synonymiques.

~~~~~

### Schismatocera. (Nov. gen.)

♂ *Chaperon* large, rebordé, arrondi légèrement; échancré à l'avant; fortement échancré sur les côtés pour recevoir les yeux; ceux-ci gros, comme dans le genre *adoretus*.

*Tête* large, munie de trois carènes transversales; celles du vertex et du front tranchantes, celle du milieu formant quatre lobes granuleux.

*Labre* profondément échancré, bilobé, cilié.

*Lobe externe des mâchoires* divisé en deux dents au moins.

*Sommet des mandibules* visible pendant le repos.

*Dernier article des palpes labiaux* en cône allongé, aigu à l'extrémité; celui des *maxillaires* ovalaire.

*Antennes* de neuf articles. 1<sup>er</sup>, en cône renversé, renflé à son sommet; 2<sup>e</sup>, arrondi, globuleux; 3<sup>e</sup>, plus allongé que les suivants; les trois derniers formant une massue allongée, plus longue que tous les autres articles réunis; les feuillets acuminés à l'extrémité.

*Prothorax* transversal arrondi sur les côtés.