

Synonymie de quelques espèces de Sphecidae (Hym.) 2

Autor(en): **Beaumont, Jacques de**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **22 (1949)**

Heft 3

PDF erstellt am: **19.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-401070>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Synonymie de quelques espèces de Sphecidae (Hym.) 2

par

JACQUES DE BEAUMONT

Musée zoologique, Lausanne

Grâce à l'amabilité de M. E. ZARCO, secrétaire de l'Instituto español de Entomologia, à Madrid, il m'a été possible d'examiner les types de divers Sphégides décrits par GINER MARI; je donne ici quelques renseignements sur deux de ces espèces.

Notogonidea baguenai GINER = **Liris nigra** LIND.

Cette espèce a été décrite (Eos 10, p. 141, 1934) d'après une seule ♀. Le type est en très mauvais état : ailes réduites à des moignons, corps recouvert de saleté, etc., mais l'on peut reconnaître cependant qu'il s'agit d'une ♀ de *Liris nigra* LIND. (*Notogonia pompiliformis* auct.) Les particularités que GINER avait notées dans la coloration des ailes sont dues à l'usure. Le clypéus paraît plus saillant que chez *nigra* parce que les poils de ses parties latérales sont arrachés. La ponctuation de l'aire pygidiale est plus dense dans la partie postérieure que sur la figure de GINER.

Leptolarra schulthessi GINER = **Liris praetermissa** RICHARDS.

J'ai pu examiner un ♂ ♀ de Valence de la collection GINER. Comme le supposait cet auteur et comme le laissait prévoir sa bonne description (Eos 18, p. 75, 1942), il s'agit sans doute de *Liris praetermissa* RICHDS.