Un nouveau Thinobius d'Arménie (Col. Staphylinidae)

Autor(en): **Comellini, André**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **42 (1969)**

Heft 4

PDF erstellt am: **29.03.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-401604

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE
Band XLII Heft 4 15. Dezember 1969

Un nouveau Thinobius d'Arménie

(Col. Staphylinidae)

par

ANDRÉ COMELLINI
Muséum d'Histoire naturelle de Genève

Lors d'un voyage effectué en 1967 en Turquie, M. BESUCHET a récolté, entre autres Staphylinidae, plusieurs exemplaires d'un très curieux *Thinobius*. Cette espèce diffère de toutes celles du genre par le développement extraordinaire des articles antennaires 3 et 4 (fig. 1). Seul *Thinobius nodicornis* EPPELSH., de Lenkoran, dont j'ai pu étudier le type grâce à l'obligeance du Dr F. JANCZYK, présente un faible élargissement des articles 3 et 4 (antenne, fig. 2).




Fig. 1 à 4. — 1. *Thinobius miricornis* n. sp., antenne droite, vue dorsale. — 2. *Thinobius nodicornis Eppelsh.*, antenne droite, vue dorsale. — 3. *Thinobius miricornis* n. sp., édéage, vue dorsale. — 4. *Thinobius miricornis* n. sp., édéage, vue latérale droite.

Thinobius miricornis n. sp.

Turquie, vilayet d'Erzurum : environs d'Azort, en amont du lac de Tortum, 3 ♂ dans un tamisage au bord de la rivière, au pied de tamarix, le 12 mai 1967. Holotype et paratypes : Muséum d'Histoire naturelle de Genève. Cette espèce est caractérisée par ses antennes (fig. 1), dont les articles 3 et 4 sont très développés et accolés. L'article 3 présente une dépression peu profonde, limitée à l'angle interne par une arête vive. La face ventrale de l'article 4 est plate.

Dimensions : Longueur totale 1,7 à 2,2 mm. Longueur de la tête, de l'épistome au bord postérieur, 0,25 à 0,27 mm. ; dans sa plus grande largeur, soit au milieu des tempes, 0,25 à 0,28 mm. Longueur du pronotum, 0,24 à 0,25 mm. ; largeur maximale, un peu avant le milieu, 0,28 à 0,30 mm. Longueur totale des élytres, 0,40 à 0,42 mm. ; largeur, 0,32 à 0,33 mm.

Corps brun foncé ; élytres plus clairs avec la zone scutellaire obscurcie ; dernier segment de l'abdomen brun-jaune ; pattes brun-jaune à fémurs assombris ; antennes également brun-jaune, un peu plus foncées à partir du cinquième article, surtout sur la face dorsale.

Face dorsale de la tête très finement granuleuse, avec une pilosité claire dirigée obliquement vers le centre. Tempe un tiers plus longue que le grand diamètre de l'œil. Pronotum plus finement granuleux que la tête à pubescence dirigée obliquement en avant ; ses côtés, en courbe régulière, un peu plus fortement rétrécis à la base. Elytres à côtés parallèles et à angles huméraux très marqués ; chaque élytre terminé en demi-cercle ; angle suturo-apical très profond ; pilosité élytrale courte, claire, dirigée en arrière. Pilosité ventrale de l'abdomen beaucoup plus courte que la dorsale. Bord postérieur des trochanters II prolongé obliquement en arrière par une épine robuste. Edéage (fig. 3 et 4). Longueur, 0,23 à 0,25 mm. ; largeur, 0,085 mm. Capsule basale occupant les deux tiers de l'édéage. Paramères très réduits, assymétriques, le droit plus volumineux que le gauche. Armature de sac interne bien chitinisée, formée d'un long fouet disposé en spirale.

Femelle encore inconnue.