

Zeitschrift: Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

Band: 11 (1869-1870)

Rubrik: Meteorologische Beobachtungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VIII.

Meteorologische Beobachtungen.

Vom 1. Dezember 1869 bis 30. November 1870.

A.

In Altstätten (478 Meter über Meer). Beobachter: **R. Wehrli.**

I. Barometer.

A. Mittlere Barometerstände in Millimetern.

1870.	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel.
December (69)	717,46	717,32	717,61	717,46
Januar	721,88	721,61	722,09	721,86
Februar	717,23	716,94	717,07	717,08
Winter	718,86	718,62	718,92	718,80
März	718,37	718,35	718,47	718,40
April	724,04	723,48	723,77	723,76
Mai	722,78	722,09	722,35	722,44
Frühling	724,73	724,34	724,53	724,52
Juni	723,15	722,44	723,00	722,86
Juli	724,59	724,06	724,49	724,28
August	718,93	718,53	719,03	718,83
Sommer	724,22	720,68	724,07	720,99
September	724,64	723,94	724,40	724,23
October	748,86	718,62	718,59	718,69
November	747,64	717,40	717,89	717,63
Herbst	720,37	719,99	720,49	720,48
Jahr	720,54	720,15	720,43	720,37

B. Höchste und tiefste Barometerstände.

1870.	Maximum.	Minimum.	Schwankngn.
December (69)	731,8	703,4	28,4
Januar	728,0	745,8	42,2
Februar	728,2	705,3	22,9
Winter	731,8	703,4	28,4
März	726,5	710,6	15,9
April	730,2	744,7	15,5
Mai	728,8	744,3	14,5
Frühling	730,2	710,6	19,6
Juni	727,8	744,7	13,4
Juli	727,3	744,0	13,3
August	725,6	742,5	13,4
Sommer	727,8	742,5	15,3
September	730,7	709,4	21,6
October	732,2	702,2	30,0
November	728,4	703,5	24,9
Herbst	732,2	702,2	30,0
Jahr	732,2	702,2	30,0

*II. Thermometer.***A. Mittlere Temperaturen in Graden nach Celsius.**

1870.	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abnds. 9 U.	Mittel.
December (69)	— 1,69	4,77	— 1,55	— 0,49
Januar	— 3,54	— 0,60	— 2,29	— 2,13
Februar	— 4,42	— 0,49	— 2,45	— 2,35
Winter	— 3,44	+ 0,23	— 2,10	— 1,81
März	0,53	4,31	1,93	2,26
April	5,94	12,41	7,63	8,65
Mai	12,63	15,95	13,99	14,49
Frühling	6,36	10,89	7,85	8,37
Juni	15,29	24,26	16,00	17,52
Juli	17,75	23,64	18,98	20,11
August	13,74	18,67	14,74	15,74
Sommer	15,59	24,18	16,56	17,78
September	10,16	16,46	12,08	12,90
October	6,34	11,18	8,51	8,68
November	3,44	8,35	3,91	4,13
Herbst	6,55	11,00	8,17	8,57
Jahr	6,35	10,82	7,69	8,29

B. Extreme der Temperaturen in Graden nach Celsius.

1870.	Maximum.	Minimum.	Schwankngn.
December (69)	8,8	— 11,2	20,0
Januar	8,2	— 13,1	21,3
Februar	10,4	— 9,6	20,0
Winter	10,4	— 13,1	23,5
März	12,8	— 5,2	18,0
April	20,6	— 1,0	19,6
Mai	28,6	— 3,6	25,0
Frühling	28,6	— 5,2	33,8
Juni	30,2	— 9,8	20,4
Juli	33,2	— 9,2	24,0
August	27,2	— 8,0	19,2
Sommer	33,2	— 8,0	25,2
September	26,2	— 5,8	20,4
October	17,6	— 1,3	16,3
November	17,6	— 2,6	20,2
Herbst	26,2	— 2,6	28,8
Jahr	33,2	— 13,1	46,3

*III. Psychrometer.***A. Mittel des Wasserdampfgehaltes der Luft in Procenten.**

1870.	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel.
December (69)	93,0	88,5	90,4	90,5
Januar	91,4	83,3	89,2	88,0
Februar	93,7	84,8	89,4	89,3
Winter	92,7	85,5	89,6	89,3
März	87,4	64,5	80,3	77,3
April	75,6	51,7	66,3	64,5
Mai	75,2	55,3	70,5	67,0
Frühling	79,3	57,2	72,4	69,6
Juni	76,5	52,2	68,2	68,6
Juli	78,4	57,1	67,2	67,6
August	84,8	65,2	76,8	76,6
Sommer	79,9	58,2	70,7	69,6
September	88,8	67,5	82,6	79,6
October	86,4	69,5	80,5	78,8
November	88,3	81,8	85,8	85,3
Herbst	87,8	72,9	83,0	81,2
Jahr	84,9	68,4	78,9	77,4

B. Trockenste und feuchteste Tage.

1870.	Minimum der einzelnen Beobachtungen.	Trockenste Tage.	Feuchteste Tage.
Dec. (69)	den 14. 9 U. 9%	den 14. mit 68%	den 6. 7. 8. 10.—13. 34. mit 100%
Januar	14. 4 U. 44	14. 62	5. u. 34. 100
Februar	27. 9 U. 34	27. 57	3.—6. 8.—11. 14. 100
Winter	9	57	100
März	26. 1 U. 28	46. 56	5. u. 18. 94
April	9. 1 U. 20	9. 34	29. 84
Mai	30. 1 U. 37	46. 3	3. 94
Frühling	20	34	94
Juni	24. 1 U. 23	22. u. 24. 50	8. 84
Juli	11. 1 u. 9 U. 23	11. 34	17. 94
August	17. 1 U. 42	18. 64	9. 93
Sommer	23	31	93
September	7. u. 9. 1 U. 36	7. 55	16. 95
October	23. 9 U. 28	13. 55	4. 5. 29. 96
November	25. 7 U. 42	24. 57	28. 99
Herbst	42	55	99
Jahr	9	31	100

*IV. Pluviometer.***A. Anzahl der Tage mit und ohne Regen oder Schnee.**

1870.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.	1870.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.
Decemb.(69)	41	20	Juni	13	17
Januar	8	23	Juli	12	19
Februar	7	21	August	17	14
Winter	26	64	Sommer	42	50
März	12	19	September	9	24
April	7	23	October	18	13
Mai	11	20	November	7	23
Frühling	30	62	Herbst	34	57
			Jahr	132	233

B. Längste Trockenheit.

1870.	Datum.	Zahl der Tage.
December (69)	Vom 4.—14.	11 Tage.
Januar	» 19.—31.	13 »
Februar	» 11.—18.	8 »
März	» 26.—31.	6 »
April	» 1.—10.	11 »
Mai	» 24.—30.	7 »
Juni	» 19.—23.	5 »
Juli	» 19.—25.	7 »
August	» 13.—18.	6 »
September	» 19.—30.	12 »
October	» 1.—7.	8 »
November	» 3.—10.	8 »

C. Totale Regenmenge.

1870.	Milli-meter.	Pariser Zoll.	Schweiz. Zoll.	1870.	Milli-meter.	Pariser Zoll.	Schweiz. Zoll.
Dec. (69)	109,8	4,07	3,66	Juni	98,8	3,66	3,29
Januar	24,4	0,83	0,84	Juli	89,6	3,32	2,99
Februar	30,6	1,13	1,02	August	136,2	5,04	4,54
Winter	164,8	6,10	5,49	Sommer	324,6	12,02	10,82
März	89,2	3,30	2,97	Septemb.	156,1	5,78	5,20
April	38,2	1,44	1,27	October	233,2	8,64	7,77
Mai	29,2	1,08	0,97	November	86,2	3,49	2,87
Frühling	156,6	5,80	5,22	Herbst	475,5	17,64	15,85
				Jahr	1121,5	41,54	37,38

D. Grösste Regenmenge in 24 Stunden.

1870.	Datum.	Millimeter.	Pariser Zoll.	Schweizer Zoll.
December (69)	30.Nov.— 1.Dec.	35,8	1,33	1,19
Januar	15.—16.	6,9	0,26	0,23
Februar	7.— 8.	12,3	0,46	0,44
Winter	30. XI — 1. XII.	35,8	1,33	1,19
März	17.—18.	40,7	1,51	1,36
April	14.—12.	11,4	0,42	0,38
Mai	2.— 3.	8,7	0,32	0,29
Frühling	17.—18. III.	40,7	1,51	1,36
Juni	31.Mai— 1.Juni	26,5	0,98	0,88
Juli	28.—29.	32,0	1,19	1,07
August	9.—10.	40,0	1,48	1,33
Sommer	9.—10. VIII.	40,0	1,48	1,33
September	7.— 8.	86,0	3,19	2,87
October	25.—26.	62,7	2,32	2,09
November	31. Oct.— 1. Nov.	42,6	1,58	1,42
Herbst	7.— 8. IX.	86,0	3,19	2,87
Jahr	7.— 8. IX.	86,0	3,19	2,87

V. Bedeckung des Himmels in Procenten.

1870.	Procente.	1870.	Procente.
December (69)	73,8	Juni	49,9
Januar	62,3	Juli	43,2
Februar	67,4	August	65,4
Winter	67,7	Sommer	52,8
März	69,2	September	47,2
April	44,8	October	64,6
Mai	43,6	November	75,0
Frühling	54,5	Herbst	62,3
		Jahr	58,6

VI. Zahl der Tage mit Nebel.

1870.	Tage.	1870.	Tage.
December (69)	17	Juni	0
Januar	7	Juli	0
Februar	15	August	0
Winter	39	Sommer	0
März	3	September	3
April	0	October	4
Mai	0	November	10
Frühling	3	Herbst	17
		Jahr	59

VII. Zahl der Gewitter.

1870.		1870.	
December (69)	0	Juni	5
Januar	0	Juli	4
Februar	0	August	1
Winter	0	Sommer	10
März	0	September	2
April	0	October	0
Mai	3	November	0
Frühling	3	Herbst	2
		Jahr	15

VIII. Winde, den stärksten Sturm zu 4 berechnet.

1870.	Windst.	Nord.	Nordost.	Ost.	Südost.	Süd.	Südwest.	West.	Nordwest.	Summe.
December (69)	83	2	0	0	0	0	7	0	1	10
Januar	86	3	2	0	0	0	3	0	0	8
Februar	76	0	2	0	0	1	5	0	0	8
Winter	245	5	4	0	0	1	15	0	1	26
März	74	9	5	0	2	0	4	0	1	24
April	74	1	8	0	0	0	5	1	2	17
Mai	79	1	3	0	2	0	0	1	7	14
Frühling	227	11	16	0	4	0	9	2	10	52
Juni	74	0	9	0	3	0	7	1	1	24
Juli	77	1	5	2	0	3	2	1	2	16
August	76	5	2	0	1	0	6	0	3	17
Sommer	224	6	16	2	4	3	15	2	6	54
September	76	6	0	0	0	0	8	2	1	17
October	73	2	0	0	1	0	20	6	0	29
November	77	2	5	1	1	2	2	1	1	15
Herbst	226	10	5	1	2	2	30	9	2	64
Jahr	922	32	41	3	10	6	69	13	19	193

IX. Vergleichende Zusammenstellung aus verschiedenen Jahren.

	1864.	1865.	1866.	1867.	1868.	1869.	1870.
Mittl. Barometerstand in Mm.	720,27	719,70	719,96	720,94	724,47	720,85	720,3
Höchster	733,7	731,8	735,0	733,9	736,0	733,0	732,2
Tiefster	696,2	699,0	695,7	702,7	697,8	69,77	702,2
Mittl. Temperatur des Winters in Grd. n. Cls.	— 2,54	— 4,65	4,34	2,94	— 0,77	3,87	— 4,66
Mittl. Temperatur des Frühlings	9,44	10,19	9,04	9,42	10,29	9,37	8,37

	1864.	1865.	1866.	1867.	1868.	1869.	1870.
Mittl. Temperatur des Sommers in Grd. n. Cls.	16,80	18,07	17,52	17,61	18,59	16,77	17,78
Mittl. Temperatur des Herbstes	8,95	11,65	9,96	8,77	9,88	9,48	8,57
Mittl. Temperatur des Jahres	8,05	9,56	9,46	9,68	9,50	9,80	8,26
Höchster Stand d. Thermometers nach Celsius	27,9	30,4	29,8	28,4	31,0	30,0	33,2
Tiefster	-16,0	-13,6	-12,4	-10,6	-16,4	-16,4	-13,1
Mittl. Feuchtigkeit d. Luft in Proc.	77,2	73,8	75,4	75,4	74,9	75,0	77,4
Minimum d. Feuchtigkeit d. Luft in Proc.	27	49	46	26	27	40	9
Tot. Regenmenge oder geschmolz. Schnee im Jahr							
in Mm.	1318,7	995,4	1338,0	1440,4	1112,4	1269,3	1121,5
ditto im Winter	217,2	174,4	167,2	324,9	231,4	200,4	164,8
ditto » Frühling	324,4	147,9	284,0	386,5	290,9	312,5	156,6
ditto » Sommer	527,6	462,8	552,5	422,6	343,6	461,6	324,6
ditto » Herbst	249,5	210,3	334,3	306,4	246,5	294,8	475,5
Maximum des geschmolz. Niederschlags in 24 St.							
in Mm.	51,1	50,6	60,9	63,2	71,3	58,4	86,0
Grösste Tiefe des Schnees in Cm.	48	24	41	27	29	46	48
Zahl der Tage mit Regen od. Schnee	137	138	147	169	154	144	132
Zahl der Tage mit Nebel	69	77	60	34	36	40	59
Zahl der Gewitter	14	6	16	8	14	18	15
Mittl. Bedeckung des Himmels in Procenten	60,0	55,2	57,6	60,2	58,6	60,0	58,6
Winde, d. stärkst. Sturm mit 4 berechnet	122	164	186	199	204	237	195
Längste Trockenheit in Tagen	22	30	20	14	17	13	13
Weinlese in Altsätten	28. Oct.	29. Spt.	24. Oct.	25. Oct.	7. Oct.	13. Oct.	17. Oct.

X. Ernte-Ergebniss im Jahre 1870.

	Quantität.	Qualität.
Korn	sehr gut	vorzüglich
Gerste	gut	gut
Mais	mittler	mittler
Kartoffeln	gut	gut
Wein	sehr gut	mittler
Aepfel	gut	gut
Birnen	sehr gut	gut
Kirschen	gering	gering
Zwetschen	gering	gering
Rüben	gering	gering
Kabis	gering	gering
Honig	sehr gering	

XI. Preise einiger Lebensmittel vom 1. December 1869 bis 1. December 1870.

	Höchster Preis.		Niederster Preis.	
	Ct.	Datum.	Ct.	Datum.
5 Pfd. Kernenbrod ($2\frac{1}{2}$ Kilogr.)	108	24. Juli	90	Dec. u Jan.
1 " Butter ($\frac{1}{2}$ Kilogr.)	125	v. 10.—31. Nov.	100	27. Jan.
100 " Kernobst (50 Kilogr.)	420	10. Nov.	120	7. Sept.
100 " Kartoffeln	500	26. Mai	240	23. Dec. 69.
1 " Kirschen ($\frac{1}{2}$ Kilogr.)	—	—	12	—

Bemerkungen.

December 1869. Der diesjährige, lang dauernde Winter, der seinen Anfang schon den 22. October genommen hatte, brachte vom 1. bis 14. kalte Tage, sehr viel Nebel, zwei Mal Schnee und schwachen Nordwind. Der vom 15. an herrschende Südwest- und Westwind schmolz zwar allen Schnee bis 1100 Meter über Meer und brachte sogar Bellis perennis und Lamium purpureum (Maasliebchen und Taubnesseln) zur Blüthe; allein schon den 26. folgten wieder Schnee und Kälte, welch' letztere am Morgen des Sylvester-tages — 11,2° Celsius betrug.

Januar. In der zweiten Hälfte dieses ziemlich kalten Monats herrschten unter der rheinthalischen Jugend die Masern und zwar in St. Margrethen so stark, dass desswegen die Schule eingestellt werden musste.

Februar. Dieser Monat, der im Mittel noch um $0,22^{\circ}$ C. kälter war als der Januar, brachte 15 Mal am Morgen Nebel, der einige Mal den ganzen Tag dauerte, und 5 Mal Schnee. Doch erschienen gegen Ende des Monats einige Zeichen des vielleicht nicht mehr gar fernen Frühlings, indem in den Tagen vom 25. bis 27. Mücken tanzten, Amseln sangen, Staaren umherflogen, und Kinder Schlüsselblumen brachten. Die eigentliche schöne Jahreszeit liess indessen noch lange auf sich warten.

März. Schon den 10. folgte nach vielen trüben Tagen wieder eigentliches Winterwetter, und erst den 28. wurde die Ebene des Rheintals von Schnee frei, während gleichzeitig in Grabs zwei Störche einzogen.

April. Den 8. zeigte sich ein grosses Nordlicht; den 11., Abends, sah man zum ersten Mal wieder blitzen; den 13. wurde der Ruf des Kukuks, sowie ferner Donner gehört; den 18. kam eine Schaar Rauchschwalben; den 17. fanden sich Blüthen des Haselnuss- und solche des Stachelbeerstrauches, den 20. blühende Johannisbeersträucher und Vogelbeerbäume. Den 25. öffneten sich Kirschenblüthen, den 29. Birn- und Zwetschenblüthen. Trotz dieser Frühlingszeichen schneite es den 28. und 29. wieder, und man konnte in diesen zwei Tagen in Wiesen von Frümsen und Sax eine Menge blühender Kirschbäume in der nächsten Nähe von neuem Schnee sehen.

Mai. Trotz der so späten Ankunft des Frühlings gab es schon den 26. reife Erdbeeren, ja sogar schon einzelne Kirschen, und den 30. war schon allgemeiner Anfang der Heuernte.

Juni. Während den 15. in Dornbirn zwei Männer vom Blitz getötet wurden, und der Linth entlang heftiger Hagel fiel, regnete es in Gams und Gasenzen so heftig, dass ein Bach ob dem ersten Dorfe hoch anschwoll und nicht unbedeutenden Schaden anrichtete. Als sich Abends 6 Uhr der Himmel wieder aufheiterte, sah man deutlich, dass auf den nahen Bergen ebenfalls starker Hagel gefallen war. Die Weinreben blühten vom 12. bis 26.

Juli. Wie im vorhergehenden, so auch in diesem Monate grosser Wassermangel, so dass z. B. die sämmtlichen Betten der zahlreichen Bäche in der Gemeinde Altstätten längere Zeit hindurch trocken waren. Den 4. wurde die erste Gerste, den 18. der erste Spelz geschnitten. Den 10. gab es reife Heubirnen.

August. Wie sich die Monate Juni und Juli durch Trockenheit ausgezeichnet hatten, so zeichnete sich der August aus durch die Menge seiner Regentage (17) und den fast gänzlichen Mangel an hellem Wetter. Den 30. sah man die letzten Spyrschwalben.

September. Vom 1. bis 4. und vom 14. bis 15. sammelten sich sehr viele Schwalben, Hirundo rustica, auf Dächern und flogen dem Süden zu. Vom Abend des 7. bis Nachmittags 1 Uhr am 8. regnete es so viel wie seit wenigstens 7 Jahren nie. Die Höhe des als Regen gefallenen atmosphärischen Niederschlages betrug nämlich 86 Millimeter oder 3,19 Pariserzoll oder 2,87 Schweizerzoll, was, auf die deutsche oder geographische Quadratmeile berechnet, 3,145,770,682 Schweizermaass oder 31,457,707 Saum entspricht.

October. Noch reicher an atmosphärischen Niederschlägen, ja noch regnerischer als der August war der October, indem er 18 Tage mit Regen zählt und einen Gesammt-

niederschlag von 233,2 Millimeter = 8,64 Pariserzoll = 7,77 Schweizerzoll aufweist. Der Bezirk Werdenberg litt sogar Ende des Monats durch Wassernothe; denn nicht nur war vom 24. bis 31. beständiges Regenwetter, wobei es in den Bergen schneite, sondern es fing auch der Föhn an zu wehen, welcher durch seine Trockenheit und Wärme eine schnelle Schmelzung des neuen Schnees bewirkte. Darum schwollen den 31. den Tag über, und besonders in der darauf folgenden Nacht, die sämmtlichen Bergbäche von Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald hoch an und tobten wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Bewohner der Egeten bei Sennwald fanden sich sogar veranlasst zu fliehen wie anno 1868. — Den 24., Abends zwischen 6 und 7 und von 8 bis 9 Uhr, sah man ein Nordlicht von seltener Grösse; es war am hellsten um halb 9 Uhr. — In der Nacht vom 26. auf den 27. wehte ein Südweststurm von ungewöhnlicher Stärke in den Gemeinden Grabs, Gams, Sax, Salez und Sennwald. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, mannsdicke Stämme gebrochen, Dächer beschädigt, in Salez ein Stall umgeworfen. — Den 29. sah man noch 4 Schwalben.

November. Den 25., Morgens 7 Uhr, betrug bei mässig wehendem Föhnwind aus Süden die Temperatur der Luft $17,6^{\circ}\text{C}$. und die relative Feuchtigkeit nur 12 Procente von der möglichen. Den 6. wurde im Tobel des Donnerbaches bei der Stadt Altstätten ein Steinadler geschossen.

B.

In St. Gallen (676 Meter über Meer). Beobachter:

G. J. Zollikofer.

I. Barometer.

A. Mittlere Barometerstände.

1870.	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel.
December (69)	699,62	699,50	699,90	699,67
Januar	703,95	703,72	704,29	703,99
Februar	699,44	699,22	699,54	699,38
Winter	700,99	700,84	704,23	701,04
März	700,74	700,83	704,07	700,87
April	706,53	706,26	706,66	706,48
Mai	705,55	705,24	705,54	705,44
Frühling	704,26	704,11	704,42	704,26
Juni	706,05	705,57	706,19	705,94
Juli	704,59	704,44	704,53	704,54
August	704,74	704,56	702,20	704,84
Sommer	704,13	703,85	704,34	705,00
September	707,14	706,79	706,96	706,96
October	702,03	704,36	704,28	704,56
November	700,45	700,00	700,54	700,22
Herbst	703,44	702,72	702,92	704,94
Jahr	703,12	702,87	703,22	703,07

B. Höchste und tiefste Barometerstände.

1870.	Höchster Stand.	Tiefster Stand.	Schwankgn.
Dec. (69)	713,0 29.	9 U.	27,6 mm.
Januar	710,2 17.	4 u. 9 U.	11,9
Februar	710,2 1.	4 U.	22,2
Winter	713,0 29. Dec.	9 U.	27,6
März	709,4 20.	4 U.	16,2
April	712,4 25.	7 U.	14,9
Mai	711,9 19.	7 U.	14,9
Frühling	712,4 25. April	7 U.	19,5
Juni	710,7 12.	9 U.	13,0
Juli	709,9 5.	7 U.	12,6
August	708,0 30.	9 U.	12,2
Sommer	710,7 12. Juni	9 U.	14,9
September	713,2 16.	9 U.	19,7
	und 17.	7 U.	
October	715,1 4.	9 U.	28,4
November	710,5 5.	7 U.	23,9
Herbst	715,1 4. Oct.	9 U.	28,5
Jahr	715,1 4. Oct.	9 U.	29,7
		685,4 26. Dec.	
		9 U.	

*II. Thermometer.***A. Mittlere Temperaturen in Graden nach Celsius.**

1870.	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U	Abnds. 9 U.	Mittel.
December (69)	— 2,53	— 0,32	— 2,33	— 1,73
Januar	— 3,94	— 0,32	— 2,94	— 2,38
Februar	— 5,22	— 0,80	— 3,82	— 3,28
Winter	— 3,89	— 0,48	— 3,02	— 2,46
März	— 0,60	3,02	0,23	0,88
April	4,84	10,77	5,88	7,16
Mai	12,18	17,84	11,73	13,94
Frühling	5,47	10,53	5,95	7,32
Juni	14,32	19,47	14,07	15,96
Juli	16,90	22,16	17,25	18,77
August	13,06	17,44	12,93	14,47
Sommer	14,76	19,68	14,75	16,40
September	9,06	15,47	10,37	11,63
October	5,84	10,77	7,44	8,01
November	1,37	4,39	2,04	2,60
Herbst	5,42	10,24	6,62	7,42
Jahr	5,44	9,98	6,08	7,17

B. Extreme der Temperaturen in Graden nach Celsius.

1870.	Höchster Stand.	Tiefster Stand.	Schwankn.
Dec. (69)	40,6 19.	1 U.	25,6° C.
Januar	40,2 8.	1 U.	25,0
Februar	44,4 28.	1 U.	22,8
		und 41.	
Winter	44,4 28. Febr.	1 U.	26,4
März	42,0 3.	1 U.	22,4
April	49,4 24.	1 U.	20,5
Mai	26,8 24.	1 U.	23,8
		4. 7 u. 9 U.	
Frühling	26,8 24. Mai	1 U.	37,2
Juni	28,2 24.	1 U.	20,2
Juli	34,6 11.	1 U.	22,2
August	26,0 2.	1 U.	19,4
Sommer	34,6 11. Juli	1 U.	25,0
September	25,2 6.	1 U.	21,6
October	16,7 8.	1 U.	17,7
November	11,6 23.	1 U.	14,6
Herbst	25,2 6. Sept.	1 U.	28,2
Jahr	31,6 11. Juli	1 U.	46,6

Mittlere monatliche Schwankung: 24,3°.

*III. Psychrometer.***A. Mittel des Wasserdampfgehaltes der Luft in Procenten.**

1870.	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel.
December (69)	90	87	90	89
Januar	87	80	87	85
Februar	95	82	93	90
Winter	91	83	90	88
März	89	76	89	85
April	79	56	76	70
Mai	73	56	79	69
Frühling	80	63	81	75
Juni	74	54	76	68
Juli	75	58	74	69
August	81	63	83	76
Sommer	77	58	78	74
September	85	66	83	78
October	83	67	80	77
November	90	78	87	85
Herbst	86	70	83	80
Jahr	83	68	83	78

B. Trockenste und feuchteste Tage.

1870.	Minimum der einzelnen Beobachtungen.	Trockenste Tage.	Feuchteste Tage.
	den	den	den
Dec. (69)	15. 9 U. 50	15. mit 62 %	5. 6. 7. 12 mit 100 %
Januar	7. 1 U. 54	7. 64	31. 100
Februar	4. 1 U. 23	28. 67	5. 6. 7. 8. 10. 100
März	16. 9 U. 46	16. 60	19. 99
April	24. 1 U. 28	9. 49	29. 87
Mai	30. 1 U. 38	1. 47	24. 88
Juni	24. 1 U. 30	24. u. 27. 52	6. 82
Juli	14. 1 U. 32	14. 39	28. 94
August	23. 1 U. 46	23. u. 29. 64	6. 12. u. 13. 87
September	6. 9 U. 36	6. 49	20. 89
October	23. 9 U. 37	23. 53	4. u. 5. 90
November	25. 1 U. 47	22. 68	28. 97

*IV. Pluviometer.***A. Anzahl der Tage mit und ohne Regen oder Schnee.**

1870.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.	1870.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.
Decemb.(69)	12	19	Juni	14	16
Januar	9	22	Juli	11	20
Februar	6	22	August	15	16
Winter	27	63	Sommer	40	52
März	14	17	September	11	19
April	10	20	October	17	14
Mai	11	20	November	7	23
Frühling	35	57	Herbst	35	56
			Jahr	137	228

B. Längste Trockenheit.

1870.	Vom	1870.	Tage.
December (69)	3.—14.	14	Tage.
Januar	4.—14.	10	"
Februar	12.—21.	9	"
März	25.—31.	7	"
April	1.—10.	9	"
Mai	24.—31.	7	"
Juni	11.—16.	5	"
Juli	18.—26.	8	"
August	13.—19.	6	"
September	19.—30.	12	"
October	1.—8.	7	"
November	4.—14.	7	"
	u. 24.—4. Dec.	7	"

C. Totale Regenmenge.

1870.	Millimeter.	Pariser Zoll.	1870.	Millimeter.	Pariser Zoll.
Dec. (69)	74,0	2,73	Juni	74,2	2,74
Januar	28,2	1,04	Juli	110,5	4,08
Februar	32,9	1,22	August	163,1	6,03
Winter	135,1	4,99	Sommer	347,8	12,85
März	93,3	3,45	September	94,1	3,37
April	50,6	1,87	October	188,3	6,96
Mai	38,5	1,42	November	82,7	3,05
Frühling	182,4	6,74	Herbst	362,1	13,38
			Jahr	1027,4	37,96

D. Grösste Regenmenge in 24 Stunden.

1870.		Millimeter.	Pariser Zoll.
December (69)	Vom 30. Nov.— 1. Dec.	19,2	0,71
Januar	» 18.—19.	11,4	0,42
Februar	» 7.—8.	9,3	0,34
März	» 5.—6.	15,8	0,58
April	» 27.—28.	26,9	0,99
Mai	» 23.—24.	12,5	0,46
Juni	» 31. Mai— 1. Juni	16,4	0,59
Juli	» 28.—29.	40,0	1,48
August	» 9.—10.	71,6	2,64
September	» 7.—8.	25,3	0,93
October	» 25.—26.	42,8	1,58
November	» 31. Oct.— 1. Nov.	42,5	1,57

V. Winde.

1870.	Wind-still	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW
Dec. (69)	90	3	40	5	15	3	50	6	1
Januar	84	12	12	3	6	4	45	1	10
Februar	78	16	22	7	17	5	16	0	1
März	82	23	18	3	11	5	31	0	2
April	87	29	19	1	6	4	24	2	8
Mai	86	24	21	5	3	6	26	4	4
Juni	80	23	10	1	5	3	39	0	9
Juli	88	19	14	1	6	0	45	0	11
August	84	16	6	2	3	6	54	3	6
Septemb.	86	13	19	1	9	4	35	3	6
October	73	5	8	5	8	7	59	1	0
Novemb.	89	23	7	3	9	12	30	1	5
Jahr	206	163	37	98	59	448	21	63	

VI. Bewölkung.

Mittlere Bewölkung in Zehnteln ausgedrückt.

1870.	1870.
December (69)	7,7
Januar	6,7
Februar	6,7
März	6,7
April	4,1
Mai	4,2
Juni	5,1
Juli	4,3
August	6,5
September	4,9
October	6,2
November	7,9
Jahr	5,9

Bemerkungen.

December 1869. Dieser Monat gehört zu den ungünstigen. Er begann mit grossem Schnee und mässiger Winterkälte bei stets bewölktem Himmel. — Vom 5. bis 14. meist nebelig. — Den 14. wendete die Witterung; es trat Thauwetter ein, fiel bedeutend Regen bei herrschendem Südwestwind. — Vom 25. an wieder Schnee und bedeutende Kälte. — Starke Temperatur- und besonders Barometerschwankungen. — Viel Nebel. — Nur 12 positive, dagegen 19 negative Temperatur-Tagesmittel. — Temperatur nur zwei Mal über $+10,0^{\circ}$ C. — 15. Das Schaffhauser Tagblatt berichtet: „Mittwoch Morgens um 1 Uhr 45 wurde von den hiesigen Wächtern ein prachtvoller Mondregenbogen beobachtet, der über dem Rhein stand.“ — 28. Schneehöhe um 1 Uhr 11 Centimeter.

Januar. Ein, besonders in den letzten 12 Tagen, kalter Januar mit 19 negativen Tagesmitteln. — Vom 18. an blieb die Temperatur stets unter Null, vom 19. an war das Tagesmittel stets unter $-5,0^{\circ}$ C. — Das tiefste Tagesmittel fällt auf den 26. mit $-10,1^{\circ}$ C.

Februar. Ein ausserordentlich kalter Februar. Vom 1. bis 24. mit Ausnahme des 18. und 19. immer negative Tagesmittel. — Im Allgemeinen tiefer Barometerstand, mehr unter als über 700,0 Mm. — 8. Schneehöhe 18 Centimeter. — 9. Schneehöhe 28 Centimeter. — 10. Schneehöhe 34 Centimeter. 11. Schneehöhe 28 Centimeter. — 19. Staaren wurden beobachtet.

März. Ein ausserordentlich kalter März mit 15 positiven und 16 negativen Tagesmitteln; die Temperatur bewegte sich in geringen Schwankungen um $0,0^{\circ}$; 52 Mal war sie höher, 39 Mal niedriger und 2 Mal gerade $0,0^{\circ}$. — Die ersten

5 Tage waren die wärmsten; bereits blühten einige Pflanzen, z. B. Schneeglöcklein und erdbeerartiges Fingerkraut; dann folgten wieder kältere Tage, besonders vom 21. bis 31., für welche Zeit sich sogar ein negatives Mittel ergibt. — 10. Schneehöhe 7 Centimeter. — 12. Schneehöhe 12 Centimeter. — 23. Schneehöhe 12 Centimeter.

April. 5. Nordlicht. — 9. Mondring von 23°. — 10. Auf dem Rosenberg eine sich sonnende Eidechse beobachtet. Erste Blüthen des Immergrüns. An einem Spalier Aprikosenblüthen. — 12. Kleiner Fuchs. — 13. Erste Rauchschwalbe. Es blühen die gemeine Narzisse, die Sumpfdotterblume, das Milzkraut, die hohe Primel, die Kornelkirsche. — 18. Den Kukuk zum ersten Male gehört. — 19. Citronfalter. — 21. Stachelbeersträucher schön grün; Weißdorn fängt an auszuschlagen; die Rosskastanie sprengt die Knospen. — 22. Gundelrebe. — 23. Sauerklee. — 28. Herr Rector Dr. Wartmann erhielt ein Nest mit 3—4 Tage alten Krähen, Herr Dr. Stölker eine Brut von Ohreulen (noch ganz im Flaum).

Mai. Ein schöner, warmer Mai. Die Vegetation entwickelte sich ausserordentlich rasch und üppig. Anfangs des Monats blühten noch Pfirsich- und Aprikosenbaum; dann folgte den 11. der Kirschbaum (allgemein), den 16. der Birnbaum (allgemein) und fast gleichzeitig der Apfelbaum. Den 21. warfen Nussbäume, die 8 Tage vorher die Knospen erst gesprengt hatten, schon die männlichen Kätzchen ab. — Ein empfindlicher Rückschlag mit Reif, welcher jedoch den Bäumen nicht schadete, erfolgte den 26. und 27. — Vier Gewitter, das stärkste den 23. — Reif den 5., 6., 8. und 27. — Barometerstand im Allgemeinen hoch. — Den 30. Beginn der Heuernte.

Tagesmittel	6 Mal unter	10° C.
	10 „ zwischen	10 und 15° C.
	11 „ „	15 und 20° C.
	4 „ über	20° C.

Wärmster Tag den 22. mit 22,0° Tagesmittel.

Kältester	„ „ 4.	3,4° „
Temperatur	25 Mal unter	10° C.
	25 „ zwischen	10 und 15° C.
	26 „ „	15 und 20° C.
	17 „ über	20° C.

7. Auf einem Spaziergang über den Rosenberg und „Peter und Paul“ wurden blühend beobachtet: Moschuskraut, buchsblättrige Kreuzblume; Sumpfdotterblume schon mit Früchten. — Erste Sprysenschwalbe gehört. — 8. Die Buchen fangen an sich zu belauben. — 18. Bei Untereggen ist ein Bienenschwarm im Begriff, den Mutterkorb zu verlassen. — 22. Auf der Seetalp prächtiges Gras. Buchen selbst am Seetalpsee schon belaubt; in der Nähe blühende Frühlingsknotenblumen.

Juni. Keine besondern Bemerkungen.

Juli. Ein sehr warmer, aber trockener Monat. — Wärmster Tag den 11. mit 27,7° C. Tagesmittel. — Die wärmsten Tage vom 6.—12., die Temperatur stand in dieser Zeit stets über 20° C. — An 23 Tagen zeigte das Thermometer wenigstens **ein Mal** (Mittags) über 20° C. an, den 11. sogar 31,6° C., was in St. Gallen zu den grossen Seltenheiten gehört und in einem Jahrzehend etwa **ein Mal** vorkommt. Von allen Seiten her Klage über grosse Trockenheit und schlechte Aussicht für die zweite Heuernte. Der Rasen an vielen Orten ganz verbrannt.

August. Anfangs des Monats noch warme und schöne Tage, gegen das Ende aber kühl, windig und regnerisch. — Die

Temperatur stieg nur noch 11 Mal über 20° C., sank aber auch so viele Male unter 10° C. — Bereits hat die Natur einen herbstlichen Charakter angenommen. — Den 31. schon der erste Reif. — Vom 9. auf den 10. fiel eine ausserordentlich grosse Regenmenge.

September. Vom 1. bis 19. regnerisch, dann noch 12 schöne Tage; im Allgemeinen aber ein kalter Monat. — Nur noch an 5 Tagen stieg die Temperatur über 20° C.; dagegen zeigte das Thermometer an 19 Tagen weniger als 10,0° C. Am frühen Morgen des 25. wurde ein Nordlicht beobachtet.

October. 9. $7\frac{1}{2}$ Uhr Abends 2 Mondregenbogen. — 11. Schnee auf dem Freudenberg, im Thale Reif, an einigen Orten wurde Eis beobachtet. — 24. und 25. Abends Nordlicht.

November. Noch ziemlich mild; doch stellen sich bereits negative Temperaturen ein, bereits 6 negative Tagesmittel. — Den 11. erster auch im Thale sich setzender Schnee. — Einige starke Reife. Gegen Ende des Monats neblig. — Vom 10. bis 20. tiefer Barometerstand, stets unter 700,0 Millimeter.

C.

In Trogen (924 Meter über Meer). Beobachter: Steff. Wanner.

*I. Barometer.***A. Mittlere Barometerstände in Millimetern.**

1870.	7 U. Morg.	1 U. Mittgs.	9 U. Abds.	Mittel.
December (69)	678,01	678,02	678,28	678,10
Januar	682,18	681,99	682,43	682,20
Februar	677,73	677,50	677,84	677,69
Winter	679,31	679,17	679,52	679,33
März	679,23	679,34	679,58	679,38
April	685,20	685,14	685,34	685,23
Mai	684,80	684,62	684,86	684,76
Frühling	683,08	683,03	683,26	683,12
Juni	685,24	685,11	685,55	685,30
Juli	684,17	684,22	684,25	684,21
August	684,28	681,27	684,74	684,43
Sommer	683,56	683,53	683,85	683,65
September	686,39	686,25	686,38	686,34
October	681,24	680,70	680,73	680,89
November	679,42	679,00	679,42	679,48
Herbst	682,25	681,98	682,48	682,14
Jahr	682,05	681,93	682,20	682,06

B. Höchste und tiefste Barometerstände.

1870.	Höchster Stand.	Tiefster Stand.	Schnkgn.
Dec. (69)	690,4 30.	7 U. 664,2 26.	26,2
Januar	687,8 17.	9 U. 677,2 10.	10,6
Februar	688,5 1.	1 U. 666,6 22	21,9
Winter	690,4 30. Dec.	7 U. 664,2 26. Dec.	26,2
März	687,3 20.	9 U. 671,7 11.	15,6
April	691,0 25.	7 u. 1 U. 676,6 29.	14,4
Mai	691,2 19.	7 U. 676,8 2.	14,4
Frühling	691,2 19. Mai	7 U. 671,7 11. März	19,5
Juni	689,8 12.	9 U. 677,4 10.	12,4
Juli	689,4 5.	1 U. 678,0 11.	11,1
August	686,9 30. 9 u. 34	7 U. 675,3 19.	11,6
Sommer	689,8 12. Juni	9 U. 675,3 19 Aug.	14,5
September	691,8 16.	9 U. 674,6 7.	17,2
October	693,2 2.	7 U. 665,7 9.	27,5
November	689,0 5.	7 U. 665,8 11.	23,2
Herbst	693,2 2. Oct.	7 U. 665,7 9. Oct.	27,5
Jahr	693,2 2. Oct.	7 U. 664,2 26. Dec.	29,0

II. Thermometer in Centigraden.

A. Mittlere Temperaturen.

1870.	7 U. Morg.	1 U. Mittgs.	9 U. Abds.	Mittel.
December (69)	— 2,02	+ 0,55	— 1,73	— 1,07
Januar	— 4,06	— 0,97	— 3,19	— 2,74
Februar	— 3,63	+ 0,02	— 3,51	— 2,37
Winter	— 3,24	— 0,43	— 2,81	— 2,06
März	— 1,55	+ 1,43	— 1,20	— 0,44
April	+ 4,97	8,08	+ 4,47	+ 5,84
Mai	11,73	14,75	10,20	12,23
Frühling	8,05	8,09	4,49	5,88
Juni	13,84	16,82	12,35	14,33
Juli	16,94	19,70	15,72	17,45
August	11,85	15,17	11,12	12,74
Sommer	14,24	17,23	13,06	14,83
September	8,68	13,14	9,33	10,39
October	5,40	8,85	6,22	6,82
November	4,46	3,64	4,71	2,27
Herbst	5,18	8,54	5,75	6,49
Jahr	5,30	8,44	5,12	6,29

B. Höchste und tiefste Temperaturen.

1870.	Höchster Stand.	Tiefster Stand.	Schwkngn.
Dec. (69)	9,4 6.	1 U. —11,7 27.	24,4
Januar	7,8 8.	1 U. —14,8 26.	22,6
Februar	14,9 28.	1 U. —13,7 14.	25,6
Winter	14,9 28. Febr.	1 U. —14,8 26. Jan.	26,7
März	12,7 3.	1 U. — 7,5 15.	20,2
April	16,4 24.	1 U. — 2,0 2.	18,4
Mai	23,5 21.	1 U. — 2,0 4.	23,7
Frühling	23,5 24. Mai	1 U. — 7,5 15. März	34,0
Juni	25,6 24.	1 U. 5,0 5.	20,6
Juli	29,4 14.	1 U. 6,6 2.	22,5
August	24,8 2.	1 U. 4,6 27.	20,2
Sommer	29,4 14. Juli	1 U. 4,6 27. Aug.	24,5
September	23,0 6.	1 U. 2,4 23.	20,6
October	15,5 8.	1 U. — 0,9 14.	16,4
November	14,6 25.	7 U. — 6,4 12.	21,0
Herbst	23,0 6. Sept.	1 U. — 6,4 12. Nov.	29,4
Jahr	29,1 14. Juli	1 U. —14,8 26. Jan.	43,9

*III. Psychrometer.***A. Mittel des Wasserdampfgehaltes der Luft in Procenten des Sättigungsgrades.**

1870.	7 U. Morg.	1 U. Mittgs.	9 U. Abds.	Mittel.
December (69)	85,9	80,3	87,0	84,4
Januar	82,5	77,8	82,5	80,9
Februar	84,1	78,9	83,4	82,4
Winter	84,2	79,0	84,3	82,5
März	88,5	81,5	85,9	85,3
April	74,4	62,4	70,5	69,0
Mai	72,7	63,2	75,0	70,3
Frühling	78,5	68,9	77,4	74,9
Juni	73,8	62,0	76,3	70,7
Juli	72,7	64,9	72,8	70,4
August	82,9	74,8	84,7	79,8
Sommer	76,5	66,2	77,9	73,5
September	85,7	72,9	83,7	80,7
October	82,0	73,5	79,0	78,4
November	84,5	81,3	83,8	83,2
Herbst	84,4	75,9	82,2	80,7
Jahr	80,8	72,5	80,4	77,9

B. Grösste und geringste Trockenheit.

1870.	Minimum der einzelnen Beobachtungen. %	Trockenste Tage. %.	Feuchteste Tage. %.
Dec. (69)	d. 6. 7 U. mit 40	d. 6. mit 61	d. 22. 25. mit 100
Januar	34. 4 U. 39	34. 47	18. 21.-23. 100
Februar	27. 9 U. 28. 7 U. 40	28. 49	7.-12.15.-16.20.100
März	3. 9 U. 39	3. 46	7. u. 19. 100
April	22. 4 U. 25	9. 37	29. 92
Mai	16. 7 U. 43	1. u. 16. 55	24. 87
Juni	24. 4 U. 39	30. 55	20. 84
Juli	11. 9 U. 28	11. 32	28. 95
August	2. 4 U. 49	2. 55	6. 90
Septemb.	6. 4 U. 37	6. 45	16. u. 27. 94
Octob.	23. 9 U. 32	23. 44	3. 94
Novemb.	23. 7 U. 42	25. 39	28. 100
Herbst	25. Nov. 7 U. 42	25. Nov. 39	28. Nov. 100
Jahr	25. Nov. 7 U. 12	11. Juli 32	18. Mai 100

*IV. Pluviometer.***A. Totale Regenmenge in Millimetern.**

1870.	7 U. M. — 1 U.	1 U. — 7 U. A.	7 U. M. — 7 U.	7 U. A. — 7 U.	Summe.
Dec. (69)	17,6	27,3	44,9	40,4	85,3
Januar	5,7	5,4	11,1	13,5	24,6
Februar	7,1	4,3	11,4	11,8	23,2
Winter	30,4	37,0	67,4	65,7	133,1
März	28,7	29,7	58,4	35,7	94,4
April	14,3	47,6	61,8	21,4	82,9
Mai	4,8	13,1	17,9	30,5	48,4
Frühling	47,8	90,3	138,1	87,3	225,4
Juni	8,6	34,3	42,9	35,1	78,0
Juli	45,8	22,8	68,6	56,8	125,4
August	24,9	48,9	70,8	155,8	226,6
Sommer	76,3	106,0	182,3	247,7	430,0
Septemb.	17,5	25,0	42,5	84,7	127,2
October	22,9	50,0	72,9	103,5	176,4
Novemb.	6,3	18,9	25,2	66,7	91,9
Herbst	46,7	93,9	140,6	254,9	395,5
Jahr	201,2	327,2	528,4	655,6	1184,0

B. Grösste Wassermenge in 24 Stunden.

1870.	Tag.	Millimeter.
December (69)	30. Nov.— 1.	27,0
Januar	17.—18.	7,0
Februar	7.— 8.	10,0
März	17.—18.	28,4
April	27.—28.	32,5
Mai	23.—24.	27,7
Juni	31. Mai — 1.	22,3
Juli	28—29.	50,9
August	9.—10.	103,6
September	7.— 8.	37,7
October	30.—31.	30,4
November	31. Oct.— 1.	42,5

C. Anzahl der Tage mit und ohne Regen oder Schnee.

1870.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.	1870.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.
Dec. (69)	17	44	Juni	15	15
Januar	14	17	Juli	13	18
Februar	7	21	August	22	9
Winter	38	52	Sommer	50	42
März	17	14	September	13	17
April	10	20	October	19	12
Mai	10	21	November	10	20
Frühling	37	55	Herbst	42	49
			Jahr	167	198

D. Längste Trockenheit.

1870.	Datum.	Dauer.
December (69)	vom 3.—14.	11 Tage.
Januar	» 29. Dec. — 8.	9 "
Februar	» 27. Jan. — 7. u. 10.—19.	11 u. 9 Tage.
März	» 25. Feb. — 4.	7 Tage.
April	» 25. März — 10.	16 "
Mai	» 24.—34.	7 "
Juni	» 9.—14. u. 19.—24.	5 "
Juli	» 18.—25.	7 "
August	» 12.—18.	6 "
September	» 19. Sept. — 8. Oct.	19 "
October	» 3.—10. u. 24.—4. Dec.	7 "
November		

V. Winde.

Die Winde werden in 4 Stärken unterschieden und die betreffenden Zahlen für jeden Monat und jede Windrichtung zusammengezählt. Unter «Windstill» sind alle Windrichtungen ohne merkbare Stärke addirt.

1870.	Windst.	Nord.	Nordost.	Ost.	Südost.	Süd.	Südwest.	West.	Nordwest.
December (69)	68	0	2	0	0	6	18	9	0
Januar	63	4	8	0	0	1	19	7	0
Februar	63	0	0	0	0	9	15	10	0
Winter	194	4	10	0	0	16	52	26	0
März	50	3	10	0	0	3	28	8	1
April	55	6	4	1	0	5	11	8	4
Mai	58	7	1	0	0	1	11	9	5
Frühling	163	16	15	1	0	9	50	25	10
Juni	44	10	7	1	0	0	14	20	0
Juli	60	9	0	4	0	12	9	10	0
August	46	7	0	0	0	2	35	11	2
Sommer	150	26	7	2	0	14	58	41	2
September	59	10	0	0	0	8	13	3	2
October	40	1	0	0	0	6	72	4	0
November	61	2	11	0	0	18	5	3	0
Herbst	160	13	11	0	0	32	90	10	2
Jahr	667	59	43	3	0	71	250	102	14

VI. Mittlere Bedeckung des Himmels in Procenten.

1870.	Procente.	1870.	Procente.
December (69)	62	Juni	54
Januar	65	Juli	39
Februar	64	August	66
Winter	63	Sommer	52
März	73	September	45
April	39	October	60
Mai	43	November	74
Frühling	52	Herbst	60
		Jahr	57

VII. Gewitter.

1870.	In Trogen.	Nahe (Donner).	Entfernte.
Mai	4	3	2
Juni	7	5	2
Juli	4	2	1
August	1	3	4
September	1	0	1
October	1	0	0
Jahr	18	13	10

Gewitter an demselben Tage sind nur dann getrennt berechnet, wenn sie zeitlich bedeutend auseinander liegen. Erfolgten 3 oder 2 Erscheinungen zu gleicher Zeit, so ist dies doch nur in der ersten (resp. zweiten) Rubrik gerechnet.

VIII. Periodische Erscheinungen.

December 1869. 22. *Bellis perennis*.

Februar. 18. Erste Blüthen von *Tussilago Farfara*. Ankunft der Staaren. 27. Staaren, Finken und Meisen singen. Spinnen (*Lycosa*), Fliegen, Mücken, Bienen, Wespen, Kleinfalter. 28. Ankunft von *Motacilla alba*.

März. 1. Fliegender Fuchs. 3. Citronenfalter. Spinnen (*Lycosa*). Eidechse. Ruf der Ammenkröte. *Primula elatior*. 4. *Alnus incana*. *Caltha palustris*.

April. 5. *Viola odorata*. 6. Stimmen von *Alytes obstetricans*. *Primula elatior*. *Tussilago Farfara*. *Caltha palustris*. *Anemone nemorosa*. 7. *Corylus avellana*. 8. *Ficaria ranunculoides*. *Fragaria vesca*. Erste fliegende Hummel. 9. Thränen des Weinstocks. 10. *Chrysosplenium alternifolium*. 11. Ruf des Kukuks. 15. Wiesen fangen an zu grünen. 18. *Salix caprea*. Ankunft der Hausschwalbe. 19. Kreuzspinnen-netz. 22. *Ribes grossularia* belaubt. 23. Birnbäume am Spalier belauben sich und beginnen zu blühen. 27. *Cardamine pratensis*. *Anthriscus sylvestris*. 28. *Pinus Larix*. 30. *Taraxacum officinale*. 30. *Pinus Larix* mit grünlichem Anflug.

Mai. 1. Pyrus Malus am Spalier beginnt zu blühen. 4. Ribes grossularia. Betula alba. Letzter Schneefall. 9. Prunus Cerasus. Ribes rubrum belaubt sich. 10. Fagus sylvatica belaubt sich. Blüthe von Fraxinus excelsior. 11. Ribes rubrum. 14. Pinus Larix ganz belaubt. Prunus Cerasus in voller Blüthe. 15. Pyrus communis. Lychnis diurna. 16. Volle Belaubung von Fagus sylvatica. 18. Anthoxanthum odoratum. Geum rivale. Linde beblättert. 20. Pyrus Malus. Pyrus communis in voller Blüthe. Prunus Cerasus verblüht. Rhododendron ferrugineum. 21. Tragopogon pratense. 22. Taraxacum officinale mit Früchten. 23. Pyrus Malus in voller Blüthe. 26. Pyrus communis verblüht. 27. Letzter Reif.

Juni. 1. Pyrus Malus verblüht. 13. Beginn der Heuernte. 24. Beginn der Traubenblüthe (am Spalier).

August. 13. Beginn der zweiten Heuernte. Erste blaue Traubenbeeren. 18. bis 31. Unterbruch der Heuernte. Wiederbeginn den 31. 31. Erster Reif, 96 Tage nach dem letzten.

September. 14. und 15. Abzug der Hausschwalben.

October. 10. Erster Schnee, 159 Tage nach dem letzten. 6. Beginn des Laubfalls. 14. Eschen entlaubt. 22. bis 23. Abzug der Staaren. 24. Buchen entlaubt.

November. 1. Birn- und Apfelbäume entlaubt. 25. Lärchen entlaubt.

Allgemeine Witterung.

December 1869. Der Anfang des Monats bis zum 5. war kalt, dann begannen wärmer und meist helle Tage, den 14. trat Schneefall ein, welcher mit geringen Unterbrechungen fast den ganzen Monat dauerte, sowie auch die den 22. beginnende Kälte. Die letzten drei Tage waren hell, aber kalt. Die Winde vertheilten sich fast ausschliesslich auf S., SW. und W.

Januar. Die erste Hälfte, mit Ausnahme der Tage vom 11. bis 14., war warm mit SW. und W., den 17. begann mit N. und NO. bedeutende Kälte, welche bis zum Schlusse des Monats andauerte. Indess herrschte vom 25. an meist prächtige, helle Winterwitterung. Schnee fiel hauptsächlich, wenn auch in geringer Menge, vom 11. bis 19.

Februar. Die schöne, kalte Witterung setzte sich noch fort bis zum 7., der grösste Theil des Monats aber war düster bei andauernder Kälte, und erst den 24. begann wärmere, hellere Witterung. Die Winde waren fast ausschliesslich W. und SW.

März. Bis zum 5. dauerte die milde Witterung, so dass manche Boten des erwachenden Frühlings sich einstellten, der Winter gewann jedoch schnell wieder die Oberhand und führte ein strenges Regiment mit kalten, nebligen und bedeckten Tagen und häufigen Schneefällen, die mit geringen Unterbrechungen bis zum 25. dauerten. Fast der ganze Monat war windig und ziemlich häufig herrschte auch die Polarströmung.

April. Ein heller, trockener und kühler Monat, so dass die Naturentwicklung sehr langsam vor sich ging. Erst vom 24. an beginnen stärkere Regen und mit ihnen lebhafteres Wachsthum der Pflanzenwelt.

Mai. Ebenfalls hell und trocken und Anfangs noch recht kühl. Regen fiel ausserordentlich wenig, dagegen war sehr häufig Thau. Winde wehten wenig.

Juni. Ein warmer Sommermonat, mit vielen Gewittern, aber wie seine beiden Vorgänger mit wenig Regen, so dass die Wassermenge dieser drei Monate nicht die Hälfte der normalen Menge ausmacht. Die Windströmung erreichte eine bedeutende Intensität und vertheilte sich auf die Hauptrichtungen.

Juli. Die warme, schöne und trockene Witterung setzte sich fast durch den ganzen Monat fort, und erst gegen das Ende desselben fanden bedeutendere Regengüsse statt. Die Winde, ohne bedeutende Stärke, vertheilten sich wieder auf die verschiedenen Hauptströmungen.

August. Dieser Monat setzte sich in vollsten Gegensatz zu seinen Vorgängern; die in den ersten Tagen noch herrschende Sommertemperatur sank rasch und machte gegen Ende des Monats einer empfindlichen Kälte Platz, so dass am 26. und 27. ganz allgemein eingehiezt wurde und in den Bergen bedeutende Schneefälle stattfanden. Den 31. fand schon ein Reif statt. Die Temperatur blieb nahe 2° unter dem 6jährigen Mittel. Weitaus den grössten Theil des Monats fanden, bei herrschenden Aequatorialwinden, Regenfälle statt, wenn auch mit geringer Regenmenge.

September. Während den ersten zwei Dritteln des Monats regnete es ebenfalls häufig, bei vorherrschenden S.-, SW.- und W.-Wind. Am 19. begann, mit der Polarströmung, länger andauernde, trockene und helle Witterung. Die Temperatur war meist eine sehr tiefe, und das Monatsmittel bleibt um fast $3\frac{1}{2}^{\circ}$ unter dem 6jährigen Mittel. Vom 23. an zeigten sich Morgens schon starke Reife.

October. Die helle, aber kühle Witterung mit vorherrschendem N. dauerte bis zum 9., dann begannen düstere, regnerische Tage mit häufigem SW., der namentlich im letzten Drittel des Monats eine bedeutende Stärke erreichte. Die Temperatur nahm im Verlauf des Monats wenig ab.

November. Den 1. brachte NO. ein Sinken der Temperatur, welche sich bis zum 12. meist unter 0° bewegte, dann begannen S. und SW., mit meist milder, aber düsterer Witterung. Niederschläge fanden selten statt.

Das Jahr 1869/70 kann im Allgemeinen als ein kaltes, trockenes bezeichnet werden. Von den einzelnen Monaten zeigen nur Juni und Juli einen bedeutenden Wärmeüberschuss, während fast alle andern unter dem 6jährigen Mittel bleiben, einzelne sehr bedeutend. Wenn auch die Anzahl der Tage mit Niederschlägen die normale erreicht, bleibt doch die Niederschlagsmenge tief unter dem bisherigen Mittel.

IX. Verlauf der Gewitter.

Mai. 9. 4 U. 30 — 5 U. 20 Gewitter von W. mit 2 einzigen Donnerschlägen. Vor und nach dem Gewitter Ostwind. — 10. 3—4 U. schwaches Gewitter von West. — 14. 3 U. Gewitter von SW. — 18. und 19. Abends Wetterleuchten. — 22. $1\frac{1}{2}$ U. Donner im S. — 23. $12\frac{1}{4}$ bis $12\frac{1}{2}$ U. Donner im S. 4 U. Donner im W. 7—8 U. Donner im N. $8\frac{1}{4}$ U. Gewitter von W. mit Platzregen, bis $9\frac{1}{4}$ dauernd (Regen 21,1 mm.). Donner und Blitze bis 10 U.

Juni. 4. Abends Wetterleuchten im SW. 11 Uhr Gewitter in Trogen. — 5. $8\frac{1}{4}$ U. Morgens einziger Donnerschlag. $11\frac{3}{4}$ U. Gewitter über dem Bodensee. 1 U. Gewitter über dem Bodensee. — 7. $5\frac{3}{4}$ — $6\frac{1}{4}$ Gewitter von S., welches von einer NO.strömung erfasst von Trogen aus nach W. zieht. (Regen 4,9 mm.). — 14. Abends 10—11 U. Wetterleuchten im S. — 15. $3\frac{1}{2}$ —5 U. Donner zweier nacheinander im S. und SO. vorbeiziehender Gewitter. — 16. $3\frac{1}{4}$ —4 U. Donner im S. — 17. Donner im W. $5\frac{3}{4}$ —6 U. — 24. Erster Donner im W. $1\frac{3}{4}$ U., Gewitter mit Sturm 2— $2\frac{1}{4}$ U., wenige Minuten heftiger Platzregen (4,1 mm.). Bis 3 U. folgen noch 2 Gewitter mit sehr heftigen Donnerschlägen, aber wenig Regen. Gewitter mit heftigem Donner aber wenig Regen $6\frac{1}{4}$ U. Heftiges Gewitter mit starkem Regen 7 U. Während des Gewitters von 2— $2\frac{1}{4}$ U. sank die Temperatur von $25,6^{\circ}$ auf $15,4^{\circ}$, also um mehr als 10° innert

einer Viertelstunde. — 25. Gewitter 12—12 $\frac{1}{4}$ U. mit Platzregen und wenig Hagel. (Regen 2,1 mm.) Einziger Donner 12 U. 20 M.

Juli. 8. Von 2 U. an Donner im S. 4 U. 20 M.—5 U. 20 M. Gewitter von SW., beim Eintreffen mit heftigem Wind. (Regen = 10,0). — 9. Gewitter 10 $\frac{3}{4}$ —12 U. (Regen = 3). Donner im S. 1 $\frac{1}{2}$ U. — 26. Morgens 3 U. 40 M.—4 U. Gewitter SO. vorbeiziehend mit äusserst heftigen Donnerschlägen, aber bei der Station ohne Regen. — 27. Gewitter von NW. 11 $\frac{1}{4}$ U.—12 U., sehr heftig in der Gegend von St. Gallen. — 30. Abends Blitze im N. und NO. — 31. Nachmittags Donner.

August. 1. Gewitter aus SW. mit Platzregen 1 U. 10 M.—1 U. 20. M. (Regen = 10,6 mm.). — 3. Seit 5 $\frac{3}{4}$ U. zuweilen Donner im O. und NO. — 5. Nachmittags Donner im O. Nach 9 U. Blitze im W. und SW. — 13. Abends Wetterleuchten im S. — 14. Ebenfalls im N. und O. — 15. Abends Wetterleuchten. — 19. Abends 8 U. 2 Mal Donner im O.

September. 3. 3 $\frac{1}{4}$ —3 $\frac{3}{4}$ U. Gewitter von SW. mit starkem Wind und Regen, dann einige Zeit Hochnebel bei fort dauerndem Regen. Abends Wetterleuchten im N.

October. 9. 1 U. 5 M. Donner im SW., plötzlicher Eintritt von SW. 3—4 U. mit heftigem Regen, dann noch einige Donnerschläge, Regen bis um 2 U., Wind den ganzen Nachmittag.

X. Bemerkungen.

December 1869. Schneehöhen Mittags 1 U. 1. = 13 Centimeter; 2. = 14; 3. 4. = 25; 5. = 18; 6. = 10; 7. = 8; 15. = 6; 16. = 8; 17. = 0; 18. = 1; 19. = 0; 21. = $\frac{1}{2}$; 22. = 0; 23. = $\frac{1}{2}$; 24. = 0; 25. = 8; 26. = 10; 27. = 9; 28. = 14; 29. = 17.

Nebel an 6 Tagen. Hochnebel an 5 Tagen. Nebel in der Tiefe an 12 Tagen. Wenn Nebel im Verlauf desselben Tages in der Tiefe, bei der Station und in der Höhe beobachtet wurde, so sind diese Tage nur als Nebeltage bei der Station gerechnet. Duft (Pick) an 10 Tagen.

Ueber die Witterung vom 5.—7. siehe Sonntagspost Nummer 18, Jahrgang 1870. 15. Morgens Glatteis. 16. Mondhof mit grossem Radius. 30. Venus so hell leuchtend, dass die Gegenstände Schatten werfen. 30.—31. Föhn.

Januar. Schneehöhen. 1. = 10; 2. = 6; 8. = 0; 11. = $\frac{1}{2}$; 12. = 1; 13. = 4; 14. = 7; 15. = 2; 16. = 3; 17. = 6; 18. = 25; 19. = 33; 31. = 30.

Nebel an 5 Tagen. Hochnebel an 8 Tagen. Nebel in der Tiefe an 9 Tagen. Duft an 6 Tagen. Riesel an 1 Tag.

2. Föhn. 3. 12 U., schwacher Sonnenhof mit grossem Radius. 12. Abends 6 U., Mondhof mit grossem Radius.

Februar. Schneehöhen: 6. = 17; 7. = 17; 8. = 30; 9. = 36; 10. = 39; 11. 12. = 42; 13. = 34; 14.—16. = 30; 19. 21. = 20; 22. 23. = 23; 28. = 15.

Nebel an 7 Tagen. Hochnebel an 4 Tagen. Nebel in der Tiefe an 10 Tagen. Duft an 5 Tagen.

13.—14. siehe Sonntagspost. 20. Morgens Nebelreissen, alle Gegenstände werden mit Glatteis überzogen. 21. Die Oberfläche des Schnees ist ganz vereist, ebenso die Oberflächen aller Gegenstände. 27.—28. Föhn.

März. Schneehöhen: 1. = 10; 5. = 0; 6. = 6; 7. = 6; 8. = 5; 9. = 2; 10. = 10; 11. = 15; 12. = 30; 14. = 36; 16. = 28; 17. = 18; 18. = 3; 19.—22. = 0; 23. = 19; 24. = 24; 26. = 11.

Nebel an 6 Tagen. Hochnebel an 9 Tagen. Duft an drei Tagen. Riesel an 2 Tagen.

2. Abends bis 3. Morgens Föhn. 15. Nach 9 U. Mondhof mit grossem Radius.

April. Schneehöhen: 1. = 8; 4. = 0; 12. Morgens = 1, Mittags = 0; 16. Morgens = 5, Mittags = 0; 28. Morgens = 1, Mittags = 0; 29. = 1; 30. Morgens = 1, Mittags = 0.

Nebel an 2 Tagen. Hochnebel an 1 Tag. Nebel in der Tiefe an 2 Tagen. Reif an 6 Tagen. Riesel an 2 Tagen. Thau an 8 Tagen.

5. Abends zwischen 8 und 9 U. Nordlicht. 8. Nachmittags Föhn. 27. Morgens Föhn. 29. und 30. Boden gefroren.

Mai. Schneehöhen: 4. Morgens = 1, Mittags = 0.

Reif an 4 Tagen. Thau an 20 Tagen. Nebel an 2 Tagen. Nebel in der Tiefe an 1 Tag. Hochnebel an 3 Tagen. Riesel an 2 Tagen.

5. Morgens 5 U. 5 Millimeter dickes Eis auf dem Brunnen. 9. Regenbogen 5—5 U. 20 M. 16. Föhn. 24.—28. Höhenrauch. 24. Sonne schon einige Zeit vor dem Untergang mit rother nichtstrahlender Scheibe.

Juni. Nebel an 1 Tag. Hochnebel an 2 Tagen.

Thau an 12 Tagen.

1. Regenbogen $6\frac{1}{2}$ U.

Juli. Nebel an 3 Tagen. Nebel in der Tiefe an 7 Tagen. Thau an 8 Tagen.

4. Morgens Cirri, später tiefer Cumuli, in der Höhe immer noch Cirri. In diesen zeigte sich $6\frac{1}{2}$ —7 U. zwischen Sonne und Zenith ganz nahe an letzterm ein Bogen, convex gegen die Sonne, mit ganz deutlichen Spectralfarben. 9. Abends Föhn. 11. Föhnsturm. 12. Föhn.

August. Nebel an 7 Tagen. Nebel in der Tiefe an 2 Tagen. Thau an 10 Tagen. Reif an 1 Tag.

2. Abends bis 3. Mittags Föhn. 10. Regenbogen $4\frac{1}{2}$ U.

September. Nebel an 9 Tagen. Nebel in der Tiefe an 7 Tagen. Hochnebel an 1 Tag. Thau an 17 Tagen. Reif an 6 Tagen.

(Tage, an denen Reif und Thau zugleich beobachtet wurden, sind bei beiden gezählt.) Riesel 2 Mal.

5. Abends 8 U. bis 7. Abends $8\frac{1}{2}$ U. Föhn. 8. Regenbogen 3 und 5 U. 10. Regenbogen $9\frac{1}{4}$ U. 24. Abends und 25. Morgens starkes Nordlicht. 25. Nachmittags am Osthimmel eine Schicht zarten Gewölks in Streifen gegen W. und auf der Westseite mit eigenthümlich zerfaserten Rändern.

October. Nebel an 4 Tagen. Hochnebel an 5 Tagen. Nebel in der Tiefe an 4 Tagen. Thau an 2 Tagen. Reif an 8 Tagen. Riesel an 2 Tagen.

Schneehöhen: 10. Abends = 1 Cm.; 11. = 0; 29. = 3; 30. = 0.

8. Föhn. 10. Regenbogen 2 U. 19.—20. Morgens Föhn. 23. Föhn. 24. Abends Nordlicht. 30. Regenbogen $1\frac{3}{4}$ U.

November. Schneehöhen: 1.—3. = 3; 6. = 1; 9. = 0; 12. = 10; 19. = 0.

Nebel an 9 Tagen. Hochnebel an 5 Tagen. Nebel in der Tiefe an 6 Tagen. Thau an 2 Tagen. Reif an 1 Tag. Duft an 3 Tagen. Riesel an 2 Tagen.

10. Föhn. 13. Föhn. 18. Föhn. 23. Morgens $7\frac{1}{2}$ U. kurzes Stück eines Regenbogens im N., auf dem Horizont aufruhend, ohne dass irgend eine Spur von Regen bemerkbar ist. Dauer 10 Minuten. 24. Nachmittags bis 26. Föhn.