Zeitschrift: Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen

Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

Band: 18 (1876-1877)

Rubrik: Meteorologische Beobachtungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

IX.

Meteorologische Beobachtungen. Jahr 1877.

A.

In Altstätten (478 Meter über Meer). Beobachter: R. Wehrli.

I. Barometer.

A. Mittlere Barometerstände in Millimetern.

1877.	Morg. 7 U.	Nachm.1U.	Abds. 9 U.	Mittel.
Januar	724,69	724,84	722,02	721,84
Februar	720,77	720,64	720,44	720,64
März	745,36	715,04	745,43	745,48
Winter	719,27	749,45	749,20	749,24
April	745,46	714,72	745,09	714,99
Mai	748,47	747,94	748,42	718,08
Juni	723,40	722,57	723,45	723,04
Frühling	748,94	748,44	748,79	718,70
Juli	722,66	722,44	722.57	722,45
August	722,04	721,40	722,02	724,84
September	724,88	721,74	722,00	724,87
Sommer	722,48	724,75	722,20	722,04
October	723,48	722,86	723,20	723,08
November	749,42	748,80	749,44	749,42
December	721,85	724,83	722,74	722,13
Herbst	721,48	721,16	721,68	721,44
Jahr	720,46	720,12	720,47	720,35

B. Höchste und tiefste Barometerstände.

1877.	Max	Maximum.			imun	Schwankng.	
Januar	720.0	Tag	Std.	707,5	Tag	Std.	25,4
Februar	732,9 734,6	21. 5.	1.9	706,4	24.	7	25,4 25,5
März	730,4	2.	1.9	700,3	20.	7	30,4
Winter	732,9	2.	1 "	700,3	20.	'	32,6
April	723,3	45 .	7	703,4	18.	7	19,9
Mai	726,4	16.	7.9	709,4	6.	7	16,7
_ Juni	728,4	29.	9	748,2	22.	1	9,9
Frühling	728,4			703,4			24.7
Juli	729,9	29.	9	744,3	15.	4	18,6
August	726,4	27.	7	747,0	8.	4	9,4
September	727,6	27.	7	744,7	24.	1	15,9
Sommer	729,9		1 1	744,3			48,6
October	729,9	17.	9	712,2	24	4	47,7
November	734,2	45.	7	705,3	2 9.	9	25,9
December	733,9	15.	9	705,7	26.	4	28,2
Herbst	733,9			705,3			28,6
Jahr	733,9			700,3			33,6

II. Thermometer.

A. Mittlere Temperatur in Graden nach Celsius.

1877.	Morg. 7 U.	Nachm. 1U.	Abds. 9 U.	Mittel.
Januar	2,85	6,45	4,47	4,49
Februar	2,09	5,07	3,39	3,52
März	4,27	5,74	2,77	3,25
Winter	2,07	5,74	3,44	3,75
April	6,32	11,26	7,75	8,44
Mai	8,98	43,75	9,82	10,85
Juni	17,23	24,16	48,40	19,83
Frühling	10,84	46,39	44,89	43,04
Juli	45,86	20,57	46,06	47,50
August	16,57	22,83	17,87	19,09
September	10,54	15,47	11,75	12,58
Sommer	14,31	19,62	45,23	46,39
October	5,24	10,23	6,85	7,43
November	4,35	8,47	5,82	6,24
December	- 0,58	1,79	0,15	0,45
Herbst	2,99	6,83	4,27	4,70
Jahr	7,55	12,14	8,71	9,47

B. Extreme der Temperatur in Graden nach Celsius.

1877.	Maxi	mur	n.	Min	imum	•	Schwankung.
Januar Februar Marz Winter April Mai Juni Frühling Juli August September Sommer October November December Herbst Jahr	47,6 40,9 47,2 47,6 20,2 24,8 30,2 30,2 30,2 30,8 24,7 30,8 46,8 46,8 46,8 46,8	Tag 9. 46. 29. 40. 28. 42. 24. 7. 45.	Std.	- 5,0 - 5,2 - 9,2 - 9,2 0,6 2,4 11,2 0,6 11,8 2,7 - 0,6 - 0,8 - 9,4 - 9,4 - 9,4	Tag 24. 28. 42. 47. 3. 4. 8. 3. 27. 49. 26.	Std. 7 7 7 7 9 9 7 7 9 7	22,6 46,4 26,4 26,8 49,6 49,6 49,0 29,6 49,2 49,0 22,0 28,4 47,4 46,0 47,0 26,2 40,2

III. Psychrometer.

A. Mittel des Wasserdampfgehaltes der Luft in Procenten.

1877.	Morg. 7 U.	Nachm. 1U.	Abds. 9 U.	Mittel.
Januar	76,9	66,0	73,4	72,4
Februar	84,6	74,1	79,1	79,3
März	84,3	66,8	80,4	77,2
Winter	84,9	69,0	77,6	76,2
April	80,3	61,7	75,2	72,4
Mai	84,1	62,7	785	75,1
Juni	74,0	53,3	67,2	64,8
Frühling	79,5	59,2	73,6	70,8
Juli	82,6	66,6	83,9	77,7
August	85,4	63,7	79,9	76,3
September	86,0	68,8	80,5	78,4
Sommer	84,7	66,4	81,4	77,5
October	84,2	69,8	78,8	77,6
November	84,7	72,9	82,0	79,9
December	92,4	82,9	94,6	89,0
Herbst	87,1	75,2	84,1	82,4
Jahr	83,3	67,4	79,2	76,6

B. Trockenste und feuchteste Tage.

1877.	e.	nimum (inzelner oachtun	1	Trocken	ste Tage.	Feuch	teste Tage
T	den			den		den	
Januar	_1.	7 U.	$16^{0}/o$		$nit 22^{0}/o$	23.	mit 990/0
Februar	26 .	4 U.	51	25., 26.	63	2.	99
März	24.	1 U.	29	27.	53	6.	95
Winter			16		22	16	99
April	10.	4 U.	16	9.	30	17.	92
Mai	28.	1 U.	27	28.	42	7., 2	4. 92
_Juni	29.	1 U.	38	12.	49	22.	87
Frühling		- 1.1.1	16		30		92
Juli	24.	4 U.	30	24.	37	3., 4	9. 91
August	19.	9 U.	40	19.	54	34.	93
September	7.	9 U.	40	7.	56	9.	94
Sommer			30	1.4	37		94
October	16.	1 U.	54	6., 16	64	29.	93
November	12.	34 U.	35	12.	55	11.	96
December	12.	4 U.	64	34.	80	17.	100
Herbst		****	35	17.75	55		100
Jahr			16	1 1 1	22		100

IV. Pluviometer.

A. Anzahl der Tage mit und ohne Regen oder Schnee.

1877.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.	1877.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.
Januar	9	22	Juli	22	9
Februar	23	5	August	43	18
März	15	16	September		19 i
Winter	47	43	Sommer	46	46
April	20	10	October	9	22
Mai	20	44	November	12	18
Juni	40	20	December	45	46
Frühling	50	41	Herbst	36	56
	1 100	5	Jahr	179	186

B. Längste Trockenheit.

1877.	Datum.	Zahl der Tage ohne Regen oder Schnee.
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November December	Vom 3.—40. 24.—29. 24.—29. 27.—29. 2-8. 24.—23. 4.—7. 43.—20. 43.—23. 4.—40. 4.—7.	8 Tage. 4

C. Totale Regenmenge.

1877.	Milli- meter.	Schweiz. Zoll.	1877.	Milli- meter.	Schweiz. Zoll.
Januar	70,5	2,35	Juli	287,4	9,57
Februar	195,4	6,54	August	456,9	5,23
März		3,34	September	54,2	1,74
Winter	366,0	42,20	Sommer	495,2	16,54
April	493,0	6,43	October	58,6	
Mai	447,9	3,93	November	73,2	2,44
Juni	74,6	2,49	December	445,0	3,83
Frühling	385,5	12,85	Herbst Jahr	246,8 1 493,5	8,23 49,78

D. Grösste Wassermenge in 24 Stunden.

1877.	Datum.	Millimeter
Januar	25.	17,4
Februar	43.	72,9
März	30.	24,5
April	22.	33,5
Mai	12.	34,4
Juni	22.	48,2
Juli	15.	37,4
August	24.	39,2
September	9.	15,5
October	8.	46,5
November	43.	11,0
December	18.	29,1

V. Bedeckung des Himmels in Procenten.

1877.	Procente.	1877.	Procente.
Januar	57	Juli	63
Februar	82	August 18	50
März	68	September	55
Winter	69	Sommer	56
April	68	October	54
Mai	74	November	65
Juni	36	December	80
Frühling	59	Herbst Jahr	66 62

VI. Zahl der Tage mit Nebel.

1877.	Tage.	1877.	Tage.
Januar Februar	2 4	Juli August September	0 0
März Winter April	2 5 0	Sommer October	0 2
Mai Juni	0	November December	8
Frühling	0	Herbst Jahr	16
	.52		34 *

VII. Zahl der Gewitter.

1877.		1877.	
Januar	0	Juli August September Sommer October November December Herbst Jahr	8
Februar	0		7
März	4		2
Winter	4		47
April	2		0
Mai	2		0
Juni	4		0
Frühling	7		0

VIII. Winde, den stärksten Sturm zu 4 berechnet.

1877.	Windst.	Nord.	Nordost.	Ost.	Südost.	Süd.	Südwest.	West.	Nordwst.	Summe.	
Januar	65	0	2	0	0	43	21	2	0	38	١
Februar	70	0	0	0	0	1	12	6	0	19	١
März	74	2	0	1	0	4	12	5	0	24	ı
Winter	1	2 2	2	1	0	18	45	13	0	81	ı
April	76	1	0	0	0	6	44	0	0	18	١
Mai	87	1	0	0	0	3	2	1	0	7	١
Juni	83	4	1	2	0	0	2	2	0	8	I
Frühling		3	1	2	0	9	15	3	0	33	١
Juli	87	0	0	1	0	1	4	2	0	8	١
	83	1	4	i	ő	2	2	ō	Ŏ	9	١
August September	85	1	Õ	1 1	ő	ō	1	2	Ŏ	5	١
Sommer	00	2	4	2	ŏ	3	7	4	Ŏ	22	۱
	00	6	3	ō	Ö	1	5	Ô	2	17	ı
October	80					1			1		ļ
November	80	0	0	0	0	0	13	0	1	14	۱
December	86	0	0	0	0	1	3	3	0	7	۱
Herbst		6	3	0	0	2	24	3	3	38	١
Jahr	956	13	10	5	0	32	88	23	3	174	I

IX. Grösste Tiefe des Schnees in Centimetern.

1877.	Centmtr. Datum.	1877.	Centmtr. Datum.
Januar Februar März April Mai Juni	3 22., 27. 16 28. 6 2. 8 17. 0	Juli August September October November Dezember	0 0 0 0 0 0 20 28.

X. Ernteergebnisse.

1876.	Qualitat.	Quantität.
Korn	gut	gut
Mais	mittler	mittler
Kartoffeln	gering	gering
Wein	mittler	»
Aepfel		mittler
Birnen	A THE STATE OF STREET	gering
Kirschen	nagdi szedskii A) »
Zwetschen))
Baumnüsse	Bury Many Mility 12.)
Kabis		gut
Heu		mittler
Emd	LONG CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	gering

XI. Höchste und niedrigste Temperatur von 1864 bis 31. Dec. 1877.

Jahr.	Höchs	te Temperatur.	Niedrig	ste Temperatur.
1864	27,9	7. Juni	- 16,0	5. Januar
1865	30,4	46. Juli	-43,6	42. Februar
1866	29,8	45. Juli	-6,8	24. Dec.
1867	28,6	13. Juni. 21. Aug.	-44,8	34. Dec.
1868	31,0	46. August	-46,2	2. Januar
4869	30,0	30. Juli	-46.4	23. Januar
4870	33,2	44. Juli	- 46,6	25. Dec.
1871	31,8	49. Juli	- 46,4	9. Dec.
1872	34,0	28. Juli	-8,4	4. Februar
1873	29,8	1. August	- 44,6	30. Dec.
1874	29,8	3. 4. Juli	-45,3	14. Februar
1875	30,9	12. August	-45.2	8. Dec.
1876	28,4	28. Juli	- 11,4	7. Januar
1877	30,8	21. August	-9,4	23. Dec.

Bemerkungen.

Januar. 1. Auf Mohren, 671 Meter ü. M., Kälberkropf einen Fuss hoch. 3./4. ein rasender Föhnsturm in Rheineck. 5. arbeiteten in Altstätten mehrere Stickerinnen in blossen Hemdärmeln im Freien. 7. wurden blühend gefunden: Schlüsselblume, Hahnenfuss, weisser Fingerhut, Maasliebchen, Kälberkropf, Dotterblume, Haselnuss, Ehrenpreis. 11. blühten in Marbach folgende 24 wild wachsende Pflanzen: Bellis perennis, Primula elatior, Anthriscus sylvestris, Carum Carvi, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Veronica hederæfolia, Veronica polita, Veronica Buxbaumii, Capsella Bursa-pastoris, Senecio vulgaris, Euphorbia Peplus, Lamium purpureum, Lamium maculatum, Potentilla verna, Daphne Mezereum, Alnus incana, Corylus Avellana, Poa annua, Gentiana verna, Cerastium triviale, Taraxacum officinale, Vinca minor, Viscum album. Am gleichen Tage blühten auch im Garten des evang. Herrn Pfarrers: Helleborus niger, Eranthis hyemalis, Adonis autumnalis, Primula acaulis, Cydonia japonica, Aubrietia deltoidea. 14. Auf dem Forst bei Altstätten eine Blindschleiche.

Februar. 13. Den ganzen Tag Regen. Menge des Niederschlages 72,9 mm. 15. Staaren. Pferde auf der Weide.

März. 15. Störche in Grabs. 21. Abends das erste Gewitter. 30. Abends der erste Regenbogen.

April. 3. Birnen- und Pfirsichblüthen.

Mai. 3. Morgens 7 Uhr nur 2,4° C. Lufttemperatur.

13. Schnee bis 900 Meter Höhe herab. 14. Spyren.

28. Frauenschuh blühend.

Juni. 1. Abends Alpenglühen. 9. Ende der Apfelbaumblüthe. 11. Allgemeiner Anfang der Heuernte.

Juli. 3. Ende der Rebenblüthe. Kamor von Schnee frei 14. Hagel, derselbe dauerte von 1 Uhr 53 Minuten

Nachmittags bis 2 Uhr 3 Minuten, also volle 10 Minuten. Zuerst fielen nur kleine, vom Südwestwind getriebene, dann plötzlich viel grössere, vom Nordwind hergepeitschte und mit etwas Regen vermischte Körner. Die meisten derselben waren von der Grösse einer Baumnuss; doch gab es auch kleinere und grössere bis zu zwei Zoll Durchmesser. grösste genau beobachtete Schlosse mass der Längenaxe nach 50 mm., der Breitenaxe nach 28 mm. und bestand aus etwa 8 durch Eis mit einander verbundenen Körnern. Das innerste derselben, um welches sich die übrigen Einzelkörner gruppirten, war rundlich und etwa 25 mm. dick. Aehnliche Conglomerate von Hagelkörnern wurden in beträchtlicher Anzahl gesehen, und es sollen solche von der Grösse eines Gänseeies gefallen sein. Die meisten Schlossen waren aber nicht Conglomerate, sondern bestanden aus einem einzigen Korne mit weissem, einem Graupelkörnchen ähnlichem Centrum und einer oder mehreren concentrischen Schalen. Eines dieser genauer betrachteten Hagelkörner war 34 mm. lang und 30 mm. dick, hatte einen nur mit der Loupe ganz deutlich erkennbaren weissen Mittelpunkt und sieben concentrische Eisschichten um denselben herum. Die äusserste dieser Schalen war 6 mm. dick.

Der vom Hagel betroffene Landstrich gehört zu den Gemeinden Altstätten, Marbach, Rebstein, Balgach und Diepoldsau diesseits des Rheines und zu Dornbirn im Vorarlberg. Er ist etwa fünf Stunden lang und ungefähr eine halbe Stunde breit, reicht vom Stoss und Sommersberg bis Dornbirn und ist im Nordwesten begrenzt von einer fast geraden Linie, welche vom Vorderkornberg über die Weissmühle zwischen Altstätten und Leuchingen, das Dorf Marbach, die Kirche zu Rebstein und das Schloss Herbrugg geht. Auf der Südostseite reicht in der Gemeinde Alt-

stätten das diesjährige Hagelgebiet bis an die Aach. Der Schaden, welchen dieser Hagel an den noch nicht eingeheimsten Feldfrüchten, an Obstbäumen und Weinreben verursachte, ist sehr gross, ähnlich demjenigen, welchen der schreckliche Hagel vom 13. Juli 1872 angerichtet hat. 23. Anfang der Kornernte. 31. Ende der Kornernte.

August. 21. Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten Gewitter mit Hagel, durch welchen ein grosser Theil der Feldfrüchte vernichtet wurde, der vom ersten Hagel verschont geblieben war. Diesmal zog sich nämlich das Unwetter über Eichenwies, Montlingen und Kriesern. 30. Nachmittags 1 Uhr 2 Minuten bis 1 Uhr 5 Minuten Gewitter mit Hagel.

September. 25. Schnee bis 1200 Meter Höhe herab. Oktober. 18. Anfang der Weinlese. 20. Die letzten Schwalben.

November. 26. Schnee auf den Dächern.

December. 28. Tiefe des Schnees 20 ctm. In Gams und Grabs lag der Schnee 1 Meter tief. Der von Chur kommende Eisenbahnzug langte wegen grosser Schneemassen drei Stunden zu spät in Altstätten an.

B. In St. Gallen (660 Meter ü. M.). Beobachter: G. J. Zollikofer.

I. Barometer.

A. Mittlere Barometerstände.

1877.		Morg. 7 U.	Nachm. 1U.	Abds. 9 U.	Mittel.
			200 A		
Januar	5.41	705,58	705,65	705,90	705,74
Februar	w. He	704,74	704,56	705,53	704,64
März	and it	699,44	699,09	699,42	699,32
April		699,38	699,40	699,52	699,33
Mai		702,46	702,36	702,62	702,48
Juni		707,88	707,46	707,94	707,76
Juli		707,00	706,55	706,92	706,82
August		706,37	706,15	706,66	706,39
September		706,40	706,04	706,29	706,44
October		707,04	706,96	707,67	707,22
November		703,29	702,87	703,43	703,10
December		705,42	705,55	706,35	705,77
Jahr		704,56	704,36	704,75	704,56
					,,,,,,
					100

B. Höchste und tiefste Barometerstände.

1877.	Höchster	Stand.	Tief	ster	Stand	l.	Schwkngn.
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September	den 746,7 24. 745,3 5. 743,4 2. 707,0 45. 740,6 46. 742,9 29. 744,2 29. 740,9 27. 744,4 43.	um Uhr 9 4 7 7 9 7 9 7	694,4 690,5 685,0 687,5 693,5 703,4 696,4 702,4 696,4	18. 6. 22.	um	Uhr 9 7 7 7 7 4 4	25,3 24,8 28,4 19,5 47,4 9,8 47,8 8,8
October November December Jahr	u. 44. 743,2 46. 744,8 45. 746,8 45. 716.8 45.	7 7 u. 4 9 Dec. 9	695,9 686,9 689,8 685,0	26	März	9 7 4 7	47,3 27,9 27,0 31,8

Mittlere monatliche Schwankung 19,917 mm.

II. Thermometer.

A. Mittlere Temperaturen in Centigraden.

1877.	Morg. 7 U. N	achm.1 U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	0,97	4,55	+ 4,78	2,43
Februar	4,54	4,29	2,46	2,75
März	0,30	4,77	4,30	2,12
April	5,39	9,80	6,29	7,16
Mai	7,92	13.01	8,44	9,79
Juni	46,52	22,33	16,24	48,35
Juli	45,60	20,08	45,09	16,92
August	46,37	24,49	16,65	18,17
September	8,82	14,36	9,68	40,95
October	4,24	9,49	5,09	6,16
November	3,70	6,96	4,43	5,03
December	- 4,07	1,20	- 0,32	-0.06
Jahr	6,69	11,00	7,26	8,31

B. Extreme der Temperaturen in Centigraden.

1877.	Höchster Stand.		Tiefster Stand.				Schwkgn.		
Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septemb. October Novemb.	+ 45,5 40,6 45,6 49,5 21,4 29,3 29,3 30.0 21,9 49,4 45,3	den 9. 46. 29. 40. 28. 42. 24. 49. 45.		Uhr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		6,5 7,4 44,7 4,5 0,9 40,9 9,9 40,7 4,7 3,4 3,7	den 48. 23. 42. 47. 3. 4. 8. 5. 27. 49.	um Uhr 7 7 7 7 7 9 9 9 7 7	22,0 48,0 30,3 24,0 20,2 48,4 49,4 49,3 20,2 22,2 49,0
Decemb. Jahr	6,5 30,0	7. 19. <i>1</i>	Aug.	4	_	9,3 14,7	22. 12. M	ärz 7	45,8 44,7

Mittlere monatliche Schwankung: 20,5° C.

III. Psychrometer.

A. Mittel des Wassergehaltes der Luft in Procenten.

1877.	Morg. 7 U.	Nachm.1 U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November December	87 90 87 82 83 76 78 84 91 88 90 94 85,6	74 74 70 68 64 56 63 65 70 74 84 85 70,1	83 84 86 80 85 77 88 83 90 88 89 94 85,3	80 83 84 77 77 70 76 76 84 83 87 90 80,3
•	. diadmestoc:	alege v		

B. Trockenste und feuchteste Tage.

1877.	Minimum de einzelnen Beobachtunge	Trockenste Tage.	Feuchteste Tage.
Januar Februar März	1. 4 U. 4	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	den 22. mit 400% 14. u. 45. 95 8. 96
April Mai Juni Juli August September October November December Jahr	40. 4 U. 2 44. 4 U. 4 13. 4 U. 3 42. 4 U. 3 49. 4 U. 3 4. 4 U. 4 5. 4 U. 4 7. 4 U. 2 24. 9 U.	8 9. u. 40. 44 28. 60 4 12. 54 8 12. u. 24. 60 19. 53 4. 62 45. 68 22. 54 24. 78 4. Jan. 25. März 42	49. 97 4. 97 23. 87 3. 96 23. 94 9. 99 30. 97 46. 98 47. 99 22. Jan. 100

IV. Pluviometer.

A. Anzahl der Tage mit und ohne Regen oder Schnee.

1877.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.	1877.	Mit Regen oder Schnee.	Ohne Regen oder Schnee.
Januar Februar März April Mai Juni	9 47 46 48 48	22 41 45 42 43 49	Juli August September October November December Jahr	19 18 15 14 11 16 179 = 49,04°/0	42 43 45 20 49 45 186 = 50,96°/°

B. Längste Trockenheit.

	1877.	Datum	Tage	1877.	Datum	Tage
F M A M	anuar ebruar ärz pril ai uni	3.—42. 9.—42. 24.—28. 6.—.44 2.–5. u. 27.–30. 4520.u.2630.	9 3 4 5 3 5	Juli August September October November December	24.—25. 48. u 2630. 26.—30. 48.—24. 4.—44. 4.— 7.	4 5 6 40 6

C. Totale Regenmenge.

1877.	Millimeter.	Pariser Zoll.	1877.	Millimeter.	Pariser Zoll.
Januar Februar März April Mai Juni	53,4 144,4 145,0 157,2 130,4 129,6	1,97 5,24 5,36 5,84 4,84 4,80	Juli August September October November December Jahr	279,9 474,2 76,0 62,9 74,9 420,5 1541,8	10,34 6,43 2,81 2,32 2,65 4,45 56,96

D. Grösste Regenmenge in 24 Stunden.

1877.	Datum.	Millimeter.	Pariser Zoll	
Januar	den 24.	14,0	0,52	
Februar	13.	55,4	2,03	
März	30.	33,0	1,22 0,95	
April	22.	25,5	0,95	
Mai	1.	19,3	0,70	
Juni	$2\overline{2}$.	56,0	2,07	
Juli	3.	59,5	2,20	
August	21.	35,4	4,34 0,92	
September	9.	24,8	0,92	
October	30.	19,4	0,72	
November	30.	13,0	0,48	
December	18.	22,4	0,83	

V. Winde.

1877.	Wind- still.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	w.	NW.
Januar	54	12	10	0	1	1	58	40	1
Februar	34	12	2	0	700	4114	65	12	2
März	54	9	48	2	Ŏ	4	37	14	9 3
April	57	70	35	0	0	3	37	- 5	3
Mai	67	11	32 54	0	0	0	43	3	4
Juni	68	6	54	0	0	DJ CALL	21	4	4
Juli	60	8	16	0	0	3	56	6	44
August	67	13	26	0 2	0	1	34	11	6
September	77	17	19	0	0	0	34	44	12
October	66	9	33	0	0	Å	35	8	7
November	65	8	7	0	Ŏ	2	63	9	1 :
December	52	1	22	ő	Ŏ	1 2	65		1
Jahr	721	103	274	4	ì	17	545	98	53

VI. Bewölkung.

Mittlere Bewölkung in Zehnteln ausgedrückt.

1877.		1877.	
Januar Februar März April Mai Juni	7,4 8,8 7,6 6,7 7,7 3,5	Juli August September October November December Jahr	6,3 5,4 5,8 5,5 7,0 8,4 6,6

Bemerkungen.

Januar. Gleich dem December 1876 ausserordentlich mild; 3,86° C. über dem allgemeinen Monatsmittel der Periode 1864 bis 1875. — Nur 10 negative Tagesmittel, keines tiefer als —4,3° C.

Starke Barometerschwankungen und mit ihnen — aber im entgegengesetzten Sinne — Schritt haltend auch bedeutende Temperaturwechsel. 2. Seidelbast blühend.

Februar. Bei vorherrschendem Südwestwind ziemlich mild; 2,43° C. über dem allgemeinen Monatsmittel. — Nur in den letzten Tagen etwas kalt, sonst fast immer über Null. 15. Erster Amselgesang, erster Finkenschlag, erste Staaren.

März. Was December, Januar und Februar versäumt hatten, holte der März gewissenhaft nach; er ist der kälteste Monat des Winters 1876/77, indem er

1,24° C. hinter dem December zurücksteht,

0,51° C. " " Januar

0,63° C. " " Februar "

auch den meisten Schnee und die tiefste Temperatur in diesem Zeitabschnitt aufweist.

Barometerstand im Allgemeinen tief, mehr unter als über 700 mm. — Schneehöhe: Den 6. 10¹/₂ ctm., den 9. 25 ctm.

April. Ziemlich kalt, 1,03° unter dem allgemeinen Monatsmittel. — Wenige schöne Tage, meist regnerisch und windig. — Kukuk erst gegen das Ende des Monats. — Den 14. Donner. — Den 30. Gewitter und Hagel.

Mai. Kühl und regnerisch. Nur 3 schöne Tage. Temperaturmittel 2,35° C. unter dem allgemeinen Monatsmittel.

— 15 Tagesmittel unter, 16 Tagesmittel über 10° C.

Eine Temperatur über 20° C. — 1 Reif. 1 Gewitter. Zweimal Hagel.

Juni. Ein ausgezeichnet schöner und fruchtbarer Monat. 3,24° C. über dem allgemeinen Monatsmittel, ja sogar 0,69° über dem allgemeinen Temperaturmittel des Juli. — 7 Tagesmittel über 20° C., 29 Einzeltemperaturen über 20° C. — 6 Gewitter: den 1., 9., 13., 20., 21., 22. — 22 helle oder klare, 8 bewölkte oder bedeckte Tage.

Juli. Temperatur 0,84° C. unter Mittel. — Viel Regen. — In jeder Beziehung bedeutend ungünstiger als der Juni. — Gewitter den 6., 8., 13., 14., 16., 17.

August. Sehr warm und fruchtbar. — 2,17° C. über dem allgemeinen Monatsmittel. — 7 Tagesmittel und 31 Einzeltemperaturen über 20° C. — Um 0,18° C. hinter dem Juni zurückstehend. Gewitter den 1., 11., 14., 16., 17., 21., 22., 30. und 31. Den 22. und 31. förmliche Gewittertage. — 16 helle Tage.

September. Schon die erste Hälfte des Monats war nicht besonders warm, in der zweiten sank die Temperatur ganz auffallend, so dass das Monatsmittel 3°C. unter dem allgemeinen Mittel steht und seit 13 Jahren das niedrigste ist. — 12 Tagesmittel unter 10°C. — Als Curiosum möge noch erwähnt werden, dass seit Erbauung des Kantonsschulgebäudes dieses Jahr zum ersten Mal im September schon daselbst geheizt werden musste.

October. Temperaturverhältnisse ziemlich ungünstig, 1,57 °C. unter dem allgemeinen Mittel; 8 negative Temperaturen.

November. Noch recht mild, dank dem herrschenden Südwestwind. Nur zwei Temperaturen unter Null.

Sehr starke Barometerschwankungen vom 11. bis 15.

und den 25. und 26. — Die ersten 9 Tage hell und schön (Martinisommer).

December. Thermometer- und Barometerstände ziemlich schwankend, im Durchschnitt aber doch über Mittel. Gegen das Ende des Monats viel Schnee und Regen.

Meteorologischer Bericht 1877.

Das Jahr 1877 ist nicht bloss in politischer, sondern auch in meteorologischer Beziehung höchst interessant.

Im Durchschnitt genommen waren die Temperaturverhältnisse recht günstig, steht doch die mittlere Jahrestemperatur 0,7 °C. über dem allgemeinen Jahresmittel der letzten 14 Jahre. Leider war aber die Vertheilung auf die einzelnen Monate nicht die normale, indem einige weit über, andere dagegen fast eben so sehr unter Mittel stunden, dadurch aber die Entwicklung der einzelnen Kulturen oft bedeutend litt. Uebrigens bedenke man wohl, wie viele Factoren zusammenwirken müssen, bis man von einem Jahre mit voller Ueberzeugung sagen kann, es war in jeder Beziehung ein reich gesegnetes.

Erst wenn der Ertrag glücklich unter Dach gebracht ist, kann er als gesichert betrachtet werden, vorher können Fröste, Ueberschwemmungen, Hagelschlag die schönsten Hoffnungen in kürzester Zeit zerstören.

Was die Extreme der Temperatur betrifft, so fällt das Maximum des Jahres auf den 19. August mit 30,0 ° C., das Minimum auf den 12. März mit — 14,7; beide sind in St. Gallen schon übertroffen worden.

Die Differenz zwischen ihnen ergibt die schöne Zahl von 44,7 °C., während die mittlere monatliche Schwankung 20,5 °C. beträgt, eine Zahl, die immerhin auch als ziemlich hoch bezeichnet werden darf; den grössten Wechsel zeigt der März (30,3 °C.).

Nicht weniger interessant als die Temperaturverhältnisse ist der Gang des Barometers, obschon man sich in der Regel nicht so lebhaft dafür interessirt, da ihr Einfluss auf unser Wohlbefinden leichter übersehen wird als bei der Temperatur, und doch sind wir vom Luftdruck ebenso abhängig als von der Wärme.

Von den einzelnen Monatsmitteln stehen besonders tief März und April (unter 700), hoch dagegen Juni, Juli, August, September und Oktober (über 706,00). Als Jahresmittel ergibt sich 704,56, also 0,29 unter dem allgemeinen Mittel der letzten 11 Jahre.

Sehr stark waren die Barometerschwankungen im März, November und December, 27, 28 und 28¹/₂ mm.

Maximum des Jahres 716,8 mm.

Minimum des Jahres 685,0 mm.

Mittlere monatliche Schwankung 19,919 mm.

Feuchtigkeit: Keine besondern Bemerkungen, als Mittel ⁸⁰ ziemlich das Normale 80 (statt 79), auch der jährliche Verlauf ziemlich regelmässig, im umgekehrten Verhältniss der Temperatur.

Pluviometer.

Die Bemerkungen ergeben sich aus den Tabellen. Regenmenge sehr gross!

1541,8 mm. = 1,5418 M. = ca. $1^{1/2}$ M.

= 57 Par." = 513,9" schweiz. = 5' $1^{1/2}$ ",

nur das letzte Jahr war in meiner ganzen Beobachtungszeit noch reicher (1677,8 mm.); Sie werden sich aber auch, Tit., noch lebhaft an die letztjährigen Ueberschwemmungen und deren Verheerungen erinnern.

