Zeitschrift: Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen

Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

Band: 21 (1879-1880)

Artikel: Kritische Uebersicht über die Gefässpflanzen der Kantone St. Gallen

und Appenzell

Autor: Wartmann, B. / Schlatter, T.

Kapitel: 24: Fam. Rhamneæ. Wegdorngewächse

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-834981

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Wolfhalden (Custer) und Heiden (Gremli). Häufig vom Bodensee weg in den Schluchten der Steinach, der Goldach, des Bergbaches und ihrer Zuflüsse (Th. Schl.) bis hinauf nach Trogen 900 M. (Alder). Zweibrücker- (Fl. W.) und Wattbachtobel (Th. Schl.) südwestlich von St. Gallen. Toggenburg: Boden bei Hemberg (Moosberger), Bleikwald bei Alt St. Johann (Feurer).

24. Fam. Rhamneæ. Wegdorngewächse.

Rhamnus L. Wegdorn.

- 1. Rh. cathártica L. Gemeiner W. Zwischen Weesen und Amden, sowie bei Bätlis (Brügger); Leuchingen (Pfr. Zoll.) und Thal (Custer) im Rheinthal. Scheint selten zu sein.
- 2. Rh. púmila L. Niedriger W. An sonnigen Felsen der Alpen. Ob Vättis gegen den Vättnerberg (Th. Schl.). Zwischen Breitmantel und Kunkels in den Flumseralpen (Brügger). Unter Pülls am Südabhange der Churfirten (Jäggi), Ostabhang des Kaiserrucks (Feurer), Camperney ob Grabs (Custer). An manchen Stellen der Appenzelleralpen: Südabhang des Lütispitzes (Feurer), unter Schrenit (Th. Schl.); unterhalb der Krayalp (Pfr. Rehst., Pfr. Zoll.); auf Rosslen (Pfr. Rehst.), an den Häusern (Rheinthalerseite (Th. Schl.); Lützelalp, Seealp, Wildkirchli (Girtanner, Custer, Fröl.).

Steigt bisweilen weit hinab, so schon zwischen Weesen und Amden (Brügger), ferner vom Escherstein bis zu dem mächtigen Felsblocke bei dem Kirchlein von Schwendi 840 M.

- 3. Rh. alpina L. Alpen-W. Bisher einzig und allein beobachtet auf Mädems in den Grauen Hörnern (Meli, Juli 1875).
- 4. Rh. Frångula L. Faulbaum. Allgemein verbreitet in Gebüschen und als Unterholz durch die Ebene und Bergregion.