Zeitschrift: Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwisenschaftliche Gesellschaft

**Band:** 56 (1919)

Artikel: Die Alpenpflanzen des Mattstock-Speer-Gebietes und ihre Verbreitung

ins Zürcher Oberland

Autor: Kägi, H.

**Kapitel:** Spezialübersicht über die im Gebiete beobachteten alpinen Hieracien

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-834891

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Spezialübersicht über die im Gebiete beobachteten alpinen Hieracien.

## 1. Hieracium Hoppeanum Schultes.

- a) ssp. Hoppeanum Schultes var. genuinum N. P.
  - I. Mattstock Rahberg Südseite, 1600—1700 m; Mattstock Nordseite, 1450 m.
  - II. Speer Süd- und Südosthang, 1700—1900 m; zwischen Rossweid und Fliegenspitz südlich vom Speer, 1680 m; Rotenböden, 1600 m; Fideri am Schänniserberg, 1800 m; Oberfiderschenalp; Abhang Grappenplatten, 1680 m.

Var. imbricatum N. P. Grat ob Herrenalp, 1600 m.

- b) ssp. viridiastrum N. P. II. Hintermattalp auf Nagelfluh, 1450 m.
- 2. H. hypeurium N. P. ssp. lamprocomum N. P. II. Hintermattalp auf Nagelfluh, 1450 m.

## 3. H. Pilosella L.

- a) ssp. trichadenium N. P. II. Wannenberg Westseite, 1630 m, am sonnigen Grat; Farnweide Engealp im Steintal, 950 m.
- b) ssp. subcaulescens N. P. II. Sandsteingrat östlich unterhalb Regelstein, 1270 m.

# 4. H. aurantiacum L. 1)

- a) ssp. aurantiacum L.
  - I. Mattstock Südhang, 1750 m.
  - II. Speer Südhang ob der grossen Schneemulde, 1870 m; Grat westlich ob Herrenalp, 1700 m; Abhang Grappenplatten, 1680 m.
- b) ssp. porphyranthes N. P. II. Grat zwischen Obernätenalp und Oberfiderschenalp am Schänniserberg, 1780 m.
- 5. H. rubellum Zahn = H. cruentum N. P. (cymosum-aurantiacum), II. Südseite des Fideri am Schänniserberg, 1800 m.
- 6. H. substoloniflorum N. P.
  - a) ssp. erectum N. P. I. Mattstock-Rahberg Südseite, 1650 m, viel.
- 7. H. bupleuroides Gmel.
  - a) ssp. scabriceps N. P. I. Oberfurklahöhe südlich vom Mattstock, 1520 m; Felsenweg Weesen-Amden.
  - b) ssp. Schenkii Griseb.
    - I. Betlis beim Wasserfall, 550 m (Miniaturform); Felshang beim Fallenbach; Strassenmauer ob Weesen gegen Amden, 600 m.
    - II. Plättlispitz Südhang, 1700 m.
    - III. Felsgrat Untertweralp Ostseite, 1220 m; Felsen Untertweralp-Eggli Südhang, 1100 m; Kreuzeggbrüche, 1260 m und wieder

<sup>1)</sup> H. auranticum: Bachmulde der Dachsegg-Wald 2 Exemplare von Benz gefunden.

am Osthange, 1200 m; am Feldbach bei Wattwil, 650 m; Schwarzenberg Südosthang unten im Gübelwald, 930 m; Felshang ob der hintern Töss "bei der Brücke", 900 m; am Felshang ob der vordern Töss gegen Hinterhessen, 880 m; am Felshang beim Vorderbeicher, 800 m (Tössgebiet); Felsschlucht des Brächtobels in der Allmannkette, 740 m (mit Primula Auricula).

## 8. H. villosum L.

- a) ssp. villosum L. var. genuinum N. P.
  - I. u. II. An steinigen, trockenen Hängen, sonnigen Gräten häufig im Mattstockgebiet und in der Hauptkette des Speers bis Blässkopf, Brämach, Wannenberg, Hinterwengi; Tritt-Platten; Speer Nordseite.

Var. stenobasis N. P. Mattstock Nordseite;

Var. steneilemma N. P. Schänniserberg.

III. Var. genuinum N.P. Schindelbergerhöhe Osthang, 1170-1200 m (subvar. calvescens N. P.); obere Tweralp Nordhang, 1270 m, an einem überwachsenen Blocke.

Var. stenobasis N. P.: Obere Tweralp, 1270 m, Nordseite (mit voriger) obere Kreuzeggalp Ostseite, 1250 m, an Blöcken.

- b) ssp. villosissimum N. P. I. Mattstock-Rahberg Südseite, 1650 m.
- c) ssp. eurybasis N.P. I. Mattstock Nordseite; Mattstock-Rahberg Südseite.

## 9. H. villosiceps N. P.

- a) ssp. Trefferianum N. P.
  - I. Mattstock Rahberg Südseite, 1650 m; Stock ob Amden Nordseite, 1550 m; Vordermattalp im Blockrevier.
  - II. An grasigen, felsigen Hängen: Ob Elisalp gegen den Speer, 1650 m; Wannenberg Ostseite, 1600 m; Alp "Hengst" unterhalb Brämacherhöhe, 1530 m; Kl. Speer Westseite, 1670 m.
- b) ssp. comigerum Zahn (commutatum N. P.). II. Schafberg-Oberbützalp, 1600 m.
- c) ssp. sericotrychum N. P.
  - II. Grat westlich ob Herrenalp, 1600 m; Gratt Tritt-Platten; Speer Nordseite ob Kl. Speer, 1730 m.
  - III. Obere Tweralp Nordseite, 1270 m, an einem Blocke (1916).

## 10. H. scorzonerifolium Vill.

- a) ssp. scorzonerifolium Vill. II. Fideri am Schänniserberg, 1830 m; Grat des (Schänniser) Schafbergs, 1700 m; Oberbützalp vielfach, 1550—1700 m.
- b) ssp. basiglaucum N. P. II. Fiderigrat, 1850 m (Schänniserberg).

#### 11. H. bifidum Kit.

- a) ssp. incisifolium Zahn. II. Fliegenspitz ob Oberkäsern, 1700 m; Kl. Speer Westhang, 1680 m (β subglandulos Z).
- b) ssp. cardiobasis Zahn. II. Herrenalp.
- c) ssp. caesiflorum Almg a. gen. 1 normale d. alpigena Zahn. I. Schneeloch unterhalb Vordermatt.

## 12. H. dentatum Hoppe.

a) ssp. subvillosum N. P.

II. Wannenberg Westseite, 1630 m; Kl Speer, 1680 m; Schänniser Schafberg 1650 m; Oberkäsernalp (var. genuinum).

Schafberg-Oberbützalp und Schafberggrat, 1500—1700 m (var. vulgatiforme).

- III. Obere Tweralp Nordseite, 1270 m, Block (1915) var. genuinum.
- b) ssp. pseudovillosum N. P. II. Brämacherhöhe Südseite.
- c) ssp. prionodes N. P. II. Elisalp nördlich vom Speer.
- d) ssp. dentatiforme N. P.
  - I. Mattstock Nordostseite.
  - II. Fiderigrat (Schänniserberg), 1850 m.
- e) ssp. dentatifolium N. P. I. Mattstock-Hintermattalp.
- f) ssp. basifoliatum N. P. I. Mattstock Nordseite.
- g) ssp. expallens N. P. I. Mattstock gegen Hintermattalp.
- 13. H. incisum Hoppe.
  - a) ssp. Trachselianum Christ. II. Westlich ob Herrenalp, 1600 m.
  - b) ssp. pseudohittense Zahn. II. Oberfiderschenalp gegen Oberbützfurggle, 1750 m.
  - c) ssp. oxyodon Fries. Oberfiderschenalp gegen Oberbützfurggle, 1700 m.
- 14. H. psammogenes Zahn.
  - a) ssp. psammogenes Zahn. II. Speergrat, 1930 m; Bogmenalp ob dem Steintale (Nordrand), 1260 m.
  - b) ssp. senile Kerner.
    - I. Mattstock Nordseite; Hintermattalp, 1450 m.
    - II. Obernätenalp am Schänniserberg, 1550 m; ob Herrenalp.
  - c) ssp. obscurisquamum Zahn. I. Mattstock Nordseite, 1400 m.
  - d) ssp. laceridens Murr. II. Schafberg-Oberbützalp, 1600 m; Speergrat, 1900 m.
  - e) ssp. subcaesifloriforme (Z.) Murr. II. Speergrat, 1930 m.
- 15. H. subspeciosum N. P. ssp. comolepium N. P. II. Grat ob Obernätenalp, 1680 m, vielfach; Oberfiderschenalp, 1750 m, viel.
  - b) ssp. melanophaeum N. P. Grat Tritt-Platten, 1600 m.
- 16. H. cirritum A-T, ssp. cirritum A-T. II. Farnweid Engealp im Steintal, 950 m (linksseitig).
- 17. H. ctenodon N. P., ssp. ctenodon N. P. var. genuinum N. P. II. Schafberg-Oberbützalp.
- 18. H. silvaticum L. (murorum).
  - a) ssp. cirritoides Zuhn. II. Bogmenalp ob dem Steintale, 1260 m.
  - b) ssp. silvulorum Jordan. II. Bogmenalp ob dem Steintale, 1260 m.
  - c) ssp. circumstellatum Zahn. II. Schafberg-Oberbützalp, 1550 m.
  - d) ssp. atropaniculatum Zahn. II. Wannenberg Ostseite, 1620 m.
- 19. H. vulgatum Fries.
  - a) ssp. Lachenalii Gmel. \( \beta \) argillaceum Jord.
    - I. Hinterbetlis im lichten Gebüsch, 500 m.
    - II. Schorhüttenberg Westseite, 1400 m.
  - b) ssp. festinum Jordan. III. Felsgrat Südseite des Welschenberges, 1200 m.

# 20. H. humile Jacq.

- a) ssp. humile Jacq.
  - I. Mattstock Nordseite, 1400 m, an Felsen, wenig ob dem Wege; Felshang ob dem Fallenbach. —
  - III. Spärlich in Felsspalten der Hörnligübel, 1040 m (1. VIII. 1903); Felshang der Schindelbergerhöhe, 1130 m, mehrfach (1918).
- b) ssp. lacerum Reuter.
  - I. Hinterbetlis Felshang, 440 m.
  - I. Felshang des Biberlikopfes bei Ziegelbrücke, 480 m.
  - III. Feuchte Felsen ob dem Ribelboden, 950 m (hint. Töss).

# 21. H. cryptadenum A. T. (humile-villosum)

- III. An vielen Stellen und ziemlich zahlreich; früher einfach für villosum genommen. Felshang Südwestseite des Ornbergs am Bachtel, 900 m; Felshang Hinterhessen-vordere Töss (am Südhange des Hüttkopfs), 880 m mit H. bupleuroides; Felshang beim Vorderbeicher, 840 m (Westexposition); Felshänge und trockene Weiden Frühtobel-Bärloch, vielfach, 900—1040 m; Leutobel linksseitige Felshänge, 930 m; Felsen unterhalb Baurenboden, 880 m; Schindelbergerhöhe Osthänge, 1150—1200 m; Felshang Russegg Westseite, 1180 m; obere Kreuzeggalp, 1250 m.
- 22. H. salaevensis Rapin. (humile-dentatum [resp. cryptadenum]-silvaticum).
  - I. Mattstock Nordseite, viel.
  - III. Obere Tweralp Nordseite, 1270 m (1916); Felshang Nordostseite der Schindelbergerhöhe, 1180 m (1916).

# 23. H. alpinum L.

- a) ssp. alpinum L.
  - I. Mattstock Nordseite, 1450 m; Fliegenspitz Nordwestseite, 1600 m; Hochmoor und Abhang östlich vom Fliegenspitz, 1580 m.
  - II. Oberkäsernalp und am Grat beim Tritt, 1690 m; Wannenberg-Rossalp, 1640 m; Südhang des Speers; Bützalp-Brämach, 1580 m; Hang ob Elisalp gegen schwarze Köpfe, 1540 m.
- b) ssp. Halleri Vill.
  - I. Mattstock Nordseite, 1450 m.
  - II. Grat ob Herrenalp, 1600 m; am Heidenbühl (Höhe und Südseite). Hang ob Elisalp gegen schwarze Köpfe, 1540 m.

# 24. H. nigrescens Willd.

- a) ssp. nigrescentiforme Zahn.
  - I. Fliegenspitz Nordwesthang, 1600 m.
  - II. Am Heidenbühl 1680 m; zwischen Bützalp und Brämach, 1580 m; Tritt bei Oberkäsern, 1690 m.
- b) ssp. pseudohalleri Zahn. I. Fliegenspitz Nordwesthang; Mattstock-Rahberg Südseite, 1600 m.

# 25. H. amplexicaule L.

- a) ssp. amplexicaule L. I. Amden am Strässchen nach Betlis (Felsen), 850 m; Brunnenegg Nordwestseite des Mattstocks.
- b) ssp. Berardianum A-T.
  - I. Felsen bei Hinterbetlis, 440 m.

- II. Aufstieg vom Kapuzenberg gegen Unternätenalp, 1000 m, am schattigen Felsen; Gubelspitz Felsen der Nordseite, 1330 m.
- III. Mehrfach und ziemlich zahlreich in den Hörnligübeln, 860 bis 1080 m (1. VIII. 1903); ziemlich viel in den Felsnischen der Teufelskanzeln ob Altegg-Bäretswil, 880 m; zahlreich an den Felsen des Schlosskopfs ob Steg, 840 900 m; Felsabhänge im Frühtobel, etwa 900 m, z. T. mit H. cryptadenum; wenig und sehr schwer zugänglich an den Felsen unterhalb Grossegg im Leutobel, 900 m; wenig an einer Stelle am Felshange auf der Südseite des Welschenberges, 1200 m.

# 26. H. valdepilosum Vill.

- a) ssp. elongatum Froel. var. genuinum.
  - I. Mattstock Nordseite.
  - II. Obere Nätenalp; Schafberg-Oberbützalp; Grat ob Herrenalp; am Heidenbühl, ziemlich viel (jedenfalls noch vielfach anderwärts).
- b) ssp. subsinuatum N. P. I. Mattstock Nordseite.
- c) ssp. subvaldepilosum Zahn (= subalpinum N. P.). II. Schafberg-schlucht (Schänniser), 1400 m.
- d) ssp. oligophyllum N. P. a. genuinum. II. Grat nordwestlich ob Obernätenalp, 1680 m; Speer Südostseite, 1850 m; Heidenbühl, 1650 m; Speermürli Südseite und wohl noch vielfach anderwärts.

var. phaeostylum N. P.: Grat Tritt-Platten; Grat nordwestlich ob Obernätenalp; Nordseite des Kl. Speer, 1730 m; auch ob Elisalp gegen schwarze Köpfe, 1560 m.

# 27. H. juranum Fries.

- a) ssp. juranum Fries.
  - I. Mattstock Südhang, 1750 m (1916); Blockrevier unterhalb Vordermatt, 1350 m.
  - II. In der Gruppe Oberkäsern am Saumkännel, Heidenbühl, Rotenböden etc. vielfach; Rossalp, 1560 m; unterhalb Gubelspitz, 1150 m; Schorhüttenberg Westseite.
  - III. Nur an einer Stelle im Farngebüsch der Arnica-Weide zwischen Schwämmli und Geisskopf, 1150 m (Kreuzeggruppe).
- b) ssp. cichoriaceum A. T.
  - I. Häderenberg Westseite, im Felsenschutt, 1500 m.
  - II. Rossalp nördlich vom Speer, im Farngebüsch, 1560 m; Schorhüttenberg Westseite, im lichten, feuchten Walde, 1400 m; Grat ob Elisalp gegen schwarze Köpfe, 1550 m.
- 28. H. prenanthoides Vill. ssp. bupleurifolium Tausch β bupleurifolium Tausch 1. normale a. verum Zahn. II. Rossalp nördlich vom Speer, im Farngebüsch, 1560 m (13. VIII. 1917).

## Nachtrag zu Nr. 15 (Seite 66).

Festuca violacea Gaudin var. nigricans (Schleicher) Hackel.

III. Am 11. Juli 1920 auch in der Schnebelhorngruppe entdeckt. — Nordostabhang der Schindelbergerhöhe an der dortigen Rostseggenhalde, 1180 m, reichlich.