Zeitschrift: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen =

Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie

Band: 37 (1957)

Heft: 2

Artikel: Sur un choix de cristaux artificiels faciles à étudier sous le microscope

polarisant

Autor: Déverin, Louis

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-29175

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 06.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Sur un choix de cristaux artificiels faciles à étudier sous le microscope polarisant

Par Louis Déverin (Lausanne)

Zusammenfassung

Es wird eine Reihe von 25 auserlesenen Substanzen angeführt, welche als Mikrokristalle mit schönen Kristallformen leicht gezüchtet werden können. Bequem lassen sich dann optische Bestimmungen an denselben unter dem Polarisationsmikroskop ausführen. Morphologische und physikalische Eigentümlichkeiten jeder Kristallart werden kurz hervorgehoben und praktische Hinweise zur Herstellung der Präparate angegeben.

Introduction

Certains manuels élémentaires de cristallographie engagent leurs lecteurs à examiner des cristaux artificiels sous le microscope, mais les exemples qu'ils proposent ne sont pas toujours heureux, car ils sont pris le plus souvent parmi les substances d'un usage courant dans les laboratoires. Or les produits chimiques usuels fournissent rarement des cristaux se prêtant à une détermination optique complète sans platine de Fédoroff, et leur examen sous le microscope réserve peu de satisfaction aux débutants. Si l'on veut que ceux-ci prennent goût à la cristallographie, il faut leur proposer comme premiers objets d'observation des corps dont la cristallisation produise presque infailliblement des formes géométriques sur lesquelles il soit difficile de se méprendre et dont l'orientation optique soit aisément déterminable.


Une revue méthodique des espèces cristallines connues, suivie de l'examen sous le microscope de quelques centaines d'entre elles, nous a amené à faire une sélection et à ne retenir, pour les mettre dans la collection d'enseignement du laboratoire de minéralogie de l'Université de Lausanne, que les plus intéressantes et les moins difficiles à obtenir. Il nous a paru utile de résumer, à l'usage de ceux qui ont des étudiants

256 L. Déverin

à instruire, les résultats d'une longue expérience. Quelques commentaires suivront la liste des substances choisies. Celle-ci est précédée de quelques recettes pratiques qui, à notre connaissance, ne figurent dans aucun guide de laboratoire. Ces indications faciliteront la tâche des assistants chargés de la confection des préparations microscopiques; les instructions qu'on leur donne ne sont jamais trop précises.

Outillage et montage des préparations

Les solutions saturées des substances à examiner sont contenues dans des tubes à essais de 18 à 20 mm de diamètre. Ceux-ci sont fermés par un bouchon que traverse une pipette plus longue que le tube d'un quart environ. Un support en aluminium garni d'une douzaine de ces



tubes est plongé dans l'eau d'un bain-marie dont la température ne doit guère dépasser 50°. Les préparations à étudier sont montées sur des lames de verre ordinaires (format: 28×46 mm), sans cupule. Leur refroidissement se règle sur une platine de Malassez chauffée par un microbrûleur (fig. 1) à une température atteignant tout au plus 120° C à l'aplomb de la flamme. Les manipulations à exécuter pour le montage des préparations dépendent pour chaque substance des variations de sa solubilité en fonction de la température.

A. Pour les substances dont la solubilité ne change pas beaucoup de chaud à froid, il suffit de mettre une goutte de solution saturée sur une lame porte-objet légèrement tiédie que l'on dépose au niveau g..h ou k..l de la platine chauffante, et de couvrir la goutte d'une lamelle (18×18 mm) dès que les premiers cristaux apparaissent. Une pression exercée sur la lamelle de couverture, écrasant les premiers cristaux

formés, multiplie les germes de cristallisation, ce qui est parfois avantageux.

B. Quand il s'agit de substances notablement plus solubles à chaud qu'à froid, les premiers cristaux formés en bordure de la goutte découverte se redissolvent souvent quand on couvre la préparation. Un petit tour de main pare à cet inconvénient: par un léger effort appliqué sur le couvre-objet, on fait sourdre un peu de solution en marge de celui-ci; c'est là qu'apparaîtront d'autres cristaux qui vont servir à amorcer une nouvelle phase de cristallisation; à cet effet on pousse la lamelle de MM' jusqu'en NN' (fig. 2) — ou bien de OO' en PP' — de façon à replonger les nouveaux venus dans leur eau-mère. Une manœuvre de vaet-vient du bord de la lamelle entre les positions MM' et NN' est encore plus efficace.

Lorsqu'on suit les progrès de la cristallisation dans une préparation en cours de refroidissement placée sous le microscope, il ne faut pas oublier que le contact de la platine de cet instrument accélère beaucoup la chute de température. Pour prévenir les effets d'une cristallisation hâtive, il est donc prudent de couvrir la platine du microscope utilisé par le préparateur d'un disque d'amiante, percé, cela va sans dire, d'un large trou de visée et de 2 petits trous pour sa fixation.

- C. Les substances beaucoup plus solubles à chaud qu'à froid forment souvent des solutions sursaturées. Dans le cas des sels doubles, il arrive que la sursaturation n'atteigne que l'un de ses composants, l'autre cristallisant isolément, ce qui est fâcheux lorsque l'intérêt porte précisément sur le sel double. Pour éviter cet ennui, on évapore une petite goutte de solution jusqu'à consistance sirupeuse, on la refroidit, et l'on amorce la cristallisation par une trace de matière solide gardée en réserve. On couvre alors la préparation à qui l'on instille latéralement par capillarité une nouvelle goutte de solution saturée, refroidie au préalable sous peine de provoquer une redissolution totale. Si la cristallisation tarde à s'étendre autour du point d'amorce, il faut tiédir légèrement la préparation afin de diminuer la viscosité de la solution: à cet effet, on la pose sur la platine chauffante en g ou en h et pendant quelques secondes seulement (une dizaine).
- D. Un observateur qui examine une préparation placée sous le microscope pendant quelque 20 minutes consécutives réchauffe son instrument et la préparation aussi. Les cristaux qu'elle contenait se corrodent, perdant la netteté de leurs formes géométriques. Il devient alors nécessaire de "rajeunir" la préparation en la portant durant quelques courts instants à une température voisine de 40° C, c'est à dire

258 L. Déverin

un peu supérieure à celle du corps humain, et en refroidissant aussitôt après.

E. Une cristallisation lente donne naissance à des individus prenant généralement 2 ou 3 positions privilégiées, car ils reposent sur leurs faces les plus larges. Il est parfois souhaitable d'apporter plus de diversité à leur orientation. On y parvient en pressant du doigt la lamelle couvreobjet contre son support et en lui imprimant un mouvement de rotation afin de pulyéquer les cristaux pris entre les 2 lames. A moins qu'un clivage facile n'intervienne pour rétablir la prépondérance des positions privilégiées, on aura ainsi obtenu un assemblage de grains orientés "au hasard", d'autant mieux que le broyage aura été plus poussé. Après avoir ajouté un peu de solution saturée à la préparation, on la chauffe prudemment de façon à dissoudre une partie de la masse broyée, le tiers, par exemple, avant de refroidir. La dissolution portant principalement sur les particules les plus fines, on restreint assurément les chances de l'orientation au hasard en procédant ainsi, mais en réservant cependant une forte probabilité à la production de cristaux affranchis de l'obligation de n'obéir qu'aux nécessités géométriques.

Conservation des tubes contenant les solutions saturées

Toutes les substances entrant dans la collection présentée plus loin sont solubles dans l'eau. Elles se dissolvent totalement ou partiellement dans leur eau-mère à la chaleur du bain-marie, puis, ramenées à la température ordinaire, recristallisent dans le tube qui les contient sans que, ordinairement, il en résulte aucun dommage pour le récipient, même si les cristaux reformés envahissent le tiers du tube. Mais le borax (n° 21 de la liste), le sel de Seignette (n° 14), ainsi que le sel de cérium (n° 8), exigent des précaution particulières: dès que le volume du sel déposé de la solution refroidie dépasse la capacité de la calotte hémisphérique qui ferme le tube par le bas, celui-ci éclate inévitablement.

Liste des substances choisies

La plupart des substances mises dans la liste sont citées soit dans le grand traité de Groth [3]¹), soit dans les "Elemente" [4] du même auteur. Ces citations sont rappelées dans la liste suivante soit par G. suivi des numéros du volume et de la page, soit par G. Elem.

¹⁾ Les numéros entre [] sont ceux de la liste bibliographique placée à la fin.

Système quadratique

1. Sulfate de nickel hexahydraté, $SO_4Ni \cdot 6H_2O$	(G. II, 423)		
2. Acétate cuprical cique tétrahydraté, $(C_2H_3O_2)_4CuCa$ · $4H_2O$	(C III 77)		
-	(G. III, 77)		
3. Hexaméthylènetétramine avec thiocyanate de manganèse tétrahydraté, 2 $(CH_2)_6N_4\cdot(SCN)_2Mn\cdot 4H_2O$.	(G. V, 857)		
4. Succinate de baryum, (CH ₃ COO) ₂ Ba	(G. III, 267)		
Système hexagonal			
5. Sulfate d'aluminium et de guanidinium hexahydraté,			
$(SO_4)_4Al_2(CH_6N_3)_2 \cdot 6H_2O$	(G. III, 567)		
6. Iodate et iodure de sodium hydratés, 2IO ₃ Na·3NaI·	S.		
$20\mathrm{H_2O}$	(G. II, 102)		
$Syst\`eme\ rhombo\'edrique$			
7. Métaborate de lithium hydraté, BO ₂ Li·8H ₂ O	(G. II, 731)		
8. Nitrate de cérium et de zinc hydraté, (NO ₃) ₁₂ Ce ₂ Zn ₃ .			
$24\mathrm{H_2O}$	(G. II, 156)		
9. Sulfate de manganèse et de sodium hydraté,			
$(SO_4)_7Mn_4Na_6 \cdot 8H_2O$	(G. II, 493)		
10. Molybdate trisodico-lithique hexahydraté,	el .		
$(MoO_4)_2Na_3Li\cdot 6H_2O$	(G. II, 368)		
11. Trimétaphosphate de sodium hexahydraté,			
$(PO_3)_3Na_3\cdot 6H_2O$	[6]		
12. Chromate trisodico-lithique hexahydraté,			
$(CrO_4)_2Na_3Li\cdot 6H_2O$	(G. II, 368)		
13. Trioxalatochromiate de magnésium et de sodium	ro.ī		
hydraté, $[Cr(C_2O_4)_3]MgNa \cdot 8H_2O$	[3]		
$Syst\`eme\ or thorhombique$			
14. Tartrate sodico-potassique tétrahydraté (dit "sel de			
Seignette" ou "sel de La Rochelle"),			
$(CHOH)_2(COO)_2KNa \cdot 4H_2O \cdot \cdot$	(G. III, 332)		
15. Phosphate d'urée, $PO_4H_3 \cdot CO(NH_2)_2$	(G. III, 540)		

16.	Gaïacolsulfonate de potassium,	
	(1,2,5)-C ₆ H ₃ (OH)(OCH ₃)SO ₃ K	
17.	Thio ürée, $CS(NH_2)_2$	(G. III, 555)
18.	Phtalate monopotassique, (1,2)-HOOC-C $_6\mathrm{H}_4\text{-COOK}$	(G. IV, 724)
19.	Sulfanilate de sodium dihydraté, $(1,4)$ -NH $_2$ ·C $_6$ H $_4$. SO $_3$ Na.2H $_2$ O	(G. IV, 335)
20.	Sulfonal, $(CH_3)_2C(SO_2C_2H_5)_2$	(G. Elem., 347)
$Syst\`eme\ monoclinique$		
21.	Borax, $B_4O_7Na_2 \cdot 10H_2O$	(G. II, 732)
22.	Pyrophosphate de sodium décahydraté	(G. II, 792)
23.	p-toluène sulfonate de manganèse hexahydraté, $(CH_3\cdot C_6H_4\cdot SO_3)_2Mn\cdot 6\ H_2O\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .$	(G. IV, 420)
24.	p-toluène sulfonate de cadmium hexahydraté, $(CH_3 \cdot C_6H_4 \cdot SO_3)_2Cd \cdot 6 H_2O $	(G. IV, 422)
25.	Chlorure de baryum dihydraté, $\mathrm{BaCl_2} \cdot 2\mathrm{H_2O}.$	(G. I, 239)

Commentaire

- 1. SO₄Ni·6H₂O. Stable au dessous de 40° C, la forme quadratique ne se développe bien qu'en solution fortement acide (1 à 2 % de SO₄H₂ libre). Le tube renfermant la provision de sel ne doit donc jamais être mis au bain-marie; la solution saturée sera évaporée à la température ordinaire. Faute d'observer ces prescriptions, on s'expose à voir la préparation envahie par des cristaux monocliniques. Un préparateur expérimenté saura tirer parti de ce contretemps: après avoir chauffé très légèrement la préparation mal réussie, il l'amorcera après refroidissement par une trace de sel quadratique; dès que le germe introduit se révèlera viable, il pratiquera la manœuvre B: il verra alors grandir au contact ou à proximité des cristaux indésirables en voie de résorption de jolies pyramides quadratiques (111) tronquées par de larges bases (001).
- 2. Afin d'éviter la séparation d'acétate cuprique monoclinique, que les débutants risquent de confondre avec le sel double quadratique en dépit de son pléochroïsme particulier (vert-bleu), il est bon d'ajouter un excès de sel de calcium à la solution saturée. Les cristaux fibreux

d'acétate calcique qui peuvent se déposer d'une eau-mère fortement concentrée ne détournent pas l'attention des jolis cristaux bleux du sel double. L'habitus de ceux-ci résulte de l'association de 2 prismes quadratiques; les faces du deutéroprisme (110) sont souvent séparés de la base (001) par une face de deutéropyramide. Les teintes azurées de ce sel sont affectées d'un léger pléochroïsme: ϵ bleu vif; ω un peu plus clair.

- 3. La solution du sel décrit par Billows [1] ne doit pas contenir d'hexaméthylènetétramine en excès, car les cristaux cubiques qu'elle forme risquent d'être confondus avec des cristaux quadratiques reposant sur leur face (001); celle-ci est toujours dominante dans le thiocyanate en question, quoi qu'en disent les rapports de seconde main mentionnant des cristaux "aplatis sur (010)". Les cristaux obtenus par l'évaporation de leur solution à l'air libre n'atteignent pas la perfection réalisable par l'emploi du procédé B.
- 5. Sel de guanidinium. Le montage des préparations se fait par le procédé décrit en A. Les cristaux se présentent en lames hexagonales (0001) bordées par des pans (1010); leurs sommets sont parfois tronqués par des minuscules faces de deutéropyramide. Les faces prismatiques peuvent être assez larges pour servir de base à quelques cristaux, qui se présentent alors de profil avec leur biréfringence maxima (0,088), donc dans une position propice à la vérification du signe optique trouvé en lumière convergente.

Dans les préparations vieilles d'une semaine, par exemple, apparaissent des cristaux cubiques d'alun ammoniacal $(SO_4)_2AlNH_4 \cdot 12H_2O$ provenant de la décomposition de la guanidine. Il est donc prudent de vérifier de semestre en semestre que la solution conservée dans un tube imparfaitement bouché n'a pas subi pareille altération.

- 6. Iodo-iodate de sodium. La solution d'où naîtront les cristaux hexagonaux se prépare simplement par dissolution d'iode dans une lessive de soude caustique. Exposée à la lumière, elle jaunit. On la décolore par quelques gouttes de sulfure de sodium dissous, et l'on élimine par filtration le précipité éventuel; les produits accessoires de la réaction mise en jeu thiosulfate ou tétrathionate plus solubles que l'iodo-iodate, ne troublent pas la cristallisation de celui-ci tant qu'il prédomine dans la solution.
- 7. Le métaborate de lithium fournit aux physico-chimistes un exemple typique de sel susceptible de prendre plusieurs degrés d'hydratation. Aussi est-il opportun, lorsqu'on veut obtenir uniquement le sel rhomboé-drique à 8H₂O, de ne chauffer que très modérément la solution saturée qui sort du bain-marie pour hâter son évaporation. Les cristaux obser-

vables sous le microscope révèlent des formes très simples se prêtant bien à l'analyse morphologique: entre les faces ($\overline{2}11$) qui délimitent le contour hexagonal et le pinacoïde (111) sur lequel reposent la plupart des cristaux s'insèrent ordinairement les faces du rhomboèdre fondamental (100).

- 8. Au sel double (NO₃)₁₂Ce₂Mg₃·24H₂O dont les caractères sont consignés dans le recueil de Groth (II, 156), nous avons préféré le sel isomorphe de zinc, non décrit jusqu'à ce jour, à cause de sa solubilité moindre. Le sel dont nous disposions avait été préparé à partir d'un oxalate de cérium technique qui devait renfermer toute une kyrielle d'homologues du cérium, notamment du néodyme dont la présence dans la solution s'accusait par une teinte rosée. La solubilité du sel de zinc est encore forte; aussi convient-il de l'amener à cristalliser par le procédé C. Il ne faut pas pousser brutalement la concentration de la première goutte de solution posée sur la lame porte-objet, sinon on risque de voir le nitrate de cérium cristalliser sans formation de sel double. La face (111) est si largement développée que la plupart des cristaux, reposant sur elle, sont constamment à l'extinction.
- 9. Dans le sulfate mangano-sodique la large prédominance des faces (100) laisse ordinairement fort peu de place au pinacoïde (111). C'est pourquoi le caractère uniaxe des cristaux est moins facile à mettre en évidence que dans les cas précédents.
- 10. Ce molybdate, dont les formes sont un peu plus compliquées que celles des corps qui le précèdent dans la liste, cristallise bien dans une solution tiède, doucement amenée à consistance sirupeuse.
- 11. Ce métaphosphate a été obtenu comme produit accessoire de la préparation de l'octométaphosphate cubique de cobalt et de sodium $(PO_3)_8Co_3Na_2$, préparé et étudié par Tammann [5] et assimilé au sel sodique auquel cet auteur attribue la formule $(PO_3)_3Na_3 \cdot 6H_2O$. L'habitus prismatique des cristaux observés est dû à l'importance des faces $(\overline{2}11)$ que tronque une large base (111), tandis que le rhomboèdre (100) est peu développé. L'intérêt principal que présente ce sel, dont le signe optique est négatif, tient au fait que son indice ϵ est sensiblement égal à celui de son eau-mère, tandis que ω lui est bien supérieur, d'où le remarquable changement de relief que l'on observe en faisant tourner un cristal couché sur une face $(\overline{2}11)$; ainsi se manifeste sa haute biréfringence, sans intervention du nicol analyseur. Au surplus, suivant la température qui règne dans la salle où l'on travaille, c'est à dire suivant la concentration de l'eau-mère, on constate que son indice de réfraction est tantôt supérieur, tantôt inférieur à l'indice ϵ du sel immergé. Il est

clair que le métaphosphate en question constitue un matériel de premier choix pour l'observation de la frange de Becke.

- 12. Le chromate trisodico-lithique naît en cristaux fort nets de sa solution évaporée à la température ordinaire. La lenteur de cette évaporation constitue un premier inconvénient, aggravé par un autre: le faible développement de la face (111), dont l'importance est bien moindre que celle des faces (\overline{2}11) et (100). Enfin le sel n'est rhomboédrique qu'à peu près: la croix noire observable en lumière convergente se disloque un peu pendant la rotation. Les essais de rajeunissement des préparations donnent des résultats piteux.
- 13. Le trioxalatochromiate de sodium et de magnésium étudié par L. Frossard [2] est cité ici surtout à cause de son pléochroïsme saisissant entre les tons brun-rougeâtre et les bleus smalt. Ce que l'auteur dit des cristaux toujours couchés sur une face de prisme s'applique à ceux qui se développent dans un cristallisoir, mais non pas à ceux que l'obtient par évaporation d'une goutte de leur solution sur une lame de verre: ceux-là se présentent souvent à plat sur une face (0001). Il est indispensable que l'évaporation se fasse à la température ordinaire, ce sel complexe se décomposant dès qu'on le chauffe avec production de croûtes verdâtres.
- 14. Sel de Seignette. Il n'y a pas de substance se prêtant mieux que ce tartrate à la démonstration des propriétés optiques des cristaux orthorhombiques. Des 2 pinacoïdes de la zone [001], l'un, (010), est doué de la biréfringence maxima (0,0054), tandis que l'autre, (100), perpendiculaire à la bissectrice aiguë n_g, ne montre que les gris du premier ordre entre nicols croisés dans les préparations ordinaires, d'épaisseur voisine de 0,05 mm. Les hyperboles provenant de la dislocation de la croix noire, manifestement bordées de teintes de dispersion, indiquent la position du plan des axes optiques avec toute la netteté désirable; ainsi la sortie de la bissectrice obtuse n_p se trouvera sans peine dans la face (001) dont le contour est grossièrement elliptique et qui s'éclaire entre les nicols croisés des jaunes du premier ordre. Il reste à trouver un cristal orienté de façon à montrer la sortie d'un axe optique; on y parvient en examinant une préparation réunissant des cristaux orientés "au hasard", c'est à dire préalablement soumise au traitement décrit en E.
- 15. Le phosphate d'urée s'obtient aisément par dissolution de l'urée dans l'acide phosphorique sirupeux. Les cristaux, d'allure prismatique, ne possèdent que 2 pinacoïdes: (100) perpendiculaire à $n_{\rm p}$; l'absence du troisième empêche d'observer la section de biréfringence maxima.

16. Après des fouilles infructueuses dans les répertoires, je m'excuse de n'avoir à fournir ici au sujet du gaïacolsulfonate de potassium, que les références extraites de mes notes. Ce sel est assez connu pour avoir été admis dans la Pharmacopée helvétique. D'autres avant moi doivent avoir constaté ce qui suit:

L'allure prismatique des cristaux est l'effet de la présence de 2 pinacoïdes: (100), largement développé, est perpendiculaire à n_g , tandis que la face (010), perpendiculaire à n_p , est généralement plus étroite. n_m sort du sommet où convergent des petites faces qui ne peuvent être que (111).

- 17. Les 2 pinacoïdes associés aux faces prismatiques (110) de la thioürée sont (001) et (010); chacun d'eux est normal à une bissectrice; le plan des axes optiques est donc (100), et non pas (001) comme certains répertoires l'indiquent. L'examen des cristaux de thioürée permet d'observer de brillants phénomènes de dispersion.
- 18. Le phtalate monopotassique [6] se présente en cristaux limités par les faces (001), (011), (111), (112), de sorte que la bissectrice obtuse n_g est seule accessible à l'observation courante. En revanche, il se prête fort bien aux premiers exercices où le débutant apprend à mesurer des angles d'extinction et à utiliser les réactifs optiques (gypse R I et mica quart d'onde). En effet, de sa solution concentrée refroidie rapidement et soumise aux manipulations décrites sous B, le sel se dépose en cristaux d'orientation uniforme, savoir en lamelles rhomboïdales (001) très nettes, dont les sommets aigus sont souvent tronqués par des faces (011) rudimentaires. Extrêmement minces au début, ces lamelles montrent entre nicols croisés toute la gamme des teintes du premier au troisième ordre; les cristaux de grande taille formés par refroidissement lent offrent couramment des teintes plus élevées, moins propices aux réactions optiques.
- 19. Des remarques analogues s'appliquent au sulfanilate de sodium, ainsi qu'au tétrachlorophtalate de potassium, non cité dans la liste précédente à cause de l'incertitude qui règne au sujet de son degré d'hydratation.
- 20. Sulfonal. La large base sur laquelle reposent la plupart des cristaux est la face de biréfringence maxima. C'est la seule qui ne fasse pas partie de la zone prismatique qui comprend, outre (110), une large pinacoïde (100) normal à n_p ; l'étroitesse de l'autre, (010), rend parfois laborieuse la recherche de la bissectrice n_p qui lui est perpendiculaire.
- 21. Divers manuels représentent des cristaux de borax dépourvus de la face (010) sans laquelle une étude complète est impossible par les

moyens ordinaires. En réalité, les solutions saturées de borax "pour l'analyse chimique", qui sont alcalines, nous ont toujours fourni des cristaux doués de la face parallèle au plan de symétrie. Ainsi constitués, ils se prêtent mieux que la plupart des autres ressortissants monocliniques à un exercice méthodique de détermination des éléments optiques. Les individus les plus fréquents dans les préparations montrent l'extinction droite et une biréfringence assez élevée, voisine de 0,020; ils sont couchés sur leur face (100) d'où la bissectrice obtuse n_g émerge obliquement; ils laissent voir que le plan des axes optiques est transversal à l'allongement [001]. Quand cette constatation est faite, on peut se mettre en quête de cristaux posés sur une face (010), où la biréfringence est bien plus faible (0,003), car elle est perpendiculaire à la bissectrice aiguë n_p. Dès lors la position exacte de l'ellipsoïde des indices dans le cristal se reconnaît sans difficulté.

Les solutions chaudes de borax ne fournissent pas de bons cristaux monocliniques; en effet, au dessus de 60° C, c'est le sel à $5\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$, dit "octaédrique" qui prend naissance; il est rhomboédrique, et les produits de son épigénie par le sel à $10\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ se présentent assez mal. L'évaporation de la solution saturée à la température ordinaire donne quelques bons résultats. Nous préférons évaporer jusqu'à consistance sirupeuse une goutte de solution légèrement tiédie et en amorcer la cristallisation suivant le procédé décrit sous lettre C. Le rajeunissement des préparations est une opération délicate: il faut chauffer modérément au niveau g..h de la platine (fig. 1) de peur d'atteindre la température de 60° fatale au sel monoclinique.

22., 23. et 24. Le pyrophosphate de sodium et les 2p-toluènesulfonates admis dans la liste précédente ont un caractère morphologique commun: le développement prépondérant des faces en zone autour de l'orthodiagonale [010]. Dans les 3 sels n_g est voisin de la normale à une large face de cette zone, mais c'est dans le composé de cadmium seulement, où les axes optiques sont contenus dans le plan de symétrie, que les 2 bissectrices de leurs angles sont accessibles à l'observation courante.

25. L'examen du chlorure de baryum hydraté est recommandé à cause de la netteté de ses macles polysynthétiques.

Les substances dont il vient d'être question permettent de faire aux étudiants en cristallographie des démonstrations sans accroc. Bien que leur composition chimique s'éloigne souvent de l'ordinaire, il vaut la peine de s'en procurer au moins quelques unes.

Bibliographie

- 1. Billows (1912): (Sels d'hexaméthylènetétramine). Z. Krist. 50 (Auszüge).
- 2. Frossard, L. (1956): Etude du trioxalatochromiate de sodium et de magnésium Bull. suisse Minéral. et Pétrogr., 36, 1—25.
- 3. Groth, P. (1906—1918): Chemische Krystallographie. 5 Bde., Leipzig.
- 4. (1921): Elemente der physikalischen und chemischen Krystallographie.
- 5. Tammann, G. (1892): (Polymétaphosphates). Journ. prakt. Chem. (2) 45, 469.
- 6. Widmer, E. (1930): Das Brechungsvermögen der wasserfreien phthalsauren Mono-Alkalisalze. Z. Krist. 72, 442