

<b>Zeitschrift:</b>	Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen = Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie
<b>Band:</b>	61 (1981)
<b>Heft:</b>	1
<b>Artikel:</b>	La mcnearite, $\text{NaCa}_5\text{H}_4(\text{AsO}_4)_5 \bullet 4\text{H}_2\text{O}$ , un nouvel arséniate hydraté de calcium et de sodium
<b>Autor:</b>	Sarp, Halil / Deferne, Jacques / Liebich, Bernard W.
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-47125">https://doi.org/10.5169/seals-47125</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## La mcnearite<sup>1</sup>, $\text{NaCa}_5\text{H}_4(\text{AsO}_4)_5 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ , un nouvel arséniate hydraté de calcium et de sodium.

par Halil Sarp<sup>2</sup>, Jacques Deferne<sup>2</sup> et Bernard W. Liebich<sup>3</sup>

### Abstract

Mcnearite,  $\text{NaCa}_5\text{H}_4(\text{AsO}_4)_5 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ , occurs with picropharmacolite, pharmacolite, guérinite and haidingerite at Sainte-Marie-aux-Mines (Vosges, France). The name is in honour of Miss Elizabeth McNear, who worked in the field of mineralogy and crystallography at the University of Geneva, Switzerland. Both mineral and name have been approved by the Commission on New Minerals and Mineral Names of the International Mineralogical Association.

Qualitative analysis indicate Ca, Na, As, H and O. The X-ray powder diagrams are from Gandolfi and Guinier-Hägg cameras. We used the precession and the Weissenberg methods for single crystal study. The crystal is triclinic, space group is  $\text{P}\bar{1}$  or  $\text{P}\bar{1}$ , with  $a = 13.50$ ,  $b = 14.10$ ,  $c = 6.96 \text{ \AA}$ ,  $\alpha = 90^\circ$ ,  $\beta = 92^\circ$  and  $\gamma = 119^\circ$ , and  $Z = 2$ . To these parameters corresponds a calculated density of  $2.85 \text{ g/cm}^3$  whereas the measured density is  $2.60 \text{ g/cm}^3$ . The difference can probably be explained by the porosity of the radiated texture. The main diffraction lines occur at  $12.33$  (100) (010),  $6.94$  (50) (001),  $4.40$  (30) (3 $\bar{1}$ 0) (201),  $3.92$  (60) (300) (12 $\bar{1}$ ),  $3.400$  (25) (3 $\bar{3}$ 1) (130),  $3.122$  (60) (122) (1 $\bar{2}$ 2),  $2.939$  (25) (400) (311) (202) and  $2.748$  (40) (40 $\bar{1}$ ) (232) (441).

The mineral is fibrous and often radiated. The maximum length of fibers reaches 1 to 2 mm. The refractive indices are  $\alpha = 1.559$ ,  $\beta = 1.562$ ,  $\gamma = 1.572$ , optically positive with  $2V_\gamma = 60^\circ$ .

### INTRODUCTION

Ce nouveau minéral a été rencontré sur des échantillons trouvés par Eric Asselborn à Sainte-Marie-aux-Mines et déposés au Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Il a été nommé mcnearite en hommage à Elizabeth McNear, minéralogiste et cristallographe à l'Université de Genève.

<sup>1</sup> First proposed as macnearite to I. M. A., but correct orthography is mcnearite.

<sup>2</sup> Département de minéralogie, Muséum d'Histoire naturelle, 1, route de Malagnou, CH-1211 Genève 6.

<sup>3</sup> Adresse au moment de la recherche: Laboratoire de cristallographie aux rayons X, Université de Genève, 24, quai Ernest Ansermet, CH-1211 Genève 4. Actuellement 18, route de Founex, CH-1299 Commugny.

Ce nouveau minéral ainsi que son nom ont été approuvés par la Commission internationale des nouveaux minéraux et des noms de minéraux (I. M. A.). L'échantillon type est conservé au département de minéralogie du Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

#### MODE DE GISEMENT ET MINERAUX ASSOCIES

Les échantillons sur lesquels a été découverte la mcnearite proviennent du travers-banc «Tiefstollen», dans une partie de galerie qui servait anciennement au stockage du minéral du filon à arsenic de Gabbe-Gottes/Saint Jacques.

Les minéraux qui accompagnent la mcnearite sont la picropharmacolite, la pharmacolite, la guérinite et la haidingerite.

La formation de ce minéral est certainement dû à la réaction d'acide arsénique avec la gangue carbonatée du minéral. La présence du sodium doit être liée à l'abondance de la mirabillite qui tapisse les parois de cette partie de galerie (WEIL, 1937, communication orale de H. BARI).

#### COMPOSITION CHIMIQUE

L'analyse chimique a été effectuée par absorption atomique et la quantité d'eau déterminée par thermogravimétrie. La microsonde électronique a confirmé la présence de Ca, Na et As à l'exclusion de tout autre élément. Deux analyses ont donné les résultats suivants:


	I	II	moyenne	comp. théorique
CaO	25.27	26.16	25.71	28.10
As <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	60.59	57.80	59.19	57.93
Na <sub>2</sub> O	3.40	3.40	3.40	3.11
H <sub>2</sub> O	11.32	11.32	11.32	10.86
total	100.58	100.68	100.62	100.00

Table I composition chimique de la mcnearite. Comparaison avec la composition théorique calculée.

La formule empirique calculée à partir des valeurs moyennes des analyses sur la base de As = 5 est la suivante:



ou idéalement  $\text{NaCa}_5\text{H}_4(\text{AsO}_4)_5 \cdot 4 \text{ H}_2\text{O}$ .



PI. I Mcnearite de Sainte-Marie-aux-Mines, a) gross: 40 x; b) gross. 80 x. Photo du Dr. Jean Wüest, microscope électronique à balayage du Muséum de Genève.

#### HABITUS ET PROPRIETES PHYSIQUES

Le minéral est fibroradié (pl. I). Les fibres se défont très facilement. Elles peuvent atteindre 1 à 2 mm de longueur. La couleur est blanche et l'éclat nacré. La densité mesurée est  $2.60 \text{ g/cm}^3$  contre  $2.85$  pour la densité calculée à partir de la formule idéale. La différence est probablement due à la porosité de la texture fibreuse qui empêche toute mesure précise.

La dureté est impossible à mesurer à cause de la nature très fragile du minéral. Le minéral est faiblement fluorescent dans les teintes violettes lorsqu'il est exposé aux ondes U.V. courtes et longues. Soluble dans les acides.

Les propriétés optiques sont les suivantes:

signe optique:	biaxe positif, $2V_\gamma = 60^\circ$ <sup>4</sup>
indices de réfraction:	$\alpha = 1.559$
	$\beta = 1.562$
	$\gamma = 1.572$ <sup>5</sup>
	$\gamma - \alpha = 0.008$ à $0.013$
couleur en lum. transp.:	incolore
dispersion:	assez forte
allongement:	positif
extinction:	$6^\circ$ à $22^\circ$ entre $\beta$ et $c$
clivage:	parfait, parallèle à l'allongement
macles:	lamellaires, parallèles à l'allongement

#### DONNEES RADIOCRISTALLOGRAPHIQUES

Les distances réticulaires  $d_{\text{obs.}}$  et les intensités des raies ont été mesurées sur des diagrammes de poudre obtenus avec des caméras de Gandolfi et Guinier-Hägg.

L'habitus fibreux de la mcnearite (pl. I) rend très difficile l'obtention de diagrammes de monocristaux. Sur les enregistrements de précession et de Weissenberg les spots sont toujours plus ou moins allongés. Malgré ces difficultés nous avons pu observer une maille triclinique présentant les paramètres suivants:

$a = 13.50 \text{ \AA}$ ,  $b = 14.10 \text{ \AA}$ ,  $c = 6.95 \text{ \AA}$ ,  $\alpha = 90^\circ$ ,  $\beta = 92^\circ$ ,  $\gamma = 119^\circ$ , groupe d'espace  $P\bar{1}$  ou  $P\bar{1}$ ;  $Z = 2$  (avec  $d_{\text{calc.}} = 2.85 \text{ g/cm}^3$ ).

Cependant, à cause de la mauvaise qualité des cristaux et des diagrammes correspondants, il subsiste une légère incertitude à propos des paramètres de la mcnearite et l'éventualité d'une maille monoclinique ne peut pas être entièrement exclue.

La table II contient les valeurs  $d_{\text{obs.}}$  et  $I_{\text{obs.}}$  indexées et comparées avec les valeurs calculées à partir de la maille triclinique décrite ci-dessus et pour le groupe d'espace  $P\bar{1}$ .

<sup>4</sup> mesuré avec la platine universelle;

<sup>5</sup> non mesuré directement mais calculé à partir de  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $2V$ ; calculé aussi avec la formule de Gladstone et Dale.

Table II comparaison des raies de diffraction observées et calculées à partir de la maille triclinique et pour le groupe d'espace P1.

hkl	$d_{calc.}$	$d_{obs.}$	$I_{obs.}$	hkl	$d_{calc.}$	$d_{obs.}$	$I_{obs.}$
010	12.330	12.33	100	311	3.034		
100	11.798	11.77	5	222	3.026		
001	6.945	6.94	50	131	3.023	3.004	10
210	6.746	6.75	5	341	3.022		
011	6.102	6.10	5	022	3.001		
101	6.092			421	2.993		
		5.69 <sup>1</sup>		400	2.950		
		5.18 <sup>2</sup>		311	2.944	2.939	25
111	5.016	5.02	5	202	2.942		
120	4.621	4.61	15	411	2.899	2.870	20
310	4.418	4.40	30	401	2.755		
201	4.410			232	2.752	2.748	40
330	3.958	3.97	5	441	2.751		
300	3.933	3.92	60	530	2.685		
121	3.902			140	2.681	2.681	5
031	3.567	3.58	5	312			
301	3.482	3.480	15	520	2.680		
331	3.407	3.400	25	410	2.598	2.592	10
130	3.402			351	2.590		
410	3.247	3.231	20	510	2.558	2.550	5
122	3.117	3.122	60	302	2.553		
122	3.112			plus une vingtaine de raies très faibles.			

<sup>1</sup> ligne diffuse allant de 5.62 à 5.69 Å, non indexée;

<sup>2</sup> ligne diffuse allant de 5.18 à 5.22 Å, non indexée. Ces deux raies sont probablement dues à des inclusions.

### Remerciements

Nous exprimons toute notre gratitude au Dr. Paul Tissot et au Dr. Selim Doğan, du département de chimie minérale analytique et appliquée de l'Université de Genève, pour l'étude thermogravimétrique et l'analyse chimique qu'ils ont effectuées.

**Bibliographie**

- GUERIN, H. (1941): Sur les arséniates alcalino-terreux. Etude du système  $As_2O_5$ -CaO-OH. *Ann. Chim. France*, 16, 101-153.
- BARI, HUBERT, PERMINGEAT, R., PIERROT, R. et WALENTA, K. (1980): La fluckite, arséniate hydraté de calcium et de manganèse, une nouvelle espèce minérale. *Bull. Soc. fr. Minéral. Cristallogr.*, 103, 122-128.
- PIERROT, R. (1964): Contribution à la minéralogie des arséniates calciques et calcomagnésiens naturels. *Bull. Soc. fr. Minéral. Cristallogr.*, 87, 169-211.
- Weil, R. (1937): Notices minéralogiques. *Bull. Serv. Carte géol. Als. Lorr. IV*, 85-90

Manuscrit reçu le 1 de juin 1981.