Zeitschrift: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen =

Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie

Band: 63 (1983)

Heft: 2-3

Artikel: Mikroskopische kristallographische Verwachsungen von Oligoklas mit

Andesin

Autor: Wenk, Eduard

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-48728

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Mikroskopische kristallographische Verwachsungen von Oligoklas mit Andesin

von Eduard Wenk*

Abstract

Evidence is presented for microscopic crystallographic intergrowths of oligoclase An 20-23 (17-27) with andesine An 30-32 (29-35) in rocks from the kyanite-zone of the Lepontine Alps. They indicate a narrow miscibility gap in the plagioclase series below An 30.


Keywords: intergrowth of oligoclase and andesine, miscibility gap, oligoclase, andesine, Lepontine Alps.

Mikroskopische rationale Verwachsungen von Andesin An 30-40 mit Labradorit An 60-70, und von Labradorit mit Bytownit-Anorthit An 85-95, sind in Silikatmarmoren und Kalksilikatfelsen der Lepontinischen Alpen häufig anzutreffen. Im Dünnschliff können die geradlinig oder treppenartig verlaufenden Verwachsungsebenen leicht erkannt und mit U-Tisch-Methoden eingemessen und indiziert werden.

Verwachsungen von Andesin mit Oligoklas sind in metamorphen Karbonatgesteinen selten, treten jedoch auch in Glimmerschiefern und Amphiboliten auf. Sie sind nur ausnahmsweise so gut ausgebildet, dass die optische Orientierung beider Phasen festgestellt und sowohl die Kontaktflächen als auch Zwillingsebenen eingemessen werden können. In schiefen Schnitten sind bloss Flekken oder Streifen mit verschiedenem Auslöschungswinkel zu erkennen.

Figur 1 zeigt einige optisch analysierte Plagioklaskörner mit rational verwachsenem Oligoklas und Andesin. Die U-Tisch-Methode ist in diesem Bereich sehr zuverlässig, da die optischen Migrationskurven für Plagioklas-Tief durch viele Fixpunkte belegt sind und die Orientierung der Indikatrix mit zunehmen-

^{*} Mineralogisch-Petrographisches Institut der Universität Basel, Bernoullistrasse 30, CH-4056 Basel.



Figur 1 Plagioklaskörner mit kristallographischer Verwachsung von Oligoklas (punktiert) mit Andesin. Körner a und b aus Quarz-Calcit-Hornblende-Plagioklas-Fels Vz. 48, Einschluss in Bändergneis. Fundort Pianasc, Val d'Osura, Verzasca. Korn a Oligoklas An 22-23, Andesin An 30, Korn b Oligoklas An 25-27, Andesin An 29-32. Korn c aus staurolithführendem Disthen-Granat-Plagioklas-Zweiglimmerschiefer A. I. 129, SE Pizzo Campo Tencia 2640 m. Oligoklas An 20-22, Andesin An 30. P = Periklinlamellen.

dem An-Gehalt stark ändert. In den abgebildeten und in weiteren Körnern variiert der An-Gehalt von Oligoklas von 17 bis 27, mit deutlicher Häufung bei 20-23, während der rational verwachsene Andesin vorwiegend die Zusammensetzung An 30-32, mit Streuung An 29-35, aufweist.

Die Beispiele belegen, dass Oligoklas und Andesin gleichzeitig kristallisierten als «stabile» Phasen und dass unter den gegebenen physikalisch-chemischen Bedingungen der Disthen-Zone im zentralen Maggia-Verzasca-Ticino-Gebiet im Bereich An 27-29 eine Lücke existiert. Diese ist viel enger als die bekannten, von Laves (1979) Peristerit, Spektrolith und Anzolit genannten Mischungslücken der Plagioklase-Tief. Sie liegt im Bereich des in den fünfziger Jahren von Kristallographen entdeckten Strukturwechsels bei An 30, der sich auch in den Knickstellen moderner optischer Migrationskurven äussert (Burri et al. 1967, S. 238). Überraschend ist schliesslich die nahe Übereinstimmung der in den Verwachsungen festgestellten An-Werte 17-27 und 29-35 mit den vor Jahrzehnten anhand älterer Bestimmungskurven erhaltenen häufigen An-Stufen der diskontinuierlichen Plagioklasreihe metamorpher Gesteine:

Ornö Huvud (WENK 1936)	21-28	36-40
Verzasca (WENK 1948)	20-28	33-36
Schwarzwald (REIN 1952)	24-29	32-40

Literatur

- BURRI, C., PARKER, R. L. und WENK, E. (1967): Die optische Orientierung der Plagioklase. Birkhäuser Verlag Basel.
- LAVES, F. (1979): Gedanken zum stabilen Phasendiagramm der Plagioklase. SMPM 59, 19-23.
- REIN, G. (1952): Der Werdegang des Orthits in der magmatischen und metamorphen Abfolge des mittleren Schwarzwaldes. Neues Jahrb. Mineral. Abh. 84, 365-435.
- Wenk, E. (1936): Zur Genese der Bändergneise von Ornö Huvud. Bull. Geol. Instit. Upsala 26, 53-89.
- Wenk, E. (1948): Beziehungen zwischen normativem und modalem Anorthitgehalt in Eruptivgesteinen und kristallinen Schiefern. SMPM 28, 380-393.

Manuskript eingegangen 25. Juni 1983.

Leere Seite Blank page Page vide