Zeitschrift: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen =

Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie

Band: 67 (1987)

Heft: 1/2

Artikel: Présence de zincocopiapite en Valais

Autor: Perroud, P. / Meisser, N. / Sarp, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-51592

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Présence de zincocopiapite en Valais*

par P. Perroud¹, N. Meisser², H. Sarp¹

Abstract

Zincocopiapite, $ZnFe_4^{-3}(SO_4)_6(OH)_2 \cdot 18 H_2O$ occurs with other sulphates (boyleite, gunningite, coquimbite, jarosite, melanterite, roemerite, siderotil, voltaite, chalcanthite, hexahydrite, gypsum) at Les Vallettes, Valais, Switzerland. Crystals occur as thin yellow scales with pearly to greasy luster. The mineral is triclinic. The main diffraction lines occur at: 18.2 (100), 9.06 (90), 6.55 (30), 6.06 (50), 5.71 (40), 5.20 (30), 4.87 (25), 4.54 (20), 3.568 (50).

Keywords: Zincocopiapite, sulfates, Valais.

Introduction

Au cours d'une excursion organisée par la «Société genevoise de minéralogie», nous avons eu l'occasion de visiter la région du Mont-Chemin, à l'entrée du Val de Bagnes, en Valais.

Sur la rive droite de la Drance, à proximité du village des Vallettes, dans les pentes de La Ravoire, on peut observer un éboulement dans une zone de gneiss et de schistes cristallins. Quelques énormes blocs de rochers sont recouverts, par endroits, de minéraux d'altération. Ces derniers révèlent la présence de filons métallifères disposés en concordance avec la schistosité de la roche. Nous avons prélevé des échantillons en vue d'une étude ultérieure.

Au cours de cette étude, nous avons pu déterminer la présence de zincocopiapite, associée à d'autres sulfates rares ou non signalés en Suisse.

Dans une gangue quartzeuse se trouvent des sulfures essentiellement représentés par la sphalérite et la pyrite. Parmi les produits d'altération nous avons noté: boyléite, chalcanthite, coquimbite, gunningite, gypse, hexahydrite, jarosite, mélantérite, roemérite, sidérotile, voltaite, zincocopiapite.

Certains des minéraux de cette paragenèse feront l'objet d'une note ultérieure car leur étude se poursuit.

Il convient de noter que plusieurs de ces minéraux sont étroitement mêlés les uns aux autres ce qui rend leur détermination délicate, d'autant plus qu'ils ne sont souvent observables qu'au microscope polarisant.

Propriétés physiques et optiques

Sur l'échantillon étudié, les cristaux de zincocopiapite, parfaitement idiomorphes, se présentent en amas de couleur jaune canari. Ils présentent une symétrie pseudo-orthorhombique, sont aplatis selon b et allongées suivant [101]. Les faces développées sont (010), (100), (001) et (101). Le clivage est parfait selon {010} (fig. 1). La longueur des cristaux atteint 1 mm. Ils sont transparents avec un éclat nacré, légè-

^{*} En l'honneur du Professeur Ernst Niggli pour son 70e anniversaires.

¹ Departement de minéralogie, Muséum d'Histoire naturelle, case postale 284, route de Malagnou, CH-1211 Genève 6.

² Route du Signal 5, CH-1018 Lausanne.




Fig. 1 Habitus d'un cristal de zincocopiapite avec les formes principales et la position des éléments optiques.

rement résineux. Ils sont lentement solubles dans l'eau.

Les propriétés optiques sont les suivantes: Système triclinique (+)

$$\begin{array}{l} n_{\alpha} \, = \, 1.532 \, (2) \\ n_{\beta} \, = \, 1.540 \, (2) \\ n_{\gamma} \, = \, 1.592 \, (2) \\ 2 \, V_{\gamma calc} \, = \, 44^{\circ} \end{array}$$

La dispersion est forte, avec r > v. Le minéral est fortement pléochroïque avec:

> γ = jaune canari intense β = incolore α = jaune clair

Orientation optique:

$$a \wedge \gamma = 51^{\circ}$$

 $c \wedge \beta = 39^{\circ}$
 $b \sim \alpha$, O.A.P. $\sim (101)$

Donc γ et β forment presque les diagonales rectangulaires [101] et [101] et α est perpendiculaire au plan $\{010\}$.

Données radiocristallographiques

Le diagramme de poudre a été effectué avec la caméra de Gandolfi de 114.6 mm Ø. Les valeurs des d_{obs} et les intensités visuelles sont données au tableau 1. Nous avons également étudié un monocristal avec la caméra de précession; celui-ci nous a donné les paramètres suivants de la maille élémentaire qui est triclinique:

$$a = 7.36$$
 $\alpha = 93.8^{\circ}$
 $b = 18.40$ $\beta = 102.8^{\circ}$
 $c = 7.28 \text{ Å}$ $\gamma = 98.5^{\circ}$

Cette maille concorde assez bien avec la maille des minéraux du groupe de la copiapite. Néanmoins, nous ne pouvons pas indexer le diagramme de poudre d'une façon satisfaisante. Ce problème est peut-être dû à la déshydratation partielle du minéral.

Avec cette maille, Z = 1 et la composition chimique, $d_c = 2.15 \text{ g/cm}^3$.

L'étude radiocristallographique révèle que les cristaux présentent un maclage complexe suivant l'axe b.

Le «compatibility index» calculé avec cette valeur d_c et la loi de Gladstone-Dale en utilisant les constantes de Mandarino (1981), donne:

$$1 - \frac{\mathrm{Kp}}{\mathrm{Kc}} = 0.016$$

avec Kp = 0.258 et Kc = 0.254; ce qui indique une catégorie supérieure.

Diagramme de poudre

Le diagramme de poudre que nous avons obtenu avec le zincocopiapite du Valais diffère substantiellement de celui de Tsadam Bassin (Chine) décrit par Kuang et al. (1964) (P.D.F. no: 33-1472). Notre diagramme de poudre (tab. 1) ressemble plus au diagramme de poudre de magnésiocopiapite aluminian (P.D.F no: 20-659) malgré quelques différences. Or dans la composition chimique de notre minéral, il n'y a que Zn, Fe, S et H₂O. Ce qui le différencie clairement du magnésiocopiapite aluminian. D'autre part, l'indexation des diagrammes de poudre, que ce soit pour le zincocopiapite de Tsadam Bassin ou pour le magnésiocopiapite aluminian (P.D.F no: 20-659) montre des écarts importants entre d_{calc} et d_{obs}. Cette même difficulté a été rencontrée dans notre cas et nous n'avons pas pu indexer avec la maille élémentaire obtenue notre diagramme de poudre d'une façon satisfaisante. Nous pensons que ce problème est dû à la deshydratation partielle du minéral ou bien il existe encore quelques points obscurs dans l'étude de ces minéraux.

Composition chimique

L'analyse qualitative a été faite avec l'ana-

Tab. 1 Diagramme de poudre de la zincocopiapite des Vallettes (CuK α radiation)

d _{obs} Å	I/I_1	d _{obs} Å	I/I ₁
18.2	100	3.007	<5
9.06	90	2.968	< 5
7.13	5	2.930	5
6.95	5	2.877	5 5 5
6.55	30	2.836	5
6.06	50	2.750	10
5.71	40	2.670	< 5
5.48	<5	2.516	< 5
5.20	30	2.387	10
4.87	25	2.318	< 5
4.54	20	2.256	< 5
3.95	10	2.226	< 5
3.854	15	2.123	5
3.568	50	2.023	< 5
3.497	10	1.988	< 5
3.324	10	1.889	5
3.301	5	1.837	5 5 5
3.138	< 5	1.814	5
3.107	<5	1.755	10
		1.701	5

lyseur P.G.T. à dispersion d'énergie. Les seuls éléments détectés sont Zn, Fe et S.

Ensuite, l'analyse chimique a été faite au moyen de l'absorption atomique et par méthode classique. La quantité d'eau a été déterminée par TGA (Mettler TA1):

ZnO	6.3%
Fe_2O_3	26.1%
SO_3	39.7%
H_2O	27.0%
Total	99.1%

La formule empirique calculée sur la base de 44 atomes d'oxygène est:

$$Zn_{0.97}Fe_{4.03}^{+3}(SO_4)_{6.14}(OH)_{1.75} \cdot 17,69 H_2O$$
 ou idéalement:

$$ZnFe_4^{+3}(SO_4)_6(OH)_2 \cdot 18 H_2O.$$

Remerciements

Nous exprimons notre gratitude envers le Dr Paul Tissot, du Département de Chimie minérale analytique et appliquée de l'Université de Genève, pour nous avoir fourni les données thermogravimétriques.

Bibliographie

Kuang Tu-Chih, Hsi-Lin Li, Hsien-Te Hsieh, Shu-Shen Yin (1964): American Mineralogist, 49, 1777, Abstract.

Mandarino, J.A. (1981): The Gladstone-Dale relationship: Part IV. The compatibility concept and its applications. Can. Min., 19, 441-450.

Manuscrit reçu 11 novembre 1986, manuscrit révisé accepté 1^{er} mai 1987.