**Zeitschrift:** Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

**Band:** 8 (1912)

**Artikel:** Observations sur quelques bartavelles du bassin du Tessin

**Autor:** Vaucher, Alfred

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1002900

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## ANGELO GHIDINI

## FAUNA TICINESE.

XII.

## ALFRED VAUCHER.

# Observations sur quelques Bartavelles du bassin du Tessin

(Caccabis saxatilis Biedermanni, Reich.)

## Cher monsieur Ghidini

J'ai examiné avec beaucoup d'intérêt les six sujets de Caccabis saxatilis forma biedermanni Reich, que vous avez bien voulu soumettre a mon examen \*). Je les ai comparés aux sujets de ma collection et en ai tiré les déductions suivantes: Entre les vôtres et mes exem-

*)		Bavona	,	Val Solda X 1912	Val d'Entremont (Valais)
				1980 MST 2007	
	3	9	4	Q	9
long. tot.: mm.	360	340	<b>3</b> 30	330	320
aile:	171	163	156	160	160
queue:	86	84	84		
envergure:	54	51,5	50		
tarse:	39	38	36	39	40
id., avec 1' articulation:	49	48	46		
long. tête avec bec:	54	53	52		
long. bec:	19	17	16		
a l'angle de la bouche:	22, 5	22, 5	20		
haut. bec:	11	10	10		
oeil:	7,8	7, 5	7, 5		
larg. du collier noir (sujet en chair):					
a) latérale :	16	13	13		
b) inférieures :	7	8	65		
larg. du blanc entre le collier:	25	23	23		
long. idem (depuis le menton)	71	66	66		
long. sternum (corde)		72	67		74.

plaires du Valais, je n'ai pu trouver de différences appréciables en ce qui touche la distribution des couleurs. Les caractères différentiels avancés par Reichenow ne me paraissent pas suffisants pour créer une forme \*\*); d'autant plus que ces caractères varient d'individu à individu, de saison à saison. J' ai sous les yeux un vieux sujet femelle, provenant du Valais, du I-XII-1911, dont la gorge est d'un blanc plus pur que celui des sujets de biedermanni. La teinte roux vineuse est moins intense il est vrai que sur les sujets du Val Bavona et le dessus de la tête également plus clair, mais je le repète, ces variations sont trop instables pour servir de base à une forme nouvelle. J' attribue à l'âge de l'oiseau, la plus ou moins grande pureté des nuances du plumage. Je suppose que les très vieux sujets ont le dessus de la tête et la nuque d'un gris presque pur, ainsi que la gorge toute a fait blanche. Dans la robe d'été, cette espèce a le gris perle beaucoup plus étendu qu'en hiver, il envahit l'arrière du collier noir et la nuque. Dessus de la tête également d'un gris plus on moins pur. Bande blanche de chaque côté de la tête, large, tres apparente. Collier noir plus étroit qu'en hiver, étant donné qu'il est fortement pénétré par le gris perle dans ses parties éxtérieures. Gris de la poitrine à peu près sans mélange de roux-vineux. Plumes ornementales des flancs largements bordées de roux clair, alors qu'en hiver, ces mêmes bordures sont tres êtroites et en partie disparues. Parties inférieures couleur isabelle (sujet tué en juin).

La peau du Valsolda me paraît surtout très intéressante. Elle a les plumes des flancs dépourvues de blanc, de sorte qu'elles apparaissent chevronnées de noir et de roux. En résumé et malgré ce que j' ai dit plus haut, j' incline a reconnaître une forme spéciale dans les sujets qui nous occupent, mais sur des bases différentes que celles de Reichenow. Je l'établirais sur des caractères somatiques, me paraissant stables, appuyés, si nous voulons, par les caractères secondaires de la coloration. Voici pourquoi:

Les sujets des vallées du Tessin sont plus petits que les bartavelles du Valais; en outre, les tarses et les doigts sont notablement plus courts et les parties inférieures plus colorées \*\*\*). Nous pourrions donc admettre comme varieté locale la forme *biedermanni*, basée sur le tableau comparatif suivant.

<sup>\*\*)</sup> Les voici traduits: « plus petite que la bartavalle de Suisse parties; superieures « plus foncées et plus brunes, gorge d' un blanc pur, limité par la bordure noire plus « étroite; bas du cou lavé de brun ». « Val Solda, au nord du lac de Lugano ».

<sup>(</sup>Ornithol. Monatsberichte, XIX, n. 2, 1911, pag. 35) Déscription basée sur deux peaux données au Musée de Berlin par le Dr. Biedermann-Imhof, au quel je les avais procurées.

<sup>\*\*\*)</sup> J'ai observé souvent sur le croupion des bartavelles, des plumes qui montraient une coloration se rapprochant de celles des flancs, presque toujours par groupe de trois; p. ex: une femelle du Val Bayona du 31, I, 1911.

GH.

## ♀ C. saxatilis (Valais)

 $\mathcal{Q}$  C. saxtls. biedermanni (Valsolda)

360	mm.	330
175	-	156
100	>	90
50-51	>	38-39 (moins robuste)
40	•	33-40 (très variable)
	175 100 50-51	50-51

parties inférieures plus claires chevronnées de noir, de blanc et de brun, bec brun rouge, carminé, foncé. parties inférieures plus foncées d'un roussâtre plus vif, flancs de même couleur, chevronnées de noir, et de brun, pas de blanc. Bec carminé clair, mandibule inférieures fortement orangée.

Les bartavelles du bassin du Tessin, pour ce que je puis en conclure, après l'éxamen des sujets que vous m'avez soumis, présentent une tendence à perdre les zônes blanches aux plumes ornamentales des flancs, où cette couleur est remplacée par le roux-fauve du fond des parties abdominales. Cette tendence très manifeste dans les sujets de Val Bavona (bassin du Verbano) atteint son maximum chez les bartavelles du Valsolda (bassin du Ceresio) chez les quelles le blanc a complètement disparu. Je signalerais aussi la coloration orangée des parties rouges; rapprochement vers les bartavelles à bec jaune, qui se montrent ci et la dans là région méditerranéenne \*\*\*\*).

Genève, mai 1913.

## A. VAUCHER.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sur les Monti Lepini (Rome) vit une race ayant les parties nues de couleur jaune. (Boll. Soc. Zoolog. Ital. 1909, X, pag. 7).

Un de mes amis, Msr Pedrazzini m'assure avoir tiré deux bartavelles avec cette même particularité, au Monte Madone sur Gordevio (V. Maggia) en octobre 1912. Gн.