Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

Band: 33 (1938)

Rubrik: Stato meteorologico

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Stato meteorologico del 1937

Le tabelle qui unite contengono alcuni dati meteorologici raccolti dall' Osservatorio a Locarno-Monti nel 1937.

Tab. I.

1007		Pioggia										
1937	media	differenza dal normale	mas	sima giorno	min	ima giorno	ampl. media	giornal. massima	variab. media	interd. massima	quantità mm.	differenza dal normale
I	20.6	-0.2	10°.0	8	—2 °.3	12 e 13	5".1	8°.8	1°.1	-4°.0	31	-30
II	6.1	2.1	15.5	20	0.2	13 e 14	6.9	12.3	1.5	+4.1	114	44
III	5.2	-1.8	14.9	31	—1. 8	-3	6.7	12.4	2.1	+6.7	306	196
IV	11.6	0.8	20.0	23	4.9	4	8.6	13.0	1.6	-4.7	121	-40
V	16.1	0.8	27.8	27 e 29	7.7	14	8.3	13.4	1.6	+1.7	271	65
VI	19.6	0.5	30.4	12	10.9	19	8.1	11.8	1.5	-4.6	151	—13
VII	21.2	0.1	29.1	14	13.9	1	8.9	13.0	1.2	-6.1	197	22
VIII	20.6	0.1	29 0	9	13.2	21	8.1	12.0	1.2	+4.4	57	—155
IX	16.1	-0.9	26.1	8	8.1	15	6.9	10.4	1.5	+4.6	219	19
X	11.5	0.1	19.0	4	4.5	25	5.2	10.0	1.0	+2.8	296	87
XI	6.8	-0.8	15.0	4	-0.3	30	5.6	9.9	1.5	-5.6	128	7
XII	2.5	-1.0	13.4	25	—4. 8	30 e 31	5.4	11.9	1.4	-5.5	73	— 13
Anno	11.7	-0.1	30.4	VI	<u>-4.8</u>	XII	7.0	_	1.4		1964	87

Temperatura: medie mensili con le relative differenze dal normale e con i valori massimi e minimi di ogni mese; amplitudine giornaliera media e massima cioè la differenza tra le temperature estreme giornaliere; variazione interdiurna media e massima ossia la differenza tra le medie giornaliere dei giorni susseguenti.

Pioggia: somme mensili con relative differenze dal normale. (Per valori normali della pioggia e della temperatura si sono presi i valori medì delle misurazioni effettuate dal 1883 al 1932 dalla stazione meteorologica di Locarno—Muralto).

Tab. II.

	Sole											Nebulosità in º/o	
1937	Durata ore Loc. M. Zurigo Loc. M.			° Zurigo	senza , sole		umero dei gio con almeno 1 ora Loc. M. Zurigo		rni con almeno 6 ore Loc. M. Zurigo		Locarno Monti	Zurigo	
I	135	69	62	29	5	9	25	16	15	5	40°/ _o	71°/o	
П	162	37	64	14	4.	11	24	9	15	2	46	83	
111	122	87	37	25	11	7	16	19	12	4	69	75	
1V	228	132	62	34	3	3	27	23	20	11	45	71	
v	218	221	54	50	2	2	23	28	17	16	54	56	
VI	254	214	63	48	2	_	27	27	23	19	45	61	
VII	297	225	72	50	<u> </u>	- 1	30	28	24	20	38	61	
ΛΠ	274	178	70	43	_	3	29	26	24	14	40	63	
IX	159	118	45	33	6	5	20	19	14	9	56	66	
X	102	102	34	32	9	26	17	20	9	6	66	67	
χt	147	77	64	30	4	. 12	23	15	16	5	41	70	
ΧIJ	109	39	52	16	6	15	20	8	12	3	46	84	
Anno	2207	1499	57	34	$14^{\circ}/_{\scriptscriptstyle{\Theta}}$	26°/ _o	77°/ _o	65°/ _o	$\overline{55^{\circ}/_{o}}$	$\overline{23^{\circ}/_{o}}$	49°/ _o	$\overline{69^{\circ}/_{o}}$	

Sole: durata mensile in ore ed in % della possibile (secondo la configurazione dell'orizzonte e la variazione annua della declinazione solare). Nelle colonne successive sono notate le somme mensili (ed annue) dei giorni senza sole, rispettivamente con almeno un'ora od almeno sei ore di insolazione.

Nelle due colonne « n e b u l o s i t à » si trova, espressa in percentuale della superficie celeste, la quantità media mensile di cielo coperto.

Nella precedente tabella — sole e nebulosità — sono riferiti, oltre i dati di Locarno-Monti, anche quelli corrispon-

denti di Zurigo, allo scopo di permetterne il confronto. Dal quale risultano evidenti i vantaggi del clima sudalpino di fronte a quello nordalpino.


Tab. III.

4007	Umidità				Numero di giorni con							Frigorimetro	
1937	relativa assoluta Deficit di saturazione fisico fisiologico		pioggia	neve	temporali	_ nebbia	chiari	oscuri	notte	giorno			
I	71°/o	3.9	1.6	35.6	5	3	_	2	9	5	12.9	13.0	
II	61	4.3	2.7	35.2	6	1	1	2	7	5	12.3	12.2	
Ш	70	4.7	1.9	34.8	14	5	2	6	5	16	13.6	12.6	
IV	58	5.9	4.3	33.6	10	_	_	1	9	6	10.9	8.4	
v	67	9.2	4.4	30.3	13	_	2	3	11	12	9.3	6.4	
VI	66	11.2	5.8	28.3	9	_	5	_	5	4	7.5	4.5	
VII	66	12.4	6.3	27.1	11	_	9	_	10	2	7.0	3 . 7	
VIII	67	12.1	5.9	27.4	6	_	3	_	12	5	7.3	4.5	
IX	74	10.2	3.4	29.3	16	1 1	3	1	7	9	11.5	9.8	
X	83	8.4	1.7	31.1	14	_	1	2	4	16	13.3	12.4	
ΧI	68	5.0	2.4	34.5	9	1	_	2	11	6	15.5	13,8	
XII	67	3.7	1.8	35.8	7	3	_	1	14	9	17.3	16.1	
Anno	68°/ _o	7.6	3.5	32.0	120	13	26	20	104	95	11.5	9.8	

U m i d i t à dell'aria: relativa in %0, assoluta in grammi per metro cubo. Deficit di saturazione fisico e fisiologico: il primo è la differenza tra il contenuto effettivo di vapor acqueo e quello possibile secondo la temperatura attuale, il secondo la differenza tra il contenuto in vapor acqueo dell'aria espirata (340.8, 95 %0) e quello dell'aria inspirata (umidità assoluta). Le cifre indicano quanti grammi di vapor acqueo può sottrarre un metro cubo di aria inspirata dal tratto respiratorio umano.

Le colonne « n u m e r o d e i g i o r n i c o n » non necessitano di spiegazioni particolari. I giorni « chiari » hanno — secondo la definizione meteorologica internazionale — una nebulosità media giornaliera del 20 % al massimo, i giorni « oscuri » di almeno 80 %.

Frigorimetro: medie mensili dell'effetto refrigerante, prodotto dai fattori climatici, separate per la notte ed il giorno. I numeri esprimono le milligrammacalorie per cm² sottratte, ogni secondo, all'organismo umano esposto all'influsso del clima di una determinata località.



La rappresentazione grafica qui sopra dà la rosa dei venti per ogni mese del 1937, in base alle osservazioni giornaliere delle 7 $^{1}/_{2}$, 13 $^{1}/_{2}$, 21 $^{1}/_{2}$. Direzioni : nord

in su, est verso destra, ecc. La lunghezza delle linee è proporzionale al numero delle volte in cui una certa direzione si è presentata.

Tab. IV. Radiazione solare, valori massimi

h =	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	più di 60					
Radiazione totale (in gcal. cm. 2 min 1)											
Primaver	a 1.096	1.311	1.419	1.451	1.473	1.222					
Estate	1.041	_	1.261	1,366	1.391	1.434					
Autunno ed inverr	no 1.288	3 1.395	1.405	_	_	_					
	Radiazione ultravioletta (Unità di Davos : $1 = 3.5.10^{-11}$ Amp.)										
	(Ontta	a.ai Dav	0s:1=	5,5.10-11	Amp.						
Primaver	'a	57.8	122.0	256.2	273.0	221.9					
Estate		$64\ 2$	142.0	206.4	287.4	334.3					
Autunno ed inveri	no	76.7	163.7	59. 3	×.						

La tabella IV contiene alcuni risultati delle nostre numerose misurazioni della radiazione totale ed ultravioletta del sole, e precisamente soltanto i valori massimi trovati finora, ordinati secondo le stagioni e l'altezza h del sole.

Descriveremo ancora brevemente il carattere meteorologico dell'anno 1937 e dei singoli mesi, come risulta dalle tabelle.

L'anno in generale ha avuto una temperatura quasi normale. La quantità di pioggia fu leggermente superiore alla media.

Gennaio: temperatura un po' inferiore alla normale, precipitazioni la metà del normale, nebulosità soltanto il 40 %, insolazione ricca (più del 60 % del possibile).

Tebbraio: temperatura di circa 2 gradi maggiore della normale, precipitazioni di circa il 60 % superiori, insolazione ricca, 64 % del possibile.

Marzo: troppo freddo (circa 2 gradi inferiore al normale), annuvolato e piovoso (precipitazioni quasi 3 volte le medie).

- Aprile: relativamente caldo, soleggiato e scarso di piogge.
- Maggio: caldo, ma piovoso durante le due prime decadi.
- Giugno: temperatura elevata, quanto agli altri elementi quasi normale.
- Luglio: temperatura normale, nebulosità minima, durata del sole più del 70 $^{0}/_{0}$ del possibile, pioggia leggermente superiore al normale.
- Agosto: bello, temperatura normale, nebulosità minima, precipitazioni soltanto il $27\,^{0}/_{0}$ del normale, durata del sole $70\,^{0}/_{0}$ del possibile.
- Settembre: troppo freddo, nuvoloso, precipitazioni leggermente elevate specialmente nella seconda decade.
- Ottobre: temperatura normale, nuvoloso, sole soltanto il 34 % del possibile, pioggia circa 40 % superiore al normale.
- Novembre: relativamente freddo, quantità di pioggia normale, nebulosità leggera, 64 % dell'insolazione possibile.
- $\bar{D}icembre$: temperatura troppo bassa, quantità delle precipitazioni relativamente piccola, nebulosità leggera, 52~% dell' insolazione possibile.