Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

Band: 56 (1963)

Artikel: Die Vögel des Kantons Tessin. 4. Nachtrag, Periode 1957 - 1963

Autor: Corti, Ulrich A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1003546

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Die Vögel des Kantons Tessin

4. Nachtrag. Periode 1957-1963* Von Ulrich A. Corti. Zürich

Der erhebliche Umfang der seit der letzten Berichterstattung gesammelten ornithologischen Daten auferlegt diesmal dem Verfasser eine Beschränkung der Wiedergabe der zur Verfügung stehenden Unterlagen auf eine relativ kleine Anzahl von Notizen, die für den Kanton Tessin vorwiegend von faunistischem Interesse sind. Das übrige Material ist zur gelegentlichen Verwertung an anderer Stelle vorgesehen. Das beigeschlossene Literaturverzeichnis verdient umso mehr Beachtung, als die darin aufgeführten Veröffentlichungen für den vorliegenden 4. Nachtrag nur zum geringsten Teil berücksichtigt worden sind.

Die Anzahl der bisher im Tessin festgestellten Vogelarten hat sich seit Ende 1956 durch den Nachweis des mehr oder weniger irregulären Vorkommens von Kolbenente, Bartseeschwalbe, Graugans, Türkentaube, Doppelschnepfe, Kleinralle, Mariskensänger und Brachschwalbe von 266 auf 274 erhöht.

Folgenden Mitarbeitern weiss sich der Verfasser für die freundliche Mitteilung ornithologischer Beobachtungen im Tessin zu besonderem Dank verpflichtet:

Herren Dr. med. P. D'Alessandri (Faido), Prof. Dr. B. Baur-Celio (B) (Küsnacht ZH), P. Dalang (Zürich), A. Hakios (AH), Sek.-Lehrer (Zürich), W. Leuthold (WL), cand. phil. (Zürich), Adolf K. Müller (München), Frl. Dr. h.c. Julie Schinz (JS) (Zürich), Herren A. Suchantke (AS) (Arlesheim), Prof. Dr. Don Aldo Toroni (Muzzano TI), Dr. E. Volkmann (München), Frl. Dr. med. C. Weil (CW) (Olten), Herren H. Wettenschwiler (HW) (Zürich), August Witzig (AW) (Lugano-Paradiso), B. Zinnenlauf (BZ) (Zürich).

Abkürzungen von Zeitschriftentiteln: OB = Der Ornitologische Beobachter; VdH = Vögel der Heimat.

A. DIE VOGELFORMATION DES HYDROSITONS

Wasseramsel, Cinclus cinclus. Am 1. Jan. 1958 in Ambri, wie tagszuvor, 1 W. am Dorfbach (B). — 3. März 1958, zwischen den Brücken

^{*) 3.} Nachtrag siehe: Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali 52 37-70 (1957). Der 4. Nachtrag enthält auch einige aus dem Jahre 1964 stammende Daten.

von Quinto und Tre Cappelle (Leventina) über 12, z.T. balzende W. am Ticino; hier noch nie so viele Exemplare gesehen (B).

Fischadler, Pandion haliaetus. BZ stellte am 8. April 1957 ein Ex. im untern Pian Magadino fest, und M. Schwarz, OB. 57 83, traf den F. am 16. Mai 1959 an der Tessinmündung an.

Graureiher, Ardea cinerea. Am 25. Juni 1963 erhielt AW die Mitteilung der Anwesenheit eines G. am Lago Ritom.

Seidenreiher, Egretta garzetta. AS beobachtete am 16. Mai 1960 einen S. im Gebiet der Tessinmündung; OB. 57 155 (1960).

Nachtreiher, Nycticorax nycticorax. Don Aldo Toroni erhielt am 23. Juli 1957 ein ad. Exemplar von Riazzino, das dort vermutlich einer Starkstromleitung zum Opfer fiel. — Am 13./14. Juli 1958 fand A. Mini von Lelgio (V. Capriasca) bei einem Misthaufen auf Gola di Lago, zirka 1000 m ü. M. (Mte Bigorio), einen lebenden, juv. N., der dann am Lago di Muzzano beringt freigelassen wurde (AW).

Zwergreiher, Ixobrychus minutus und Rohrdommel, Botaurus stellaris. Auf der überfluteten Wiese des frisch geschnittenen Schilffeldes an der Verzascamündung oblagen am Abend des 11. Juni 1961 drei Z. - δ in gänzlich deckungslosem Terrain und in Gesellschaft einer R. sowie einiger Teichrallen der Jagd (AS).

Krickente, Anas crecca. Ein am 4. Nov. 1954 bei Le Sambuc (Bouches-du-Rhône) beringtes δ d. J. wurde am 22. Febr. 1955 an der Verzascamündung, 440 km NE, erbeutet; OB 54 170 (1957). — Am 8. April 1963 ein K. - δ bei Ambrì auf einem Stein im Ticino stehend (B).

Knäkente, Anas querquedula. M. Schwarz (OB. 57 92) fand am 16. Mai 1959 nahe der Bolla rossa ein von Krähen aufgepicktes Ei der K.

Kolbenente, Netta rufina. AS beobachtete am 6. und 9. Mai 1960 ein K. - ♀ im Gebiet Verzasca - Bolla rossa (Pian Magadino). Neu für den Tessin.

Kormoran, Phalacrocorax carbo. Am 30. Sept. 1957 wurde durch P. Zoni und N. Longoni (Lugano) ein K. - & zirka 200 m vor der Mündung des Ticino geschossen. Der Vogel wog 2185 gr. Masse: Flügel 350 mm, Schnabel 70 mm, Lauf 66 mm. Beleg in Coll. Liceo Cantonale, Lugano (AW).

Austernfischer, Haematopus ostralegus. Am 30. Sept. 1959 sah AW 5 A., die sich im Delta des Cassarate (Lugano) auf einer Landzunge niederliessen, nach etwa 1/2 Stunde aber infolge einer Störung wegflogen.

Trauerwasserläufer, Tringa erythropus. O. Moor (OB. 55 133) traf am 1. Sept. 1957 vier T. an der Bolla rossa an.

Limose, Limosa limosa. 26. April 1960, eine L. an der Bolla rossa (AS).

Weissflügelseeschwalbe, Chlidonias leucopterus. 1. Mai 1957, drei W. an der Tessinmündung (AW); OB. 55 35.

Bartseeschwalbe, Chlidonias hybridus. 1. Mai 1957, 1 Ex. an der Mündung des Ticino (AW): OB. 55 35. — AS beobachtete am 29. Mai 1960 eine B. in Gesellschaft von 7 Trauerseeschwalben vor der Mündung der Bolla rossa. Neu für den Tessin.

Lachseeschwalbe, Gelochelidon nilotica. M. Schwarz (OB. 57 90) nahm am 16. Mai 1959 eine L. an der Verzascamündung wahr.

Flusseeschwalbe, Sterna hirundo. Am 16. Mai 1960 ein Exemplar « krieh-err » rufend an der Tessinmündung überhinfliegend. Der Vogel wurde später nicht mehr gesehen (AS); OB. 57 156.

Zwergmöwe, Larus minutus. 25. Mai 1958, ein immatures Ex. vor der Tessinmündung; M. Schwarz, OB. 56 49. — Ebenda 1 Ex. mit Lachmöwen am 10. April 1959 über submerser Sandbank, und 1 Z. am 6. Aug. 1959 gegen die Verzascamündung hin (B).

Lachmöwe, Larus ridibundus. Am 13. Okt. 1961 schwammen 2 L. auf dem Lago Ritom (B), ebenda am 14. Okt. 1963 zwei Indiv. bei ziemlich kaltem, aber sonnigem Wetter (HW).

Blessralle, Fulica atra. Am 6. Aug. 1959 zwischen Tessinmündung und Bolla rossa einige B. mit noch ganz kleinen Jungen (B). — AS und AW zufolge führten am 17. Mai 1960 zwei Paar B. im Tessindelta erst vor wenigen Tagen geschlüpfte Junge. — Am 25. Juni 1963 erhielt AW Mitteilung von der Anwesenheit dreier B. auf dem Lago Ritom. — Rückmeldungen:

B. beringt in Lugano (AW) am 16. Jan. 1960; tot (verhungert) gefunden am 15. März 1963 in Berg-Starnbergersee, 277 km NE. B. beringt in Lugano (AW) am 2. Jan. 1962; tot in Fischernetz am 6. Mai 1963 bei Sztum (Polen), 1125 km NE.

B. beringt in Lugano (AW) am 28. Febr. 1962; getötet am 20. Okt. 1963 in Gdynia b. Gdansk (Polen), 1150 km NNE.

B. beringt in Lugano (AW)/Muzzano am 26. März 1962; erlegt am 28. Nov. 1962 bei Arborea (Cagliari, Sard.), 688 km S.

B. DIE VOGELFORMATION DES GEOSITONS

Kolkrabe, Corvus corax. Nach R. Sartori haben 1959 zwei Paar K. in etwa 1600 m an den Nordhängen des Mte Generoso gebrütet. Vom 29. Juni bis 10. Juli d. J. konnten beide Paare täglich mit den flüggen Jungen beobachtet werden; OB. 57 99 (1960). — Am 4./5. März 1964 beobachtete ich mittels Fernrohr in der obersten Partie der Piumognaschlucht, wenig unterhalb des Plateaus von Cornone, einen gut sichtbaren K. — Horst, zu welchem wiederholt ein K. hinflog (B).

Turmdohle, Coloeus monedula. 17. April 1951, 1 T. mit 20 Rabenkrähen zum Schlafplatz S Ambrì fliegend (B). — BZ sah am 10. April 1957 fünf Ex. im untern Pian Magadino. — Am 17. Okt. 1957 ein kleiner Trupp T. auf der Gotthard-Passhöhe (B).

Alpendohle, Pyrrhocorax graculus. JS und CW stellten am 5. Okt. 1959 zwei A. auf dem Mte Generoso, 1703 m, fest.

Star, Sturnus vulgaris. Am 27. Juni 1957 fütterten St. Nestlinge unter dem Ziegeldache des Kurhauses in Serpiano (AW).

Grünfink, Chloris chloris. 1. Jan. 1958, 1 ⋄, 1 ♀ an einem Futterhäuschen in Piotta, am 29. Dez. 1961 ein G. - ⋄ bei der Kirche S. Giov. Battista S Dorf Anzonico (B).

Zitronfink, Chloroptila citrinella. 2./3. März 1959: Bei Cresta (Ronco Leventina) einige Z. auf Haselbüschen balzend. Die Vögel jagen einander in grösseren Bogen nach und rufen lebhaft. 2 Paar Z. treiben sich unterhalb Altanca bei etwas Gefels im Gebüsch herum. Die δ führen kurze, an diejenigen des Baumpiepers erinnernde Balzflüge aus. Letztere stellen kurze Gleitflüge dar, anlässlich welcher, unter Rufen und Singen, der Schwanz hochgestellt ist und die Flügel ausgebreitet werden. Das ♀ eines Paares las Schafwolle auf. Gelegentlich werden « Rundflüge » von 50 bis 100 m Länge, z. T. im Gleitflug, ausgeführt. Immer wieder wurden Niststoffe aufgelesen (B).

Girlitz, Serinus serinus. A.K. Müller traf am 14. Juni 1963 in einer Gärtnerei S Morcote eine G.-Familie mit flüggen Jungen an.

Buchfink, Fringilla coelebs. Ein am 28. Sept. 1955 bei Locarno beringtes ad. ♀ wurde am 17. Okt. 1955 bei Fuveau (Bouches-du-Rhône), 410 km SW, erbeutet; OB. 54 160 (1957).

Rohrammer, Emberiza schoeniclus. In der Zeit vom 10.-12. Juni 1961 nahm AS im Gebiet zwischen Verzasca und Magadino eine einzige Familie R. mit eben ausgeflogenen Jungen wahr. Sehr viele Bruten dürften infolge des Hochwassers ertrunken sein. — Laut AW (in litt.) wurde eine am 30. Sept. 1962 in Pori, Ruutukuopat (Finland) beringte R. am 11. Nov. 1962 in der Magadino-Ebene, 1900 km SSW, erlegt.

Haussperling, Passer domesticus. Der H. hat Primadengo etwa im Jahre 1949 erobert, Calpiogna Anno 1960. Dagegen scheinen die Dörfer Campello (1365 m) und Molare (1490 m) noch nicht besiedelt zu sein, während der H. in All'Acqua (1610 m, V. Bedretto) vorkommt; P. D'Alessandri (in litt., 1963).

Brachpieper, Anthus campestris. Ein von A. Schifferli am 23. Sept. 1955 bei Locarno gefangenes Q wurde am 1. Jan. 1956 bei Carmona (Sevilla/Spanien), 1550 km SW, gefangen; OB. 54 161 (1957).

Bergstelze, Motacilla cinerea. Ein am 21. Sept. 1955 im Maggiadelta beringtes ♀ d. J. wurde am 9. Okt. 1955 bei Seyne-sur-Mer (Var), 410 km SW, erbeutet; OB. 54 161 (1957). — Ein Paar brütete 1960 an der Kaserne in Bellinzona und fütterte die Nestlinge bis zirka 1. August (WL).

Dornwürger, Lanius collurio. P. D'Alessandri traf den D. im Juni 1963 in etwa 1450 m ü.M. bei Molare (Leventina) an.

Raubwürger, Lanius excubitor. Im Oktober 1957 wurde 1 Exemplar im Piano di Magadino erlegt (AW).

Feldschwirl, Locustella naevia. 9. Mai 1960: ein F. bruchstückhaft in Weidendickicht S Tessinmündung singend; am 17. Mai 1960 vormittags ein singender F. im Bolette, ganz in der Nähe eines gleichzeitig singenden Rohrschwirls, nachmittags 1 Ex. im von Lonicera bewachsenen Auengehölz an der Verzasca (AS).

Rohrschwirl, Locustella luscinioides. Am 10. April 1959 vernahm ich das «Surren» des R. im Schilf bei Magadino (B). — M. Schwarz (OB. 57 97) verhörte am 16. Mai 1959 sicher 2, möglicherweise 3 schwirrende R. im Gebiet Bograsso im Verzascadelta. — AS und AW konstatierten am 17. Mai 1960 den Gesang mehrerer Individuen im Tessindelta. — Vgl. besonders auch AS und M. Schwarz, OB. 57 155f. (1960).

Rotdrossel, Turdus musicus. Eine am 15. Okt. 1962 in Torhamm, (Bleckinge) Schweden beringte R. ist etwa am 10. Nov. 1962 in der Valle Muggio, 1225 km SSW, erlegt worden (AW in litt.).

Ringdrossel, Turdus torquatus. Am 21./22. Juli 1958 sucht bei All'Acqua (Bedretto) ein R. - \Diamond Futter am Fusse einer grossen Lärche. Die R. kommt in der Leventina ausserordentlich selten vor. An einer einzigen Stelle (Westflanke des Fongio) sah ich zwei Jahre nacheinander R. Am 18. Juli 1959 ein \Diamond bei Piotta, gegen « Pinet ». Am 31. Juli 1961 in der Nähe der Klubhütte Cristallina ein wohl juv. Individuum in einem Blockfeld schäkernd, bei zirka 2350 m ü.M., über 2 km von den nächsten Bäumen entfernt. Höhendifferenz bis zum nächsten Wald etwa 500 m (B).

Schwarzdrossel, Turdus merula. Eine am 26. Mai 1954 von R. Sartori bei Arogno als Nestling beringte Amsel wurde am 20. Jan. 1955 bei Pitreto - Bicchisano (Korsika), 480 km S, erbeutet; OB. 54 164 (1957).

Steinmerle, Monticola saxatilis. Am 29. Juni 1955 beobachtete AW (OB. 53 116) auf dem Mte Generoso beim Kulmhotel ein futterragendes δ , unweit davon einen flüggen Jungvogel. — 15. Juli 1958, 200 m SW Sennhütte Campolungo ein eifrig singendes δ (B). — P. D'Alessandri hat die St. oberhalb Osco bei 1800 m ü.M. in 2 Paaren festgestellt. Am 30. Juni 1963 konnten hier 2 Nestlinge beringt werden, ein weiterer entwischte.

Blaumerle, Monticola solitarius. In Corti, Die Vögel des Kantons Tessin (1945) ist p. 194, Zeilen 16/17 von oben von « temarques » (Name einer Insektenart) die Rede. Es muss sich dabei um Vertreter der Käfergattung Timarcha Latr. (Familie Chrysomelidae) handeln, die zahlreiche, meist südeuropäische Arten umfasst.

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe. P. Dalang beobachtete am 4. Aug. 1959 sehr viele St. bei zirka 2100 m an den Geröllhalden ob Bosco-Gurin und ein Exemplar bei etwa 2400 m oberhalb des Passes.

Gartenrötel, Phoenicurus phoenicurus. Am 13. Mai 1957 sang in meinem Garten in Lugano - Paradiso ein G. schon um 02.45 Uhr (AW). — 16. Juli 1961, ein ♂ in Pura, einzige Feststellung in diesem Monat (WL). — E. Volkmann und B. vernahmen in der Nacht vom 18. und in derjenigen vom 21. Juni 1962 in Incella s. Brissago gegen 04.00 Uhr typischen G.-Gesang, dann wieder am 25. und 30. Juni d.J., stets zwischen 03.30 und 04.00 Uhr. Tagsüber wurde ein ♂ in Incella (etwa 370 m) oft auf Hausgiebeln und Telefondrähten gesehen. Es hielt sich in einem Areal von etwa 100 m Durchmesser auf. Am 23. Juni d.J. zeigten sich am Abstieg von Incella durch die Gärten nach Brissago gegen 17 Uhr mehrere junge G. nebst einem ad. ♂. E scheint also, dass das G. hier in einer ungewöhnlich tiefen Lage des Tessins gebrütet hat.

Hausrötel, Phoenicurus ochruros. Am 23. Juli 1958 wurden im obersten Teil des früheren Hauptsteinbruchs W Ticino bei Bodio junge H. gefüttert (B.) — Das H. zögert, wie die Bachstelze, nicht, in höheren Lagen des Tessins auf dem Erdboden zu nisten, so z.B. in der Val Bedretto, während es sich in tieferen Lagen fast ausschliesslich in Gebäuden fortpflanzt; P. D'Alessandri (in litt., 1963).

Wiedehopf, Upupa epops. Am 9. April 1953 ein Ex. am Vedeggio bei Taverne (AH), am 3. April 1957 ein W. in Melide (AW), am 19. April 1963 nachmittags 3 W. bei Ambrì (B). — P. D'Alessandri zufolge pflanzt sich der W. in der mittleren Leventina fort : seit 1961 eine Niststätte in der Höhlung einer Edelkastanie, zirka 7 m über dem Boden, bei Primadengo; sie war 1963 wieder besetzt. Ein anderes Nest fand sich 1963 in einem Stall bei Faido.

Grauspecht, Picus canus. WL (in litt.) konstatierte am 20. Juli 1961 einen G. ob Pura.

Wendehals, Jynx torquilla. Ein am 12. April 1956 bei Locarno beringter W. wurde am 5. März 1957 bei Pedro Abad, Bujalance (Cordoba, Spanien), 1400 km SW, angetroffen; OB. 56 166 (1959). — P. D'Alessandri (in litt.) hat den W. seit 1961 als Brutvogel (Nisthöhle an Apfelbaum) in Faido festgestellt. Hier wurde im Juni 1963 ein Nestling beringt. Am 20. Sept. 1963 wurde ein W. bei Nebel um 21.30 Uhr in einem Lokal des Albergo S. Gottardo (Gotthardhospiz) gefangen und am folgenden Morgen um 9.10 Uhr in Airolo beringt freigelassen.

Uhu, Bubo bubo. Im März 1957 rief ein U. abends oft auf dem S. Salvatore. Herr Bollschweiler sah den Vogel zweimal. Am 10. April 1957 konnte auch W. Rutz den U. ebenda zweimal in 8-10 m Distanz auf einer Buche beobachten (AW). — Am 8. März 1958 soll wieder ein U. auf dem Mte S. Salvatore gerufen haben. A. Pedraita benachrichtigte mich am 12. Juni 1958, dass seit 3 Jahren ein U.-Paar in den Felsen ob der Brauerei Bellinzona, gleich jenseits der Tessinbrücke, horste (AW). — Im Mai 1964 befand sich in einem kleinen Ristorante am Ausgang

von Cavigliano an der Strasse nach Auressio ein ausgestopfter U., der vor kurzem (im Winter?) von den Kindern des Besitzers des Ristorante tot unter einer Drahtleitung gefunden worden war; A. K. Müller (in litt.).

Zwergohreule, Otus scops. Z. am 29. Mai 1960 um 3 Uhr an der Maggiabrücke bei Solduno rufend (AS).

Waldohreule, Asio otus. Die Tochter von Prof. O. Panzera fand am 22. April 1957 auf dem Fussballplatz in Cademario ein totes W.- δ . Beleg in Coll. Büro für Jagd u. Fischerei, Bellinzona (AW).

Sumpfohreule, Asio flammeus. A. Togni (Brione/Verzasca) besitzt ein Belegstück der S., die Anno 1955 in Cugnasco lebend gefunden wurde (AW). — Am 20. Mai 1956 auf dem Hügel bei Cornone-Dalpe, 1200 m, ein Exemplar, das dort am 26./27. Juni d.J. nicht mehr festgestellt werden konnte (AW); OB. 54 206.

Steinkauz, Athene noctua. Am 27. Juli 1961 abends in Pura gehört (WL).

Rauhfusskauz, Aegolius funereus. Im Herbst 1963 wurde in einem Walde ob Bosco-Gurin ein verletzter, flugunfähiger R. gefunden, der an die Vogelwarte Sempach gesandt wurde; W. Bieri (1964).

Rotfussfalke, Falco vespertinus. Präparator M. Layritz erhielt am 23. Mai 1956 ein 150 gr schweres R. - Q aus Lugano; OB. 53 117 (1956).

— Am 9. Mai 1961 beobachtete O. Moor ein R. - & über Solduno.

Turmfalke, Falco tinnunculus. Ein am 13. April 1956 bei Locarno beringtes vorjähriges \mathcal{P} wurde am 1. Febr. 1957 bei Gerindote, Torrijos (Toledo, Spanien), 1250 km SW, aufgefunden; OB. 56 162 (1959).

Schelladler, Aquila clanga. Am 5. Nov. 1952 wurde ein juv. Sch. bei Stabio erlegt (det. Dr. E. Sutter, Basel) (AW).

Rauhfussbussard, Buteo lagopus. 28. Dez. 1952, ein R. bei der Station Piora dem Hang entlang talaufwärts ziehend, am 25. Febr. 1963 ein Ex. bei Piotta (B).

Rotmilan, Milvus milvus. Am 16. Aug. 1956 war im Verbano vor der Tessinmündung ein R. auf einem angeschwemmten Wurzelstock aufgeblockt (B).

Wespenaar, Pernis apivorus. 12. Aug. 1958, ein W. am Fongio-Gipfel ob Piora talaufwärts ziehend (B). — W. Gubler vermutete Anno 1959 einen W. - Horst am Mte Gradicioli; er konnte in der 2. Hälfte Juni 1959 5 - 6mal W. über der Alp Agra, Cademario und San Bernardo beobachten; OB. 57 93.

Schlangenadler, Circaëtus gallicus. Cf. OB. 53 114 (1956) und OB. 55 126 - 128 (1958).

Graugans, Anser anser. Am 17. Okt. 1962 ziehen 2 G. mit klingendem Flügelschlag durch eine Lichtung im Nebel, zirka 100 - 150 m hoch, über den Gotthardpass (B). — Neu für den Tessin.

Türkentaube, Streptopelia decaocto. R. Baula (1962) beobachtete am 10. Mai 1961 in Brenscino b. Brissago, ca. 280 m ü.M., eine T. — Neu für den Tessin (Grenzzone).

Flussuferläufer, Actitis hypoleucos. Am 11. Aug. 1958 zwei F. beim Wehr in Rodi (Eingang in die Piottinoschlucht) Nahrung suchend; bisher in der Leventina noch nie beobachtet (B).

Doppelschnepfe, Gallinago media. 10. April 1959, eine D. in sumpfigem Gelände links der Verzascamündung (B). — Neu für den Tessin.

Urhuhn, Tetrao urogallus. 6. Aug. 1959: P. Dalang traf beim Aufstieg auf den Passo Quadrella SW Bosco-Gurin an einem steilen, nach N gerichteten, mit Alpenrosen bestandenen Hang an der Baumgrenze (lichter Lärchenwald) bei zirka 2000 m ü.M. eine Urhenne mit 4 Kücken an.

Schneehuhn, Lagopus mutus. Am 5. Aug. 1951 auf Prodoruc, 2507 m, SE Ritomsee, 5 juv. Sch.; am 31. Juli 1961 in einem Tälchen unterhalb der Klubhütte Cristallina, wo ungewöhnlich viel Schnee lag, 8 Ex. zwischen Blöcken. Die δ liessen ½ Stunde lang ihr Liebeswerben hören (B).

Haselhuhn, Tetrastes bonasia. Am 7. März 1958 ein H. im westlichen Teil des Tobels W Pradör auf einem Haselstrauch. Der Vogel schoss sofort in die Tiefe (B).

C. DIE VOGELFORMATION DES PHYTOSITONS

Kohlmeise, Parus major. Am 3. April 1959 wurden bei Bellinzona etwa 6 flügge K. gefüttert; am 5. April 1959 bettelten in einer Hecke bei Biasca 7 flügge Jungvögel um Futter, und gleichentags wurden bei Iragna zwischen Bellinzona und Biasca nochmals etwa 5 flügge K. beobachtet; W. Fuchs, OB. 57 105 (1960).

Beutelmeise, Remiz pendulinus. 10. April 1957, 2 ad. und 1 juv. B. im untern Pian Magadino (BZ).

Mariskensänger, Lusciniola melanopogon. P. Teichert (1964) fing am 20. März 1964 in einem Netz im Maggiadelta bei Ascona einen M. — Erstnachweis für den Tessin.

Orpheusspötter, Hippolais polyglotta. Am 25. Mai 1958 singt ein O. in der Magadino-Ebene; M. Schwarz, OB. 56 52. — Betr. Brutnachweise im Tessin siehe H. Meier, W. Fuchs, U. Glutz von Blotzheim (1961). — Am 16. Juni 1963 sang ein & an der Strasse Intragna Camedo kurz vor dem Schild « Calezzo » am Steilhang über der Strasse in einer Wildnis von Sträuchern, Büschen, einer kleinen Robinie. Auch eine verfallene Stützmauer war dort. Der Vogel war nicht sichtbar, wahrscheinlich wegen des starken Auto- und Motorradverkehrs am Nachmittag. Der Gesang war unverkennbar anders als der von H. icterina, nicht so laut, selten Motive wiederholend, kurze Strophen, «tet»-Reihen. Eine Zweiteilung des Gesanges, wie sie im OB. 58 50 (1961) beschrieben wird, konnte ich nicht erkennen, mir scheint aber, dass ich nur die « Schwatztour » gehört habe; A. K. Müller (in litt.). — Am 25. Mai 1964 ein O. zwischen Cavigliano und Auressio singend; A. K. Müller (in litt.).

Schwarzspecht, Dryocopus martius. Am 6. März 1958 ein Sch. bei Piora (B).

D. DIE VOGELFORMATION DES AEROSITONS

Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis. A. Schwab (OB. 53 112) sah am 17. und 18. Mai 1956 ein H. - \Diamond auf den Monti von Malmera ob Arbedo - Bellinzona, bei zirka 690 m ü.M. — Am 26. April 1957 vier singende \Diamond am Westhang des Mte Bigorio : A. Schwab, VdH 28 32.

Rauchschwalbe, Hirundo rustica. P. D'Alessandri hat die R. bis 1963 in der Leventina noch nie brütend angetroffen.

Alpensegler, Apus melba. Laut R. Sartori (OB. 57 95) besteht seit mindestens 1939 eine Brutkolonie des A. in den Felswänden des Mte Generoso zwischen 1500 - 1700 m. Sie zählte 1959 etwa 25 Paare.

Brachschwalbe, Glareola pratincola. Am 16. und 17. Mai 1960 hielt sich eine B. an der Tessinmündung auf (AS); OB. 57 155f. (1960). — Neu für den Tessin.

Literaturnachträge

Bauer, K. siehe Niethammer, G. Baula, R. Tourterelle turque au Tessin; Nos Oiseaux 26 192 (1962). Vögel im Südtessin; Tierwelt 70 657 (1960). Bieri, W. Die Vögel von Bosco/Gurin; Tierwelt 74 786f. (1964). Burckhardt, D. Bericht über die Wasservogelzählungen in den Wintern 1954/ 55 bis 1956/57 und über die internationalen Wasservogelzählungen von 1952/53 bis 1956/57; Orn. Beob. 55 1-30 (1958).Fuchs, W. Schlangenadler im Maggia-Delta (Tessin); Orn. Beob. 53 114f. (1956). Die Amsel als Bodenbrüter im Tessin; Orn. Beob. 58 147 (1961).siehe auch Meier, H. et al. Zur gegenwärtigen Verbreitung des Stars, Sturnus vulgaris, Glutz v. Blotzheim, U. in den Schweizer Alpen; Orn. Beob. 58 1 - 12 (1961). Sammelbericht über den Winter 1961/62 und den Frühjahrszug 1962; Orn. Beob. 59 182-198 (1962). siehe auch Meier, H. et al. Hauri, R. Der Durchzug der Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger, in der Schweiz im Herbst 1960; Orn. Beob. 58 139f. (1961). Hofer, F. Bergvogelbeobachtung im Tessin; Tierwelt 69 680 (1959). Köhli, A. Wiedehopf im Tessin; Tierwelt 69 663 (1959). Lienhard, U. Hausrotschwanz jagt Tagpfauenauge und Bläulinge; Tierwelt 72 1007 (1962). Lötscher, H. Vogelparadies Monte Ceneri; Tierwelt 73 423 (1963). Meier, H., W. Fuchs, U. Glutz v. Blotzheim: Erste Brutnachweise des Orpheusspötters, Hippolais polyglotta, in der Südschweiz; Orn. Beob. 58 45 -59 (1961). Moor, O. Ornithologische Beobachtungen im Tessin; Tierwelt 74 667f. (1964).Münch, H. Nestbauweise der Haussperlinge (Passer domesticus) einer

Brutkolonie auf Palmen; Orn. Mitt. 9 145 (1957).

Farbaufnahmen, 44 Zeichnungen und 5 Karten.

der Schweiz; Orn. Mitt. 9 146f. (1957).

Beobachtungen am Schwarzmilan (Milvus m. migrans) in

Wo die Gemsen klettern. Leipzig/Jena, 1958. 390 S. Mit 115

Niethammer, G., K. Bauer: Das Mischgebiet zwischen Passer d. domesticus und Passer d. italiae im Tessin; Orn. Beob. 57 241f. (1960). Okle. M. Einiges aus der Vogelwelt Lugano und Umgebung; Tierwelt 70 326 (1960). Weidenlaubvogeldurchzug bei Morcote am Luganersee; Tierwelt 73 147 (1963). Rychner, R. Frühlingsbeobachtungen im Tessin 1960; Vögel d. Heimat 30 168 - 177 (1960). Schifferli, A. Bericht der Schweizerischen Vogelwarte Sempach für die Jahre 1955 und 1956; Orn. Beob. 54 141 - 154 (1957). Schweizerische Ringfundmeldung für 1955 und 1956; Orn. Beob. 54 155 - 174 (1957). Schweizerische Ringfundmeldung für 1961 und 1962; Orn. Beob. 60 166 - 203 (1963). Schubert, E. Beobachtungen aus dem Centovalli und Onsernonetal; Vögel d. Heimat 27 177f. (1957). Schwab, A. Ein Halsbandfliegenschnäpper ob Bellinzona; Orn. Beob. 53 112 (1956). Halsbandfliegenschnäpper, Steinmerle; Vögel d. Heimat 28 32 (1957). Schwarz, M. Ein erfreulicher Erfolg des Vogelschutzes im Kanton Tessin; Orn. Beob. 57 187f. (1960). siehe auch Suchantke, A. Suchantke, A. « Lemniskatenflug » eines Schlangenadlers; Orn. Beob. 55 126 - 128 (1958). Brachschwalbe und andere Irrgäste an der Ticino-Mündung; Orn. Beob. 57 155f. (1960). Suchantke, A., M. Schwarz: Zum Vorkommen des Rohrschwirles, Locustella luscinioides Savi, im Kanton Tessin; Orn. Beob. 58 133-139 (1961). Nachweis des Tamariskensängers im Tessin; Orn. Beob. 61 Teichert, P. 69f. (1964). Der Limikolenzug im Herbst 1959 in der deutschen Schweiz Willi, P. und im Bodenseebecken; OB. 57 249 - 260 (1960). Lo stornello; Il Nostro Paese Nr. 29, p. 581 - 584 (1957). Witzig, A. Ein Adlermärchen entlarvt; Tierwelt 67 715 (1957). La cicogna bianca fa nel suo lungo viaggio verso l'Africa del Sud una fermata intermedia nella Valle del Cassarate; Il Nostro Paese 7 658 - 660 (1958). Un giovane nitticora a Gola di Lago; Il Nostro Paese 7 675f. (1958).Der schwarzbraune Milan (Milvus m. migrans Bodd.), ein Charaktervogel des Seebeckens von Lugano ; Die Südschweiz, Nr. 107 vom 19. September 1959. Rarità ornitologiche nel delta della Verzasca; Il Nostro Paese 10 778 (1960). Ornithologische Seltenheiten am Tessindelta; Tierwelt 70 786 (1960). Lämmergeier und Steinadler im Tessin; Tierwelt 70 1176f. (1960).

Aus der bald dreissigjährigen Vogelschutztätigkeit der « Pro avifauna » im Tessin; Orn. Beob. 57 188-190 (1960).
Amsel erbeutet Mauereidechse und verfüttert sie an ihre flüggen Jungen; Tierwelt 71 552 (1961).
Amsel verfüttert Mauereidechse; Orn. Beob. 59 30 (1962).
Unsere Blässhühner am Cassaratedelta beim Stadtpark Lugano: Tierwelt 73 553 (1963).
Nuove interessanti notizie sulle folaghe al delta del Cassarate; Il Nostro Paese 12 1009f. (1963).
Zinnenlauf, B.
Frühlingsbeobachtungen aus dem Tessin 1957 und 1958; Vögel d. Heimat 29 23-35 (1958).